

**Dossier zur Nutzenbewertung
gemäß § 35a SGB V**

Pembrolizumab (KEYTRUDA[®])

MSD SHARP & DOHME GMBH

Modul 3 A

*Fortgeschrittenes (nicht resezierbares oder
metastasierendes) Melanom:
mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten*

Zweckmäßige Vergleichstherapie,
Anzahl der Patienten mit therapeutisch
bedeutsamem Zusatznutzen,
Kosten der Therapie für die GKV,
Anforderungen an eine qualitätsgesicherte
Anwendung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Tabellenverzeichnis	2
Abbildungsverzeichnis	4
Abkürzungsverzeichnis	5
3 Modul 3 – allgemeine Informationen	7
3.1 Bestimmung der zweckmäßigen Vergleichstherapie.....	8
3.1.1 Benennung der zweckmäßigen Vergleichstherapie.....	9
3.1.2 Begründung für die Wahl der zweckmäßigen Vergleichstherapie.....	9
3.1.3 Beschreibung der Informationsbeschaffung für Abschnitt 3.1.....	13
3.1.4 Referenzliste für Abschnitt 3.1.....	14
3.2 Anzahl der Patienten mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen.....	15
3.2.1 Beschreibung der Erkrankung und Charakterisierung der Zielpopulation.....	15
3.2.2 Therapeutischer Bedarf innerhalb der Erkrankung.....	20
3.2.3 Prävalenz und Inzidenz der Erkrankung in Deutschland.....	22
3.2.4 Anzahl der Patienten in der Zielpopulation.....	26
3.2.5 Angabe der Anzahl der Patienten mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen.....	29
3.2.6 Beschreibung der Informationsbeschaffung für Abschnitt 3.2.....	29
3.2.7 Referenzliste für Abschnitt 3.2.....	31
3.3 Kosten der Therapie für die gesetzliche Krankenversicherung.....	34
3.3.1 Angaben zur Behandlungsdauer.....	34
3.3.2 Angaben zum Verbrauch für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie.....	40
3.3.3 Angaben zu Kosten des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie.....	48
3.3.4 Angaben zu Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen.....	59
3.3.5 Angaben zu Jahrestherapiekosten.....	67
3.3.6 Angaben zu Versorgungsanteilen.....	70
3.3.7 Beschreibung der Informationsbeschaffung für Abschnitt 3.3.....	72
3.3.8 Referenzliste für Abschnitt 3.3.....	73
3.4 Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung.....	76
3.4.1 Anforderungen aus der Fach- und Gebrauchsinformation.....	76
3.4.2 Bedingungen für das Inverkehrbringen.....	78
3.4.3 Bedingungen oder Einschränkungen für den sicheren und wirksamen Einsatz des Arzneimittels.....	83
3.4.4 Informationen zum Risk-Management-Plan.....	83
3.4.5 Weitere Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung.....	88
3.4.6 Beschreibung der Informationsbeschaffung für Abschnitt 3.4.....	97
3.4.7 Referenzliste für Abschnitt 3.4.....	98

Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 3-1: Stadieneinteilung des Melanoms nach (10) und (2)	17
Tabelle 3-2: T-Klassifikation des Primärtumors beim Melanom nach (10) und (2).....	18
Tabelle 3-3: N-Klassifikation der regionären Lymphknoten beim Melanom nach (10) und (2)	18
Tabelle 3-4: M-Klassifikation der Fernmetastasen beim Melanom nach (10) und (2).....	19
Tabelle 3-5: Übersicht über die wichtigsten epidemiologischen Maßzahlen für Deutschland, ICD-10 C43 (8)	23
Tabelle 3-6: Neuerkrankungen und Inzidenzraten (altersstandardisiert nach Europastandard; pro 100.000 Einwohner) des malignen Melanoms der Haut in Deutschland, ICD-10 C43	25
Tabelle 3-7: Prognose der Inzidenz des malignen Melanoms in Deutschland für die Jahre 2016 bis 2020	26
Tabelle 3-8: Anzahl der GKV-Patienten in der Zielpopulation	27
Tabelle 3-9: Anzahl der Patienten, die 2014 in Deutschland mit Ipilimumab behandelt wurden.....	28
Tabelle 3-10: Anzahl der Patienten, für die ein therapeutisch bedeutsamer Zusatznutzen besteht, mit Angabe des Ausmaßes des Zusatznutzens (zu bewertendes Arzneimittel).....	29
Tabelle 3-11: Angaben zum Behandlungsmodus (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)	35
Tabelle 3-12: Behandlungstage pro Patient pro Jahr (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)	38
Tabelle 3-13: Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)	40
Tabelle 3-14: Kosten des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie.....	49
Tabelle 3-15: Kosten des zu bewertenden Arzneimittels pro Patient und Patientin	51
Tabelle 3-16: Kosten des zu bewertenden Arzneimittels pro mg pro Patient und Patientin....	52
Tabelle 3-17: Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie Dacarbazin pro Patient und Patientin.....	53
Tabelle 3-18: Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie Temozolomid pro Patient und Patientin.....	54
Tabelle 3-19: Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie Paclitaxel pro Patient und Patientin.....	55
Tabelle 3-20: Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie Carboplatin & Paclitaxel pro Patient und Patientin.....	57

Tabelle 3-21: Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen bei Anwendung der Arzneimittel gemäß Fach- oder Gebrauchsinformation (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)	60
Tabelle 3-22: Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen – Kosten pro Einheit	64
Tabelle 3-23: Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen – Zusatzkosten für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie pro Jahr (pro Patient und für die jeweilige Population / Patientengruppe insgesamt).....	66
Tabelle 3-24: Jahrestherapiekosten für die GKV für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie (pro Patient und insgesamt).....	68
Tabelle 3-25: Vereinbarte Maßnahmen nach der Zulassung	82
Tabelle 3-26: Tabellarische Übersicht der Sicherheitsbedenken und Maßnahmen zur Risikominimierung (3)	84
Tabelle 3-27: Vorgaben für eine Unterbrechung oder Absetzen der Behandlung mit KEYTRUDA®	89

Abbildungsverzeichnis

	Seite
Abbildung 3-1: Altersspezifische Erkrankungsdaten nach Geschlecht, Deutschland 2009 – 2010, ICD-10 C43 (8)	24

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ADT	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren e. V
AJCC	American Joint Committee on Cancer
ALM	Akrolentiginöse Melanom
ALT	Alaninaminotransferase
AMIS	Arzneimittelinformationssystem
AM-RL	Arzneimittel-Richtlinie
AST	Aspartataminotransferase
AUC	Target area under the concentration versus time curve in mg/mL*min
CarboTax	Carboplatin plus Paclitaxel
CTLA-4	Cytotoxic T-lymphocyte-associated Protein 4
DDD	Defined Daily Dose
DIMDI	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information
DNA	Desoxyribonukleinsäure
EBM	Einheitlicher Bewertungsmaßstab
ECOG	Eastern Cooperative Oncology Group
EG	Europäische Gemeinschaft
EMA	European Medicines Agency
EPAR	European Public Assessment Report
EU	Europäische Union
FB	Festbetrag
FDA	Food and Drug Administration
G-BA	Gemeinsamer Bundesausschuss
GEKID	Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister e. V.
GFR	Glomeruläre Filtrationsrate
GKV	Gesetzliche Krankenversicherung
GOÄ	Gebührenordnung für Ärzte
HE	Hämatoxylin-Eosin
HIV	Humanes Immundefizienz-Virus
i. v.	intravenös

Abkürzung	Bedeutung
ICD	International Classification of Diseases
IgG4	Humanes Immunglobulin vom G4-Typ
IQWiG	Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
IU	International Unit
KoQK	Kooperationsverbund Qualitätssicherung durch Klinische Krebsregister
LDH	Laktatdehydrogenase
LK	Lymphknoten
LMM	Lentigo-maligna-Melanom
MTIC	5-(3-Methyltriazin-1-yl)imidazol-4-carboxamid; auch: Monomethyl-triazenoimidazol-carboxamid
MwSt.	Mehrwertsteuer
NM	Noduläres Melanom
NSCLC	Non-small cell lung cancer/ nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom
PAES	Post-authorisation efficacy study
PD-1	Programmed death 1
PD-L1	Programmed death-ligand 1
PSUR	Periodic safety update report
RKI	Robert-Koch-Institut
RMP	Risikomanagement-Plan
RNA	Ribonukleinsäure
SGB	Sozialgesetzbuch
SmPC	Summary of product characteristics/ Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels
SSM	Superfiziell spreizendes Melanom
Taxe-VK	Apothekenverkaufspreis
TNM	Tumordicke, Lymphknoten, Fernmetastasierung
TZM	Tumorzentrum München
UICC	Union Internationale Contre le Cancer
ULN	Upper limit of normal/ über dem oberen Normwert
USA	United States of America

3 Modul 3 – allgemeine Informationen

Modul 3 enthält folgende Angaben:

- Bestimmung der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Abschnitt 3.1)
- Bestimmung der Anzahl der Patienten mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen (Abschnitt 3.2)
- Bestimmung der Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung (Abschnitt 3.3)
- Beschreibung der Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung (Abschnitt 3.4)

Alle in diesen Abschnitten getroffenen Aussagen und Kalkulationsschritte sind zu begründen. In die Kalkulation eingehende Annahmen sind darzustellen. Die Berechnungen müssen auf Basis der Angaben nachvollziehbar sein und sollen auch Angaben zur Unsicherheit enthalten.

Die Abschnitte enthalten jeweils einen separaten Abschnitt zur Beschreibung der Informationsbeschaffung sowie eine separate Referenzliste.

Für jedes zu bewertende Anwendungsgebiet ist eine separate Version des vorliegenden Dokuments zu erstellen. Die Kodierung der Anwendungsgebiete ist in Modul 2 hinterlegt. Sie ist je Anwendungsgebiet einheitlich für die übrigen Module des Dossiers zu verwenden.

Im Dokument verwendete Abkürzungen sind in das Abkürzungsverzeichnis aufzunehmen. Sofern Sie für Ihre Ausführungen Abbildungen oder Tabellen verwenden, sind diese im Abbildungs- bzw. Tabellenverzeichnis aufzuführen.

3.1 Bestimmung der zweckmäßigen Vergleichstherapie

Zweckmäßige Vergleichstherapie ist diejenige Therapie, deren Nutzen mit dem Nutzen des zu bewertenden Arzneimittels verglichen wird. Näheres hierzu findet sich in der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses.

Die zweckmäßige Vergleichstherapie ist regelhaft zu bestimmen nach Maßstäben, die sich aus den internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin ergeben. Bei mehreren Alternativen ist die wirtschaftlichere Therapie zu wählen, vorzugsweise eine Therapie, für die ein Festbetrag gilt. Die zweckmäßige Vergleichstherapie muss eine nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zweckmäßige Therapie im Anwendungsgebiet sein, vorzugsweise eine Therapie, für die Endpunktstudien vorliegen und die sich in der praktischen Anwendung bewährt hat, soweit nicht Richtlinien oder das Wirtschaftlichkeitsgebot dagegen sprechen.

Bei der Bestimmung der Vergleichstherapie sind insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen:

1. Sofern als Vergleichstherapie eine Arzneimittelanwendung in Betracht kommt, muss das Arzneimittel grundsätzlich eine Zulassung für das Anwendungsgebiet haben.
2. Sofern als Vergleichstherapie eine nichtmedikamentöse Behandlung in Betracht kommt, muss diese im Rahmen der GKV erbringbar sein.
3. Als Vergleichstherapie sollen bevorzugt Arzneimittelanwendungen oder nichtmedikamentöse Behandlungen herangezogen werden, deren patientenrelevanter Nutzen durch den G-BA bereits festgestellt ist.
4. Die Vergleichstherapie soll nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zur zweckmäßigen Therapie im Anwendungsgebiet gehören.
5. Bei mehreren Alternativen ist die wirtschaftlichere Therapie zu wählen, vorzugsweise eine Therapie, für die ein Festbetrag gilt.

Für Arzneimittel einer Wirkstoffklasse ist unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien die gleiche zweckmäßige Vergleichstherapie heranzuziehen, um eine einheitliche Bewertung zu gewährleisten. Die zweckmäßige Vergleichstherapie muss auch geeignet sein für Bewertungen von Arzneimitteln auf Veranlassung des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 35a Absatz 6 SGB V, die vor dem 1. Januar 2011 in den Verkehr gebracht worden sind.

Zur zweckmäßigen Vergleichstherapie kann ein Beratungsgespräch mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss stattfinden. Näheres dazu findet sich in der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses.

3.1.1 Benennung der zweckmäßigen Vergleichstherapie

Benennen Sie die zweckmäßige Vergleichstherapie für das Anwendungsgebiet, auf das sich das vorliegende Dokument bezieht.

KEYTRUDA[®] (Pembrolizumab) ist in Monotherapie zur Behandlung des fortgeschrittenen (nicht resezierbaren oder metastasierenden) Melanoms bei Erwachsenen angezeigt.

Das unter Kodierung A des vorliegenden Dossiers untersuchte Teilanwendungsgebiet beinhaltet Patienten der G-BA relevanten Population „vorbehandelte Patienten mit fortgeschrittenem Melanom“.

Für die Population „**vorbehandelte Patienten**“ hat der G-BA eine patientenindividuelle Therapie nach Maßgabe des behandelnden Arztes unter Berücksichtigung des Zulassungsstatus und der jeweiligen Vortherapie als zweckmäßige Vergleichstherapie bestimmt.

Patienten, für welche die Resektion und/oder Strahlentherapie mit kurativer Zielsetzung angezeigt ist, stellen innerhalb der vom Anwendungsgebiet umschriebenen Patientengruppe Ausnahmefälle dar und werden im Rahmen der vorliegenden Fragestellung nicht betrachtet. Als Zielpopulation wird von denjenigen Patienten ausgegangen, für die eine Resektion und/oder Strahlentherapie mit kurativer Zielsetzung nicht angezeigt ist (1).

MSD folgt der Entscheidung des G-BA hinsichtlich der festgelegten zweckmäßigen Vergleichstherapie. Die Chemotherapeutika Dacarbazin, Temozolomid, Paclitaxel und die Kombinationstherapie Carboplatin + Paclitaxel entsprechen der Vorgabe der vom G-BA geforderten patientenindividuellen Therapie für die betrachtete Patientenpopulation und werden hier als zweckmäßige Vergleichstherapie herangezogen.

3.1.2 Begründung für die Wahl der zweckmäßigen Vergleichstherapie

Geben Sie an, ob ein Beratungsgespräch mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss zum Thema „zweckmäßige Vergleichstherapie“ stattgefunden hat. Falls ja, geben Sie das Datum des Beratungsgesprächs und die vom Gemeinsamen Bundesausschuss übermittelte Vorgangsnummer an und beschreiben Sie das Ergebnis dieser Beratung hinsichtlich der Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie. Sofern ein Beratungsprotokoll erstellt wurde, benennen Sie dieses als Quelle (auch in Abschnitt 3.1.4).

Ergebnis der G-BA Beratung

Das Beratungsgespräch mit dem G-BA zur zweckmäßigen Vergleichstherapie für Pembrolizumab zur Behandlung von Patienten mit nicht resezierbarem oder metastasiertem Melanom bei Erwachsenen fand am 29. Oktober 2014 statt (Beratungsanforderung 2014-B-077). Als zweckmäßige Vergleichstherapie für die Population „vorbehandelte Patienten“ hat der G-BA eine patientenindividuelle Therapie nach Maßgabe des behandelnden Arztes unter Berücksichtigung des Zulassungsstatus und der jeweiligen Vortherapie bestimmt. Die Niederschrift zum Beratungsgespräch liegt dem Dossier bei (1).

Die Geschäftsstelle erläutert die Herleitung der zweckmäßigen Vergleichstherapie auf der Grundlage des 5. Kapitels § 6 der Verfahrensordnung des G-BA wie folgt.

Generell zugelassen zur Behandlung von Patienten mit nicht resezierbarem oder metastasierendem Melanom sind Dabrafenib, Dacarbazin, Ipilimumab, Lomustin und Vemurafenib. Im vorliegenden Anwendungsgebiet kommen grundsätzlich die Resektion und/oder die Strahlentherapie als nicht-medikamentöse Behandlung in Betracht. Patienten, für welche die Resektion und/oder Strahlentherapie mit kurativer Zielsetzung angezeigt ist, stellen innerhalb der vom Anwendungsgebiet umschriebenen Patientengruppe Ausnahmefälle dar und werden im Rahmen der vorliegenden Fragestellung nicht betrachtet. Als Zielpopulation wird von denjenigen Patienten ausgegangen, für die eine Resektion und/oder Strahlentherapie mit kurativer Zielsetzung nicht angezeigt ist. Eine nicht-medikamentöse Behandlung kommt daher als zweckmäßige Vergleichstherapie nicht in Betracht. Der Einsatz der Resektion und/oder der Strahlentherapie als palliative Therapieoptionen bleibt davon unberührt. Relevante Beschlüsse, Bewertungen oder Empfehlungen des G-BA liegen im betreffenden Anwendungsgebiet für Ipilimumab, Dabrafenib und Vemurafenib sowie in Anlage VI Teil B der Arzneimittelrichtlinie (Off-Label Use) über die Nichtverordnungsfähigkeit von Interleukin-2 in der systemischen Anwendung beim metastasierenden malignen Melanom vor. Der allgemeine Stand der medizinischen Erkenntnisse, auf dem die Entscheidung des G-BA beruht, wurde durch eine systematische Recherche nach Leitlinien sowie Übersichtsarbeiten zu klinischen Studien in der vorliegenden Indikation abgebildet.

Zur zweckmäßigen Vergleichstherapie bei vorbehandelten Patienten merkt die Geschäftsstelle an, dass keine Standardtherapie für das formulierte Anwendungsgebiet existiert und keine Evidenz für die Bevorzugung eines Arzneimittels vorliegt. Die Therapieauswahl in der klinischen Praxis erfolgt patientenindividuell, u. a. unter Berücksichtigung der jeweiligen Vortherapie. Somit sind von der zweckmäßigen Vergleichstherapie alle im Anwendungsgebiet zugelassenen Arzneimittel umfasst. Im Dossier ist für den Nachweis des Zusatznutzens für Pembrolizumab bei vorbehandelten Patienten der Vergleich gegenüber einer patientenindividuellen Therapie nach Maßgabe des Arztes, unter Berücksichtigung des Zulassungsstatus und der jeweiligen Vortherapie, abzubilden. Für die Studienpopulation ist darzustellen, dass hier für jeden Patienten individuell die jeweils optimale Therapieoption nach Maßgabe des Arztes gewählt wurde (1).

Operationalisierung der zweckmäßigen Vergleichstherapie

MSD folgt der Entscheidung des G-BA hinsichtlich der festgelegten zweckmäßigen Vergleichstherapie als patientenindividuelle Therapie nach Maßgabe des behandelnden Arztes unter Berücksichtigung der jeweiligen Vortherapie. Wie vom G-BA festgestellt, existiert keine Standardtherapie für das formulierte Anwendungsgebiet und es liegt keine Evidenz für die Bevorzugung eines Arzneimittels vor. Die Therapieauswahl in der klinischen Praxis erfolgt patientenindividuell, insbesondere unter Berücksichtigung der jeweiligen Vortherapie.

Die angezeigte individuelle Therapie dieser Patienten erfolgt in der klinischen Praxis mit Wirkstoffen, die von deutschen und internationalen Leitlinien empfohlen werden.

Für die Interpretation der zweckmäßigen Vergleichstherapie in dieser Population benötigt es zunächst einer grundsätzlichen Betrachtung: Im klinischen Alltag stehen für die Behandlung des malignen Melanoms derzeit drei unterschiedliche Wirkansätze zu Verfügung, die bei der patientenindividuellen Therapie berücksichtigt werden müssen.

Diese sind 1) Checkpoint-Inhibition mit dem CTLA-4 Antikörper Ipilimumab, 2) die BRAF-Inhibitoren Vemurafenib oder Dabrafenib bei Patienten mit BRAF-V600-Mutation und 3) die Gruppe der Chemotherapien.

Jeder dieser drei genannten Ansätze wirkt auf eine unterschiedliche Weise. Ipilimumab wirkt indirekt über Aktivierung des Immunsystems und eine immun-vermittelte Reaktion gegen die Tumorzellen. Die BRAF-Inhibitoren sind sogenannte „Targeted Therapies“, die gezielt in einen pathologischen intrazellulären Signalweg in den Tumorzellen eingreifen und somit das Tumorstadium einschränken. Die Chemotherapien umfassen verschiedene Substanzklassen, die eine allgemeine zytotoxische Wirkung haben und die beispielsweise durch eine Hemmung der DNA-Replikation wirken. Damit sind die Chemotherapien deutlich unspezifischer als Ipilimumab oder die BRAF-Inhibitoren.

In klinischen Studien haben sich Ipilimumab und die BRAF-Inhibitoren der Chemotherapie als überlegen erwiesen. Dadurch wurden die Chemotherapien in spätere Therapielinien gedrängt (2-4). Diese Unterschiede in der Wirksamkeit spiegeln sich entsprechend in der deutschen S3-Leitlinie zum malignen Melanom wider, die sowohl für die Behandlung mit Ipilimumab, als auch mit einem BRAF-Inhibitor, d. h. Vemurafenib oder Dabrafenib, für BRAF-mutierte Patienten, jeweils den Empfehlungsgrad A erhalten haben. Dies entspricht einer „Soll“-Empfehlung (5).

Für Ipilimumab ist ein sogenanntes „Induktionsschema“ von insgesamt vier Infusionen alle drei Wochen vorgeschrieben, weitere Gaben über diese vier Dosen hinaus sind nicht vorgesehen (6).

Gemäß Fachinformation ist für Vemurafenib die Anwendung auf Patienten mit BRAF-V600-Mutation beschränkt. Zudem soll die Behandlung nur bis zur Krankheitsprogression fortgeführt werden (7).

Damit ist eine erneute Anwendung dieser beiden Wirkstoffklassen nach Progression der Krebserkrankung nicht möglich.

Aus dem Genannten ergibt sich für die hier zu betrachtende Patientenpopulation („mit *Ipilimumab* vorbehandelte Patienten“) folgendes:

- Für Patienten, die bereits mit einem BRAF-/MEK-Inhibitor vorbehandelt sind, und deren Erkrankung unter oder nach Ipilimumab fortschreitet, kommt nur noch eine **Chemotherapie** als Behandlung in Frage.

- Für Patienten, die bereits mit einem BRAF-/MEK-Inhibitor und einer Chemotherapie vorbehandelt sind, und deren Erkrankung unter oder nach Ipilimumab fortschreitet, kommt nur noch eine weitere **Chemotherapie** als Behandlung in Frage.
- Für Patienten, die bereits mit einer Chemotherapie vorbehandelt sind, und deren Erkrankung unter oder nach Ipilimumab fortschreitet, kommt, sofern diese BRAF-V600-negativ sind, nur noch eine weitere **Chemotherapie** als Behandlung in Frage.
- Für Patienten, die bereits mit einer Chemotherapie vorbehandelt sind, und deren Erkrankung unter oder nach Ipilimumab fortschreitet, kommt, sofern diese BRAF-V600-positiv sind, eine Therapie mit einem BRAF-/MEK-Inhibitor oder eine weitere **Chemotherapie** als Behandlung in Frage.

Dieses Vorgehen entspricht auch den aktuellen Empfehlungen in deutschen und internationalen Leitlinien: Dacarbazin und Temozolomid werden dabei beide als Monochemotherapien in der S3-Leitlinie empfohlen, und explizit als wirkäquivalent klassifiziert ("Level of Evidence 1b") (5). Sowohl Dacarbazin als auch Temozolomid sind Vorläufer-Moleküle des aktiven Metaboliten 5-(3-Methyltriazin-1-yl)imidazol-4-carboxamid (MTIC) (5). Beide Substanzen sind in Deutschland grundsätzlich zugelassen. MSD sieht deshalb Dacarbazin und Temozolomid gleichwertig als zweckmäßige Vergleichstherapie bei dieser Patientenpopulation an.

Bei Patienten, die bereits mit einer Chemotherapie vorbehandelt sind, muss bei Initiierung einer weiteren Chemotherapie eine zur initialen Chemotherapie unterschiedlich wirkende Substanz verwendet werden, da beim malignen Melanom der Mechanismus der Chemoresistenz beschrieben ist.

Es wurde gezeigt, dass Tumorzellen im malignen Melanom entweder primär resistent gegen Chemotherapeutika sein können, oder unter Behandlung häufig eine sekundäre Resistenz entwickeln können (8, 9). Aus diesem Grund ist es beispielsweise nicht sinnvoll, nach Krankheitsprogression unter einer Chemotherapie mit dem aktiven Metaboliten MTIC noch einmal mit der gleichen Substanz zu therapieren. So kann nach Dacarbazin nicht noch einmal mit Dacarbazin oder Temozolomid behandelt werden, genauso wenig wie mit Dacarbazin nach Temozolomid.

Für diese Patienten kommen, entsprechend Leitlinienempfehlungen, Paclitaxel-basierte Chemotherapien, entweder als Monochemotherapie oder in Kombination mit Carboplatin in Frage (5, 10, 11). Diese Chemotherapieregime sind zudem in Deutschland Versorgungsrealität und werden auch erstattet. Dem behandelnden Arzt ist auch aus ethischen Gründen geboten, diesen Patienten eine weitere Behandlungsoption anzubieten. Von Patienten wird zudem in der Mehrzahl nach Versagen einer vorherigen Chemotherapie eine weitere Chemotherapie gewünscht (12).

Fazit

Die Chemotherapeutika Dacarbazin, Temozolomid, Paclitaxel und die Kombinationstherapie Carboplatin + Paclitaxel entsprechen der Vorgabe der vom G-BA geforderten patientenindividuellen Therapie für die betrachtete Patientenpopulation und werden hier als zweckmäßige Vergleichstherapie herangezogen.

Falls ein Beratungsgespräch mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss zum Thema „zweckmäßige Vergleichstherapie“ nicht stattgefunden hat oder in diesem Gespräch keine Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie erfolgte oder Sie trotz Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie in dem Beratungsgespräch eine andere zweckmäßige Vergleichstherapie für die vorliegende Bewertung ausgewählt haben, begründen Sie die Wahl der Ihrer Ansicht nach zweckmäßigen Vergleichstherapie. Benennen Sie die vorhandenen Therapieoptionen im Anwendungsgebiet, auf das sich das vorliegende Dossier bezieht. Äußern Sie sich bei der Auswahl der zweckmäßigen Vergleichstherapie aus diesen Therapieoptionen explizit zu den oben genannten Kriterien 1 bis 5. Benennen Sie die zugrunde gelegten Quellen.

Nicht zutreffend.

3.1.3 Beschreibung der Informationsbeschaffung für Abschnitt 3.1

Erläutern Sie das Vorgehen zur Identifikation der in Abschnitt 3.1.2 genannten Quellen (Informationsbeschaffung). Sofern erforderlich, können Sie zur Beschreibung der Informationsbeschaffung weitere Quellen benennen.

Grundlage ist die Niederschrift zum Beratungsgespräch vom 29. Oktober 2014 (1).

Zusätzlich zur systematischen Leitlinien- und Evidenzrecherche, die der G-BA im Rahmen der Beratung zur zweckmäßigen Vergleichstherapie durchgeführt hat, erfolgte eine orientierende Recherche hinsichtlich der jüngst publizierten Leitlinien in Deutschland, den USA sowie auf europäischer Ebene.

3.1.4 Referenzliste für Abschnitt 3.1

Listen Sie nachfolgend alle Quellen (z. B. Publikationen), die Sie in den Abschnitten 3.1.2 und 3.1.3 angegeben haben (als fortlaufend nummerierte Liste). Verwenden Sie hierzu einen allgemein gebräuchlichen Zitierstil (z. B. Vancouver oder Harvard). Geben Sie bei Fachinformationen immer den Stand des Dokuments an.

1. Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA). Niederschrift (finale Fassung) zum Beratungsgespräch gemäß § 8 AM-NutzenV Beratungsanforderung 2014-B-077 Pembrolizumab zur Behandlung des nicht resezierbaren oder metastasierten Melanoms. Stand: 03.12. 2014.
2. Robert C, Thomas L, Bondarenko I, et al. Ipilimumab plus dacarbazine for previously untreated metastatic melanoma. *N Engl J Med.* 2011;364(26):2517-26.
3. Hauschild A, Grob J-J, Demidov LV, et al. Dabrafenib in BRAF-mutated metastatic melanoma: a multicentre, open-label, phase 3 randomised controlled trial. *The Lancet.* 2012;380(9839):358-65.
4. Richman J, Martin-Liberal J, Diem S, Larkin J. BRAF and MEK inhibition for the treatment of advanced BRAF mutant melanoma. *Expert Opinion Pharmacother.* 2015:1285-97.
5. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), Deutschen Krebsgesellschaft (DKG), Deutschen Krebshilfe. Leitlinienprogramm Onkologie: Malignes Melanom S3-Leitlinie „Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Melanoms“, Version 1.1, Langversion. Stand: Februar 2013. URL: <http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/032-024OL.html>. Zugriff am: 14.07.2015.
6. BRISTOL-MYERS SQUIBB. Fachinformation YERVOY® (Ipilimumab). Stand: Juni 2015. URL: www.fachinfo.de. Zugriff am: 14.07.2015.
7. ROCHE. Fachinformation ZELBORAF® (Vemurafenib). Stand: April 2015. URL: www.fachinfo.de. Zugriff am: 14.07.2015.
8. Schadendorf D, Czarnetzki M. Chemoresistenz des malignen Melanoms. Mechanismen und Modulationsmöglichkeiten. *Der Hautarzt: Zeitschrift für Dermatologie, Allergologie, Venerologie und verwandte Gebiete.* 1994;45:678-84.
9. Tawbi HA, Buch SC. Chemotherapy resistance abrogation in metastatic melanoma. *Clinical advances in hematology & oncology : H&O.* 2010;8(4):259-66.
10. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology – Melanoma, Version 3.2015. 2015.
11. Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO). Melanom Leitlinie, Stand: Oktober 2014. URL: <https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/melanom/@@view/html/index.html>. Zugriff am: 14.07.2015.
12. Hofmann MA, Hauschild A, Mohr P, et al. Prospective evaluation of supportive care with or without CVD chemotherapy as a second-line treatment in advanced melanoma by patient's choice: a multicentre Dermatologic Cooperative Oncology Group trial. *Melanoma research.* 2011;21(6):516-23.

3.2 Anzahl der Patienten mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen

3.2.1 Beschreibung der Erkrankung und Charakterisierung der Zielpopulation

Geben Sie einen kurzen Überblick über die Erkrankung (Ursachen, natürlicher Verlauf), zu deren Behandlung das zu bewertende Arzneimittel eingesetzt werden soll und auf die sich das vorliegende Dokument bezieht. Insbesondere sollen die wissenschaftlich anerkannten Klassifikationsschemata und Einteilungen nach Stadien herangezogen werden. Berücksichtigen Sie dabei, sofern relevant, geschlechts- und altersspezifische Besonderheiten. Charakterisieren Sie die Patientengruppen, für die die Behandlung mit dem Arzneimittel gemäß Zulassung infrage kommt (im Weiteren „Zielpopulation“ genannt). Die Darstellung der Erkrankung in diesem Abschnitt soll sich auf die Zielpopulation konzentrieren. Begründen Sie Ihre Aussagen durch Angabe von Quellen.

Das maligne Melanom der Haut

Das Melanom ist ein bösartiger Tumor, der durch Entartung von melanozytären Zellen (Pigmentzellen) entsteht. Dieses Dossier beschreibt das maligne Melanom der Haut, das kutane Melanom. Die ICD-10-GM Kodierung lautet: C43 Bösartiges Melanom der Haut (1).

Kennzeichen des malignen Melanoms ist eine hohe Metastasierungsrate mit schlechter Prognose insbesondere in fortgeschrittenen Stadien. Das maligne Melanom verursacht 90 % aller durch Hautkrebs bedingten Sterbefälle (2).

In der Regel haben Patienten mit einem Melanom der Haut zum Zeitpunkt der primären Diagnose keine Beschwerden. Gelegentlich führen Juckreiz oder eine kleine Blutung aus dem Tumor zu einem Arztbesuch. Die recht geringe Symptomatik, die oft auch bei Metastasierung moderat ist, steht dabei im starken Widerspruch zur schlechten Prognose der Erkrankung. Wichtig für die Prognose ist die Eindringtiefe des Primärtumors: In tieferen Hautschichten bekommen die entarteten Krebszellen Zugang zu den Blut- und Lymphgefäßen und können in andere Organe (z. B. Lunge, Knochen, Leber, Gehirn) bzw. in die Lymphknoten metastasieren (3).

Klinische Typen des Melanoms

Das Melanom ist ein Tumor, der bei Jugendlichen und Erwachsenen auftritt und sich in über 90 % der Fälle als ein Primärtumor der Haut entwickelt. Das maligne Melanom geht von den Pigmentzellen (Melanozyten) der basalen Epidermisschichten oder auch der Dermis aus (4).

Als die vier kutanen Haupttypen des malignen Melanoms gelten das superfiziell spreizende Melanom (SSM, Häufigkeit ca. 60 %), das noduläre Melanom (NM, Häufigkeit ca. 20 %), das Lentigo-maligna-Melanom (LMM, Häufigkeit ca. 10 %) und das akrolentiginöse Melanom (ALM, Häufigkeit ca. 5 %). Die restlichen 5 % erfassen seltene Melanom-Varianten. Hierzu gehören z. B. das Melanom der Schleimhäute, das desmoplastische Melanom und das Melanom bei unbekanntem Primärtumor (4).

Risikofaktoren und Früherkennung

Als wichtigster exogener Risikofaktor gilt eine übermäßige Exposition gegenüber ultraviolettem (UV-) Licht (5, 6). Bei ca. 50 % der Patienten mit einem malignen Melanom liegt zudem eine sogenannte BRAF-V600-Mutation vor (7).

Gesetzlich Versicherte haben ab dem Alter von 35 Jahren alle zwei Jahre Anspruch auf eine Hautuntersuchung durch einen Arzt mit entsprechender Fortbildung (8). Das Auftreten von Metastasen nach vollständiger Entfernung des Primärtumors wird in der Regel im Rahmen einer risikoadaptierten Nachsorgeuntersuchung entdeckt (9). Die Teilnahme an der Nachsorge wird über einen Zeitraum von zehn Jahren empfohlen (Empfehlungsgrad B, Level of Evidence 1b-) (2).

Stadieneinteilung/Klassifikation des primären kutanen Melanoms

Klassifikation und Stadieneinteilung des kutanen Melanoms erfolgen anhand der international anerkannten Richtlinien des American Joint Committee on Cancer (AJCC) (Tabelle 3-1).

Diese Klassifikation wurde auch von der Union Internationale Contre le Cancer (UICC) übernommen. Eine weitere Einteilung, die bei der Prognose eine Rolle spielt, ist die TNM-Klassifikation nach Tumordicke, Lymphknoten und Fernmetastasierung (Tabelle 3-2, Tabelle 3-3, Tabelle 3-4). Bei Patienten mit regionären Metastasen wird die Anzahl der befallenen Lymphknoten, sowie die Tumorlast und Ulzeration des Primärtumors zur Stadieneinteilung herangezogen. Bei Patienten mit Fernmetastasen bestimmt die Lokalisation der Metastasen (nicht-viszeral vs. Lunge vs. viszeral) und ein erhöhter Serum Laktatdehydrogenase (LDH-) Wert das Stadium der Metastasierung (10).

Primäre Melanome, die aufgrund ihrer Lokalisation oder anderer Ursachen nicht reseziert werden können, werden wie die metastasierenden Melanome als fortgeschrittene Melanome klassifiziert.

Tabelle 3-1: Stadieneinteilung des Melanoms nach (10) und (2)

Stadium	Primärtumor (pT, Tumordicke in mm)	Regionäre Lymphknotenmetastasen (N)	Fernmetastasen (M)
0	In-situ-Tumore (primär nicht invasiv)	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
IA	≤ 1,0 mm, keine Ulzeration	Keine	Keine
IB	≤ 1,0 mm mit Ulzeration oder Mitoserate/mm ² ≥ 1		
	1,01–2,0 mm, keine Ulzeration		
IIA	1,01–2,0 mm mit Ulzeration		
	2,01–4,0 mm, keine Ulzeration		
IIB	2,01–4,0 mm mit Ulzeration		
	> 4,0 mm, keine Ulzeration		
IIC	> 4,0 mm mit Ulzeration		
IIIA	Jede Tumordicke, keine Ulzeration	Mikroskopische Metastasen (klinisch okult) in bis zu 3 Lymphknoten	
IIIB	Jede Tumordicke mit Ulzeration	Mikroskopische Metastasen (klinisch okult) in bis zu 3 Lymphknoten	
	Jede Tumordicke, keine Ulzeration	Bis zu drei makroskopische nodale Metastasen	
	Jede Tumordicke, keine Ulzeration	Keine, aber Satelliten- und/ oder In-transit-Metastasen	
IIIC	Jede Tumordicke mit Ulzeration	Bis zu drei makroskopische nodale Metastasen oder Satellit(en) oder In-transit-Metastase(n) ohne regionäre Lymphknotenmetastasen	
	Jede Tumordicke ± Ulzeration	Vier oder mehr makroskopische nodale Metastasen Lymphknotenmetastasen oder verbackene Lymphknoten oder Satelliten und/oder In-transit-Metastasen mit regionären Lymphknotenmetastasen	
IV			Fernmetastasen

Tabelle 3-2: T-Klassifikation des Primärtumors beim Melanom nach (10) und (2)

T-Klassifikation	Tumordicke	Weitere prognostische Parameter
Tis		Melanoma In-situ, keine Tumorinvasion
Tx	Keine Angabe	Stadium nicht bestimmbar ^a
T1	≤ 1,0 mm	a: ohne Ulzeration, Mitosen <1/mm ² b: mit Ulzeration oder Mitoserate /mm ² ≥ 1
T2	1,01–2,0 mm	a: ohne Ulzeration b: mit Ulzeration
T3	2,01–4,0 mm	a: ohne Ulzeration b: mit Ulzeration
T4	> 4,0 mm	a: ohne Ulzeration b: mit Ulzeration
a: Fehlen einer Bestimmung der Tumordicke und/oder Ulzeration oder unbekannter Primärtumor; die Bestimmung der Mitoserate erfolgt am HE-Schnitt.		

Tabelle 3-3: N-Klassifikation der regionären Lymphknoten beim Melanom nach (10) und (2)

N Klassifikation	Zahl metastatisch befallener Lymphknoten (LK)	Ausmaß der Lymphknotenmetastasierung
N1	1 LK	a: nur mikroskopische Metastase(n) (klinisch okkult) b: nur makroskopische Metastase(n) (klinisch nachweisbar)
N2	2–3 LK	a: nur mikroskopisch nodale Metastase(n) b: nur makroskopische nodale Metastase(n) c: Satellit(en) oder In-transit-Metastase(n) ohne regionäre Lymphknotenmetastasen
N3	≥ 4 LK, oder verbackene Lymphknoten oder Satelliten oder In-transit-Metastasen <i>mit</i> regionärer Lymphknotenbeteiligung	

Tabelle 3-4: M-Klassifikation der Fernmetastasen beim Melanom nach (10) und (2)

M Klassifikation	Art der Fernmetastasierung	LDH
M1a	Metastasen in Haut, Subkutis oder Lymphknoten jenseits der regionären Lymphknoten	Normal
M1b	Lungenmetastase(n)	Normal
M1c	Fernmetastase(n) anderer Lokalisation oder Fernmetastase(n) jeder Lokalisation mit erhöhten Serumwerten der Lactatdehydrogenase (LDH)	Normal Erhöht
Zu der Klassifikation M1a werden auch die iliakalen Lymphknoten gezählt.		

Überlebensraten bei Patienten mit malignem Melanom

Lokalisiertes kutanes Melanom (Stadium I und II)

Das 5- und 10-Jahres-Überleben basierend auf der TNM-Klassifizierung (s. Tabelle 3-2, Tabelle 3-3 und Tabelle 3-4) liegt zwischen 97 % bzw. 93 % für Patienten mit T1aN0M0 Melanomen und 53 % bzw. 39 % bei Patienten mit T4bN0M0 Melanomen, d. h. bei dünnen Tumoren ohne Ulzeration sind die Überlebensraten sehr gut, verschlechtern sich aber mit Zunahme der Tumordicke und bei Ulzeration des Primärtumors (10).

Primärtumore, die aufgrund ihrer Lokalisation nicht reseziert werden können werden so wie die fernmetastasierenden Melanome (Stadium IV) als fortgeschrittenes Melanom klassifiziert.

Metastasiertes kutanes Melanom (Stadium III)

Basierend auf der TNM-Klassifizierung (s. Tabelle 3-2, Tabelle 3-3 und Tabelle 3-4) rangieren die 5-Jahres-Überlebensraten zwischen 70 % bei Patienten mit T1-4N1aM0 Melanomen und 39 % bei Patienten mit T1-4N3M0 Melanomen. In Abwesenheit von Lymphknotenmetastasen ist das 5- und 10-Jahres-Überleben bei Patienten mit intralymphatischen Metastasen (N2c) 69 % bzw. 52 %, während bei Patienten mit intralymphatischen plus Lymphknotenmetastasen die Überlebensraten bei 46 % bzw. 33 % liegen.

Das 5-Jahres-Überleben nach Untergruppen des Stadium III sind 78 %, 59 % und 40 % für die Stadien IIIA, IIIB und IIIC (10).

Fernmetastasiertes kutanes Melanom (Stadium IV)

Eine Fernmetastasierung beinhaltet Tumorabsiedlungen außerhalb der regionären Lymphknoten.

Die weitere Differenzierung in drei Untergruppen (M1a, M1b und M1c) ergibt sich aus der Lokalisation der Metastasen und dem LDH-Serumspiegel (Tabelle 3-4). Eine Fernmetastasierung ist fast immer unheilbar und mit einer sehr schlechten Prognose

verbunden. In solch einem fortgeschrittenen Stadium liegt bei der aktuellen Standardtherapie die mediane Überlebenszeit – abhängig vom BRAF-Mutationsstatus – bei lediglich sechs bis 18 Monaten. Als prognostisch ungünstige Faktoren für das Überleben wurden ein erhöhter ECOG-Leistungsstatus (ECOG > 0), erhöhte Serum-LDH-Spiegel, viszerale Metastasen und männliches Geschlecht identifiziert (11, 12). Das Alter hat keinen Einfluss auf die Prognose (11, 12).

Fernmetastasierte Melanome (Stadium IV) – wie auch Primärtumore, die aufgrund ihrer Lokalisation nicht reseziert werden können – werden als fortgeschrittenes Melanom klassifiziert.

Definition des nicht-resezierbaren oder metastasierenden Melanoms

Bei Patienten mit primärem bzw. regional oder fernmetastasierendem Melanom wird bei kurativem Therapieanspruch regelhaft eine vollständige operative Entfernung des Karzinomgewebes (R0-Resektion) angestrebt (Ausmaß der Empfehlung: Good Clinical Practice) (2). Beim „nicht resezierbaren“ Melanom handelt es sich somit um eine klinische, patientenindividuelle Einstufung. Grundsätzlich können Melanome aller Stadien klinisch als nicht-resezierbar eingestuft werden, wenn keine R0-Resektion mehr möglich ist. Dies ist auch bei primären bzw. in loco rekurrenten Melanomen des Stadiums AJCC I und II grundsätzlich denkbar, z. B. bei ungünstiger Lokalisation und lokal infiltrierendem Wachstum in vitale Körperstrukturen. Primärtumore, die aufgrund ihrer Lokalisation nicht reseziert werden können, werden wie die metastasierenden Melanome betrachtet. In diesem Fall sind systemische Therapien indiziert (2).

Zielpopulation

Pembrolizumab ist als Monotherapie zur Behandlung des fortgeschrittenen (nicht resezierbaren oder metastasierenden) Melanoms bei Erwachsenen angezeigt.

Die unter Kodierung A des vorliegenden Dossiers zu untersuchende Zielpopulation entspricht dem Teilanwendungsgebiet „Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten“ und umfasst Patienten mit nicht resezierbarem oder metastasierendem Melanom, die mit einem BRAF-/MEK-Inhibitor und/oder einer Chemotherapie vorbehandelt wurden und deren Krebserkrankung unter oder nach Ipilimumab fortschreitet.

3.2.2 Therapeutischer Bedarf innerhalb der Erkrankung

Beschreiben Sie zusammenfassend, welcher therapeutische Bedarf über alle bereits vorhandenen medikamentösen und nicht medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten hinaus innerhalb der Erkrankung besteht. Beschreiben Sie dabei im Überblick, ob und wie dieser Bedarf durch das zu bewertende Arzneimittel gedeckt werden soll. An dieser Stelle ist keine datengestützte Darstellung des Nutzens oder des Zusatznutzens des Arzneimittels vorgesehen, sondern eine allgemeine Beschreibung des therapeutischen Ansatzes. Begründen Sie Ihre Aussagen durch Angabe von Quellen.

Seit Einführung der Frühen Nutzenbewertung im Jahr 2011 haben sich die Therapieoptionen für das fortgeschrittene maligne Melanom deutlich verbessert. Durch die Einführung des

CTLA-4-Antikörpers Ipilimumab, einem sogenannten Immun-Checkpoint-Inhibitor, und den BRAF-Inhibitoren Vemurafenib und Dabrafenib konnten im Vergleich zu den bereits länger verfügbaren Chemotherapien höhere Ansprechraten und eine Verlängerung des Gesamtüberlebens erreicht werden.

Schreitet die Krebserkrankung unter oder nach Ipilimumab und einem BRAF-Inhibitor fort, verbleibt eine Chemotherapie als weitere relevante Therapieoption (2, 13, 14) in der besonderen Versorgungssituation für das unter Kodierung A des vorliegenden Dokuments untersuchte Teilanwendungsgebiet. Dies entspricht auch dem Wunsch der meisten vortherapierten Patienten (15). Für keines der Chemotherapeutika konnte bis dato eine signifikante Verlängerung der Überlebenszeit gezeigt werden (2). Somit besteht für mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten mit fortgeschrittenem (nicht resezierbarem oder metastasierendem) Melanom, deren Krebserkrankung unter oder nach Ipilimumab fortschreitet, ein ungemindert großer therapeutischer Bedarf.

Die Eignung einer Chemotherapie für Patienten mit fortgeschrittenem (nicht resezierbarem oder metastasierendem) Melanom, die mit Ipilimumab vorbehandelt sind und deren Erkrankung unter oder nach Ipilimumab fortschreitet, ist abhängig von der zuvor erhaltenen Chemotherapie. Der Grund dafür ist, dass viele maligne Melanome eine Chemoresistenz aufweisen, also ein geringes Ansprechen auf eine gegebene Chemotherapie, die entweder primär vorhanden sein kann oder sich unter Therapie ausbildet (16, 17).

Im Folgenden werden relevante Behandlungsoptionen, die im Rahmen einer patientenindividuell bestimmten Chemotherapie in Frage kommen, beschrieben.

Chemotherapie mit dem aktiven Metaboliten MTIC (Dacarbazin, Temozolomid)

Der aktive Metabolit in Dacarbazin und Temozolomid ist MTIC (18, 19). Dacarbazin und Temozolomid sind in Deutschland grundsätzlich zugelassen (19, 20). Das alkylierende Zytostatikum Dacarbazin (DTIC) wurde bisher am meisten verwendet und gilt als Standard- bzw. Referenztherapeutikum für Patienten mit metastasierendem Melanom. Ein objektives Ansprechen wurde bei 5–12 % der Patienten in aktuellen Phase-III-Studien beschrieben, wobei nur einzelne Patienten dauerhaft ansprechen (21). In der deutschen S3-Leitlinie wird die Monochemotherapie mit Dacarbazin als eine etablierte Systemtherapie, die Melanompatienten mit nicht-resezierbaren Metastasen angeboten werden kann, eingeordnet (Empfehlungsgrad: niedrig) (2). Hier ist zu beachten, dass die deutsche S3-Leitlinie aus dem Jahr 2013 und somit nicht mehr aktuell ist, da zum Zeitpunkt ihrer Drucklegung Ipilimumab noch keine Erstlinienzulassung hatte (2). Im Gegensatz dazu wird Dacarbazin in den US-amerikanischen Leitlinien von 2015, d. h. nach der FDA Zulassung von Ipilimumab, nur noch in der Spätlinientherapie gesehen (Category 2A- Empfehlung) (14). Die deutsche S3-Leitlinie von 2013 bezeichnet Temozolomid und Dacarbazin explizit als wirkäquivalent ("Level of Evidence 1b") (2). Auch die NCCN-Leitlinie sieht Dacarbazin und Temozolomid als äquivalent ("Category 2A") (14).

Paclitaxel-basierte Chemotherapie (Paclitaxel, Carboplatin + Paclitaxel) sowie Carboplatin Monotherapie

Bei einem Therapieversagen unter einer Chemotherapie mit dem aktiven Metaboliten MTIC (Dacarbazin, Temozolomid), ist eine Chemotherapie mit einer anderen Wirksubstanz indiziert. Der Grund liegt in der oben beschriebenen Chemotherapieresistenz vieler maligner Melanome. Wenn eine erneute Chemotherapie nach vorangegangener Chemotherapie notwendig ist, sollte deshalb eine neue chemotherapeutische Substanz verwendet werden. In diesem Zusammenhang sind unter anderem Paclitaxel-basierte Chemotherapien sowie die Carboplatin Monotherapie relevante Therapieoptionen in der besonderen Versorgungssituation für das unter Kodierung A des vorliegenden Dossiers untersuchte Teilanwendungsgebiet („Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten“).

Paclitaxel, Carboplatin sowie die Kombination aus Paclitaxel plus Carboplatin (CarboTax-Schema) werden als weitere Chemotherapie-Optionen, wenn andere Möglichkeiten bereits ausgeschöpft sind, gesehen (2, 13, 14). In den US-amerikanischen Leitlinien 2015 haben die Chemotherapeutika Dacarbazin, Temozolomid, Paclitaxel sowie Paclitaxel in Kombination mit Carboplatin alle den Empfehlungsgrad 2A erhalten (14). Generell gilt bei Versagen auf eine frühere Chemotherapie die Wahl einer abweichenden Chemotherapie in der nächsten Therapiefolge.

Pembrolizumab

Pembrolizumab ist ein Checkpoint-Inhibitor und wirkt als onkologische Immuntherapie über eine Hemmung des PD-1/PD-L1-Signalweges. Dadurch erkennen zytotoxische T-Zellen die Tumorzellen und eine spezifische Immunreaktion gegen den Tumor kann in Gang kommen.

Die dargestellten Daten im Modul 4A belegen: Pembrolizumab ist im Vergleich zur patientenindividuell bestimmten Chemotherapie die wirksamere und im Allgemeinen besser verträglichere Therapieoption zur Behandlung des fortgeschrittenen (nicht resezierbaren oder metastasierenden) Melanoms. In der Gesamtschau ergibt sich aus dem Hinweis auf erheblichen Zusatznutzen im Gesamtüberleben, Anhaltspunkt auf geringen Zusatznutzen in der Lebensqualität sowie dem Hinweis auf positive und negative Effekte von unterschiedlichem Ausmaß für den Endpunkt Unerwünschte Ereignisse **ein Hinweis auf einen erheblichen Zusatznutzen** von Pembrolizumab im Vergleich zur patientenindividuell bestimmten Chemotherapie.

3.2.3 Prävalenz und Inzidenz der Erkrankung in Deutschland

Geben Sie eine Schätzung für die Prävalenz und Inzidenz der Erkrankung bzw. der Stadien der Erkrankung in Deutschland an, für die das Arzneimittel laut Fach- und Gebrauchsinformation zugelassen ist. Geben Sie dabei jeweils einen üblichen Populationsbezug und zeitlichen Bezug (z. B. Inzidenz pro Jahr, Perioden- oder Punktprävalenz jeweils mit Bezugsjahr) an. Bei Vorliegen alters- oder geschlechtsspezifischer Unterschiede oder von Unterschieden in anderen Gruppen sollen die Angaben auch für

Altersgruppen, Geschlecht bzw. andere Gruppen getrennt gemacht werden. Weiterhin sind Angaben zur Unsicherheit der Schätzung erforderlich. Verwenden Sie hierzu eine tabellarische Darstellung. Begründen Sie Ihre Aussagen durch Angabe von Quellen.

Prävalenz des malignen Melanoms in Deutschland – Datenbasis RKI

Das RKI weist für das maligne Melanom der Haut (ICD-10 Ziffer: C43) in Deutschland für 2010 als 5-Jahres-Prävalenz (Anzahl der lebenden Patienten deren Diagnose fünf Jahre oder weniger zurück liegt) 40.700 Frauen und 38.200 Männer aus. In der Tabelle 3-5 sind die wichtigsten epidemiologischen Maßzahlen für das maligne Melanom der Haut für Deutschland angegeben (8).

Tabelle 3-5: Übersicht über die wichtigsten epidemiologischen Maßzahlen für Deutschland, ICD-10 C43 (8)

	2009		2010		Prognose für 2014	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
Neuerkrankungen	9.640	9.660	9.640	9.580	10.100	9.600
rohe Erkrankungsrate ^a	24,0	23,1	24,0	23,0	25,4	23,4
standardisierte Erkrankungsrate ^{a, b}	18,2	17,9	18,0	17,8	18,0	17,8
mittleres Erkrankungsalter ^c	66	59	66	58		
Sterbefälle	1.454	1.203	1.568	1.143		
rohe Sterberate ^a	3,6	2,9	3,9	2,7		
standardisierte Sterberate ^{a, b}	2,6	1,7	2,8	1,6		
5-Jahres-Prävalenz	35.900	38.800	38.200	40.700		
absolute 5-Jahres-Überlebensrate (2009-2010) ^d			78 (70-83)	86 (80-90)		
relative 5-Jahres-Überlebensrate (2009-2010) ^d			89 (83-95)	94 (88-98)		
a: je 100.000 Personen						
b: altersstandardisiert nach alter Europabevölkerung						
c: Median						
d: in Prozent (niedrigster und höchster Wert der einbezogenen Bundesländer)						

Inzidenz des malignen Melanoms in Deutschland – Datenbasis RKI

Das RKI gibt für das Jahr 2010 in Deutschland 9.580 Frauen und 9.640 Männer (gesamt: 19.220 Personen) an, die neu an einem malignen Melanom erkrankt sind. Dies entspricht einer jährlichen rohen Neuerkrankungsrate von 23,0 Fällen pro 100.000 Frauen und 24,0 Fällen pro 100.000 Männer. Die Prognose für das Jahr 2014 geht von 9.600 Neuerkrankungen bei Frauen und 10.100 Neuerkrankungen bei Männern (gesamt: 19.700 Personen) aus. Die Einführung der ärztlichen Früherkennungsuntersuchung zum Hautkrebs 2008 hatte noch im selben Jahr zu einer starken Zunahme der Erkrankungszahlen am malignen Melanom geführt,

die Erkrankungsrate liegen seitdem etwa 20 % über dem Niveau vor Einführung der ärztlichen Früherkennungsuntersuchung (8).

Das mittlere Erkrankungsalter der Frauen liegt mittlerweile bei 58 Jahren. Männer erkranken im Mittel acht Jahre später. Dem entspricht ein höheres Erkrankungsrisiko und deutlich höhere Erkrankungsrate jüngerer Frauen (unter 55 Jahre) und älterer Männer (über 55 Jahre) (8).




Abbildung 3-1: Altersspezifische Erkrankungsrate nach Geschlecht, Deutschland 2009 – 2010, ICD-10 C43 (8)

Aktuell liegen die relativen 5-Jahres-Überlebensraten in Deutschland für Frauen mit malignem Melanom der Haut bei 94 % und für Männer bei 89 %. Zu diesen Überlebensraten trägt auch bei, dass mehr als die Hälfte der Melanome in einem noch frühen Tumorstadium (T1) entdeckt wird, dieser Anteil hat sich seit Einführung der ärztlichen Früherkennungsuntersuchung 2008 merklich erhöht. Die Sterberate für das maligne Melanom lag im Jahr 2010 für Frauen bei 1,6 (1.143 Sterbefälle), sowie 2,7 bei Männern (1.568 Sterbefälle) (8).

Inzidenz des malignen Melanoms in Deutschland – Datenbasis GEKID

GEKID berichtet für das Jahr 2011 für Deutschland 19.647 neuerkrankte Patienten. Nach Geschlecht aufgeteilt, gibt GEKID für die Jahre 2008 bis 2011 folgende Inzidenzen für Deutschland an (22):

Tabelle 3-6: Neuerkrankungen und Inzidenzraten (altersstandardisiert nach Europastandard; pro 100.000 Einwohner) des malignen Melanoms der Haut in Deutschland, ICD-10 C43

Jahr	Männer		Frauen		Gesamt
	Fallzahl	Inzidenzrate	Fallzahl	Inzidenzrate	Fallzahl
2008	9.547	18,3	9.305	17,0	18.852
2009	9.882	18,6	9.371	17,2	19.253
2010	9.852	18,4	9.753	18,0	19.605
2011	9.875	18,2	9.772	17,6	19.647

Quelle:(22); Datenstand: Dezember 2013

Geben Sie nachfolgend an, ob und, wenn ja, welche wesentlichen Änderungen hinsichtlich Prävalenz und Inzidenz der Erkrankung in Deutschland innerhalb der nächsten 5 Jahre zu erwarten sind. Verwenden Sie hierzu eine tabellarische Darstellung. Begründen Sie Ihre Aussagen durch Angabe von Quellen.

Die Basis für eine Inzidenzprognose der nächsten fünf Jahre stellen die publizierten Fallzahlen der GEKID für das maligne Melanom für Deutschland (Neuerkrankungen) dar, getrennt nach Männern und Frauen (22).

Da nach Einführung des Hautkrebsscreenings im Jahr 2008 die Anzahl der neu diagnostizierten Patienten sprunghaft zunahm und auch in den Jahren 2009 bis 2011 höher als in den Jahren zuvor lag, werden für die Trendprognose nur die Daten der Jahre 2008 bis 2011 (Tabelle 3-6, siehe oben) zu Grunde gelegt. Die geschlechtsspezifischen Inzidenzraten für die Jahre 2016 bis 2020 werden mittels eines linearen Regressionsmodells wie folgt prognostiziert (23):

für Frauen: $y = 179 \cdot x - 349.949,8$; ($R^2 = 0,87$)

für Männer: $y = 95,4 \cdot x - 181.917,3$; ($R^2 = 0,58$)

mit der Anzahl der Neuerkrankungen y und dem Jahr x .

87 % bzw. 58 % der Gesamtvariabilität bei Frauen und Männer können durch das jeweilige Regressionsmodell erklärt werden.

Tabelle 3-7 zeigt, dass basierend auf den oben dargestellten Prognosemodellen die Inzidenz sowohl bei Frauen als auch bei Männern stetig zunimmt:

Tabelle 3-7: Prognose der Inzidenz des malignen Melanoms in Deutschland für die Jahre 2016 bis 2020

Jahr	Männer	Frauen	Gesamt
2016	10.410	10.713	21.123
2017	10.505	10.892	21.397
2018	10.600	11.071	21.671
2019	10.696	11.250	21.946
2020	10.791	11.429	22.220
Quelle: Berechnungen MSD SHARP & DOHME basierend auf (22); Datenstand: Dezember 2013			

Diese Prognose ist mit Unsicherheiten behaftet. Die Erkrankung selbst, krankheitsbegünstigende Faktoren, veränderte Maßnahmen zur Früherkennung sowie die Therapie und Nachsorge des malignen Melanoms können sich ändern und somit Einfluss auf die Prävalenz und Inzidenz haben. Für die kommenden fünf Jahre werden seitens MSD jedoch keine **wesentlichen** Abweichungen von dieser Prognose erwartet.

3.2.4 Anzahl der Patienten in der Zielpopulation

Geben Sie in der nachfolgenden Tabelle 3-8 die Anzahl der Patienten in der GKV an, für die eine Behandlung mit dem zu bewertenden Arzneimittel in dem Anwendungsgebiet, auf das sich das vorliegende Dokument bezieht, gemäß Zulassung infrage kommt (Zielpopulation). Die Angaben sollen sich auf einen Jahreszeitraum beziehen. Berücksichtigen Sie auch, dass das zu bewertende Arzneimittel ggf. an bisher nicht therapierten Personen zur Anwendung kommen kann; eine lediglich auf die bisherige Behandlung begrenzte Beschreibung der Zielpopulation kann zu einer Unterschätzung der Zielpopulation führen.

Generell soll für die Bestimmung des Anteils der Versicherten in der GKV folgende Quelle verwendet werden: Gesetzliche Krankenversicherung – Kennzahlen und Faustformeln – (http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Statistiken/GKV/Kennzahlen_Daten/Kennzahlen_und_Faustformeln_GKV_2001-2012_120903.pdf). Gibt es Hinweise, dass sich dies in einem Krankheitsbild anders verhält, kann unter Angabe der Gründe und entsprechender Nachweise davon abgewichen werden.

Tabelle 3-8: Anzahl der GKV-Patienten in der Zielpopulation

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel)	Anzahl der Patienten in der Zielpopulation (inklusive Angabe der Unsicherheit)	Anzahl der GKV-Patienten in der Zielpopulation (inklusive Angabe der Unsicherheit)
Pembrolizumab	1.178 – 1.472	1.025 – 1.281

Begründen Sie die Angaben in Tabelle 3-8 unter Nennung der verwendeten Quellen. Ziehen Sie dabei auch die Angaben zu Prävalenz und Inzidenz (wie oben angegeben) heran. Alle Annahmen und Kalkulationsschritte sind darzustellen und zu begründen. Die Berechnungen müssen auf Basis dieser Angaben nachvollzogen werden können. Machen Sie auch Angaben zur Unsicherheit, z. B. Angabe einer Spanne.

Die Herleitung zur Abschätzung der Anzahl der Patienten in der Zielpopulation erfolgt analog des vom IQWiG im Rahmen der Nutzenbewertung von Ipilimumab akzeptierten Ansatzes (24). Mangels Daten zur Prävalenz der einzelnen Stadien des malignen Melanoms in Deutschland erfolgt die Berechnung ex-post auf Basis der Anzahl der jährlich an einem malignen Melanom verstorbenen Fälle.

Als Schätzer für die Prävalenz des fortgeschrittenen (nicht resezierbaren oder metastasierenden) Melanoms bei Erwachsenen, die bereits eine Therapie erhalten haben, wird die Mortalität herangezogen. Hierbei wird die Annahme zugrunde gelegt, dass sich alle verstorbenen Patienten zuvor in einem fortgeschrittenen (nicht resezierbaren oder metastasierenden) Stadium befunden hatten. In der Realität können Patienten auch in anderen Tumorstadien versterben, allerdings lässt die Datenlage hier keine genauere Abschätzung zu. Die Todesursachenstatistik des GEKID weist für das Jahr 2012 für Deutschland 2.875 am malignen Melanom Verstorbene aus (25).

Zur Abschätzung der Sterberate wird die Meta-Analyse von Korn (11) herangezogen, die eine 1-Jahres-Überlebensrate im Stadium IV von 25,5 % aufzeigt. Es wird daher angenommen, dass 74,5 % der Patienten im fortgeschrittenen Stadium innerhalb eines Jahres versterben. Es lässt sich vermuten, dass die 1-Jahres-Überlebensrate für Patienten mit nicht resezierbarem oder metastasierenden Melanomen niedrigerer Stadien höher sein könnte. So berichtet Weide bereits 1-Jahres-Überlebensraten von 92,5 % für Patienten bei initialer Diagnose des Stadium III (26). Die hier vorgenommene Abschätzung stellt somit wahrscheinlich eine Unterschätzung dar.

Die Prävalenz des nicht resezierbaren oder metastasierenden Melanoms ergibt auf Basis der 2010 gemeldeten Sterbefälle somit eine Untergrenze von $2.875 / 0,745 = 3.859$ Patienten.

Eine exakte Berechnung der Anzahl von Patienten mit fortgeschrittenem (nicht resezierbarem oder metastasierendem) Melanom, die mit Ipilimumab vorbehandelt sind und deren

Krebserkrankung unter oder nach einer Therapie mit Ipilimumab fortschreitet, ist auf Basis der MSD SHARP & DOHME aktuell verfügbaren Daten nicht möglich.

Näherungsweise wird deshalb die Anzahl von Patienten, die derzeit in Deutschland mit Ipilimumab behandelt werden, auf Basis der von IMS Health berichteten verbrauchten Standardeinheiten für 2014 berechnet (27). Eine Standardeinheit Ipilimumab entspricht einer Infusionsflasche. Diese wird dann abhängig von der Größe der Infusionsflasche in mg umgerechnet. Auf der Basis des Durchschnittsgewichts von 76,3 kg (28) und von vier Dosen pro Behandlungszyklus (29) ergibt sich ein durchschnittlicher Verbrauch von 915,6 mg Ipilimumab pro Patient. Aus der Gegenüberstellung des Gesamtverbrauchs an Ipilimumab in mg und dem mg-Verbrauch pro Patient wird die Anzahl der Patienten abgeleitet.

Versorgungsdaten zeigen, dass nicht alle mit Ipilimumab behandelte Patienten vier Dosen erhalten. Im deutschen Härtefallprogramm erhielten 40 % der Patienten weniger als vier Dosen (30). Dieser Anteil entspricht auch dem Anteil, der in der Zulassungsstudie berichtet wurde (31).

Unter Berücksichtigung dieser Versorgungsdaten wurden ergänzend die Anzahl von Patienten ermittelt unter der Annahme, dass

- A. 100 % der Patienten vier Dosen erhielten
- B. 60 % der Patienten vier Dosen und 40 % drei Dosen erhielten
- C. 60 % der Patienten vier Dosen und 40 % zwei Dosen erhielten

Tabelle 3-9: Anzahl der Patienten, die 2014 in Deutschland mit Ipilimumab behandelt wurden

Ipilimumab	mg/SU	Anzahl SU 2014^a	mg	A Anzahl Patienten^b	B Anzahl Patienten^b	C Anzahl Patienten^b
INF 50 MG 10 ML	50	4.222	211.100	1.178	1.308	1.472
INF 200 MG 40 ML	200	3.916	783.200			
INF FL KONZ 5 MG/ML 10 ML	50	337	16.850			
INF FL KONZ 5 MG/ML 40 ML	200	335	67.000			
a: IMS Combined (DKM + DPM) (27); Daten bei MSD SHARP & DOHME						
b: Durchschnittsgewicht 76,3 kg (28)						

Somit ergeben sich 1.178 bis 1.472 Patienten, die im Jahr 2014 in Deutschland mit Ipilimumab behandelt wurden. Diese Anzahl wird als Obergrenze der Anzahl von Patienten in der Zielpopulation angesehen. Nicht berücksichtigt ist bei diesem Ansatz, dass die Behandlung mit Ipilimumab auch bei Patienten ohne Vortherapie mit einem BRAF-/MEK-

Inhibitor und/oder einer Chemotherapie erfolgt sein könnte, und dass Patienten nach einer erfolgreichen Induktionstherapie eine Re-Induktion mit Ipilimumab erhalten haben könnten.

Der Anteil an GKV-Patienten an der Zielpopulation wird mit 87 % geschätzt.

3.2.5 Angabe der Anzahl der Patienten mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen

Geben Sie in der nachfolgenden Tabelle 3-10 die Anzahl der Patienten an, für die ein therapeutisch bedeutsamer Zusatznutzen besteht, und zwar innerhalb des Anwendungsgebiets, auf das sich das vorliegende Dokument bezieht. Die hier dargestellten Patientengruppen sollen sich unmittelbar aus der Nutzenbewertung in Modul 4 ergeben. Ziehen Sie hierzu die Angaben aus Modul 4, Abschnitt 4.4.3 heran und differenzieren Sie ggf. zwischen Patientengruppen mit unterschiedlichem Ausmaß des Zusatznutzens. Fügen Sie für jede Patientengruppe eine neue Zeile ein.

Tabelle 3-10: Anzahl der Patienten, für die ein therapeutisch bedeutsamer Zusatznutzen besteht, mit Angabe des Ausmaßes des Zusatznutzens (zu bewertendes Arzneimittel)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel)	Bezeichnung der Patientengruppe mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen	Ausmaß des Zusatznutzens	Anzahl der Patienten in der GKV
Pembrolizumab	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	erheblich	1.025 – 1.281

Begründen Sie die Angaben in Tabelle 3-10 unter Nennung der verwendeten Quellen. Ziehen Sie dabei auch die Angaben zu Prävalenz und Inzidenz (wie im Abschnitt 3.2.3 angegeben) heran.

Für alle Patienten des Teilanwendungsgebiet A („Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten“) wurde ein erheblicher Zusatznutzen festgestellt. Die begründenden Daten sind im Detail in Modul 4A dargestellt.

3.2.6 Beschreibung der Informationsbeschaffung für Abschnitt 3.2

Erläutern Sie das Vorgehen zur Identifikation der in den Abschnitten 3.2.1 bis 3.2.5 genannten Quellen (Informationsbeschaffung). Im Allgemeinen sollen deutsche Quellen bzw. Quellen, die über die epidemiologische Situation in Deutschland Aussagen erlauben, herangezogen werden. Weiterhin sind bevorzugt offizielle Quellen zu nutzen. Aktualität und Repräsentativität sind bei der Auswahl zu berücksichtigen und ggf. zu diskutieren. Sofern erforderlich können Sie zur Beschreibung der Informationsbeschaffung weitere Quellen nennen.

Wenn eine Recherche in offiziellen Quellen oder in bibliografischen Datenbanken durchgeführt wurde, sollen Angaben zu den Suchbegriffen, den Datenbanken/Suchoberflächen, dem Datum der Recherche nach den üblichen Vorgaben gemacht werden. Die Ergebnisse der Recherche sollen dargestellt werden, damit nachvollziehbar ist, welche Daten bzw. Publikationen berücksichtigt bzw. aus- und eingeschlossen wurden. Sofern erforderlich, können Sie zur Beschreibung der Informationsbeschaffung weitere Quellen benennen.

Wenn eine (hier optionale) systematische bibliografische Literaturrecherche durchgeführt wurde, soll eine vollständige Dokumentation erfolgen. Die entsprechenden Anforderungen an die Informationsbeschaffung sollen nachfolgend analog den Vorgaben in Modul 4 (siehe Abschnitte 4.2.3.2 Bibliografische Literaturrecherche, 4.3.1.1.2 Studien aus der bibliografischen Literaturrecherche, Anhang 4-A, 4-C) umgesetzt werden.

3.2.1 und 3.2.2

Basis der Informationsbeschaffung für die Abschnitte 3.2.1 und 3.2.2 war eine Leitlinienrecherche zur Ermittlung der Therapieoptionen zur Behandlung des malignen Melanoms. Der Zulassungsstatus der Wirkstoffe wurde über die AMIS-Datenbank des DIMDI und über die Rote Liste ermittelt. Zur Darstellung der grundlegenden Wirkmechanismen der medikamentösen Therapieoptionen und zu wirkstoffspezifischen Angaben wurde auf die jeweilige Fachinformation bzw. publizierte Studien zurückgegriffen sowie eine unsystematische Freihandsuche im Zeitraum November 2014 bis Juni 2015 in der Literaturdatenbank Medline und über Internetverweise durchgeführt.

3.2.3 und 3.2.4

Für die Ermittlung von Daten zur Prävalenz und Inzidenz des malignen Melanoms in Deutschland in den Abschnitten 3.2.3 und 3.2.4 wurden die Internetseiten des Robert-Koch-Institut (RKI), der Gesellschaft epidemiologischer Krebsregister in Deutschland e. V. (GEKID), des Kooperationsverbund Qualitätssicherung durch Klinische Krebsregister (KoQK), der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren e. V. (ADT) und des Tumorregister München des Tumorzentrums München (TzM) herangezogen.

Für die Ermittlung von Daten zur Mortalität wurde die Todesursachenstatistik des GEKID herangezogen.

Ferner wurden alle bisherigen Nutzenbewertungsverfahren mit der Indikation malignes Melanom gesichtet. Bevorzugt wurden Quellen, Vorgehensweisen und Herleitungsansätze verwendet, die in den bisherigen Verfahren bereits akzeptiert wurden.

3.2.5

Die Informationen zur Angabe der Anzahl der Patienten mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen (Abschnitt 3.2.5) basieren auf den Ausführungen in Modul 4A dieses Dossiers. Dort wird anhand der Daten der klinischen Studien der Zusatznutzen von Pembrolizumab dargestellt. Die Daten insbesondere aus den Subgruppenanalysen der klinischen Studien

zeigen, dass für die Zielpopulation keine Unterschiede bezüglich des Ausmaßes des Zusatznutzens zu erwarten sind.

3.2.7 Referenzliste für Abschnitt 3.2

Listen Sie nachfolgend alle Quellen (z. B. Publikationen), die Sie in den Abschnitten 3.2.1 bis 3.2.6 angegeben haben (als fortlaufend nummerierte Liste). Verwenden Sie hierzu einen allgemein gebräuchlichen Zitierstil (z. B. Vancouver oder Harvard). Geben Sie bei Fachinformationen immer den Stand des Dokuments an.

1. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43-C44). 2014. URL: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2014/block-c43-c44.htm>. Zugriff am: 30.10.2014
2. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), Deutschen Krebsgesellschaft (DKG), Deutschen Krebshilfe. Leitlinienprogramm Onkologie: Malignes Melanom S3-Leitlinie „Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Melanoms“, Version 1.1, Langversion. Stand: Februar 2013. URL: <http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/032-024OL.html>. Zugriff am: 14.07.2015.
3. Deutsche Krebsgesellschaft (DKG). Malignes Melanom ("Schwarzer Hautkrebs"). 2015. URL: <http://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/krebsarten/hautkrebs/malignes-melanom-schwarzer-hautkrebs.html>. Zugriff am: 02.07.2015.
4. Hein R, Coras B, Peters B. Klinische Typen. In: Tumorzentrum München, editor. Manual Maligne Melanome: Empfehlungen zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge, 6 Auflage s8-112011.
5. Hodis E, Watson IR, Kryukov GV, et al. A landscape of driver mutations in melanoma. Cell. 2012;150(2):251-63.
6. Berger MF, Hodis E, Heffernan TP, et al. Melanoma genome sequencing reveals frequent PREX2 mutations. Nature. 2012;485(7399):502-6.
7. Flaherty KT, Robert C, Hersey P, et al. Improved survival with MEK inhibition in BRAF-mutated melanoma. N Engl J Med. 2012;367(2):107-14.
8. Robert Koch Institut (RKI). Krebs in Deutschland 2009/2010, 9. Ausgabe, . 2013. URL: http://www.rki.de/Krebs/DE/Content/Publikationen/Krebs_in_Deutschland/kid_2013/krebs_in_deutschland_2013.pdf?blob=publicationFile. Zugriff am: 14.07.2015.
9. Leiter U, Buettner PG, Eigentler TK, et al. Hazard rates for recurrent and secondary cutaneous melanoma: an analysis of 33,384 patients in the German Central Malignant Melanoma Registry. Journal of the American Academy of Dermatology. 2012;66(1):37-45.
10. Balch CM, Gershenwald JE, Soong SJ, et al. Final version of 2009 AJCC melanoma staging and classification. J Clin Oncol. 2009;27(36):6199-206.
11. Korn EL, Liu PY, Lee SJ, et al. Meta-analysis of phase II cooperative group trials in metastatic stage IV melanoma to determine progression-free and overall survival benchmarks for future phase II trials. J Clin Oncol. 2008;26(4):527-34.

12. Weide B, Elsasser M, Buttner P, et al. Serum markers lactate dehydrogenase and S100B predict independently disease outcome in melanoma patients with distant metastasis. *British journal of cancer*. 2012;107(3):422-8.
13. Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO). Melanom Leitlinie, Stand: Oktober 2014. URL: <https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/melanom/@@view/html/index.html>. Zugriff am: 14.07.2015.
14. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology – Melanoma, Version 3.2015. 2015.
15. Hofmann MA, Hauschild A, Mohr P, et al. Prospective evaluation of supportive care with or without CVD chemotherapy as a second-line treatment in advanced melanoma by patient's choice: a multicentre Dermatologic Cooperative Oncology Group trial. *Melanoma research*. 2011;21(6):516-23.
16. Schadendorf D, Czarnetzki M. Chemoresistenz des malignen Melanoms. Mechanismen und Modulationsmöglichkeiten. *Der Hautarzt: Zeitschrift für Dermatologie, Allergologie, Venerologie und verwandte Gebiete*. 1994;45:678-84.
17. Tawbi HA, Buch SC. Chemotherapy resistance abrogation in metastatic melanoma. *Clinical advances in hematology & oncology : H&O*. 2010;8(4):259-66.
18. Middleton MR, Grob JJ, Aaronson N, et al. Randomized phase III study of temozolomide versus dacarbazine in the treatment of patients with advanced metastatic malignant melanoma. *J Clin Oncol*. 2000;18(1):158-66.
19. SUN PHARMA. Fachinformation TEMOZOLOMIDE SUN[®] (Temozolomid). Stand: Juni 2015. URL: www.fachinfo.de. Zugriff am: 14.07.2015
20. LIPOMED. Fachinformation DACARBAZIN LIPOMED[®] (Dacarbazin). Stand: April 2010. URL: www.fachinfo.de. Zugriff am: 14.07.2015.
21. Eigentler TK, Meier F, Keilholz U, Hauschild A, Garbe C. Systemische Therapie des metastasierten Melanoms. *Der Onkologe*. 2010;16(12):1160-6.
22. Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID). Der GEKID Atlas, Ergebnisse der Hochrechnungen für Deutschland (Datenlieferung Dezember 2013) 2014. URL: http://www.gekid.de/Atlas/CurrentVersion/Help/Ergebnisse%20GEKID%20Atlas%20Deutschland_2014.pdf. Zugriff am: 14.07.2015.
23. MSD SHARP & DOHME. Prognose der Inzidenz des malignen Melanoms in Deutschland für die Jahre 2016 bis 2020. 2015.
24. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). IQWiG-Berichte – Nr. 130: Ipilimumab – Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V, Dossierbewertung, A12-07, Version 1.0. Stand: 27.04. 2012. URL: https://www.g-ba.de/downloads/92-975-108/2011-08-01-D-014_Ipilimumab_IQWiG-Nutzenbewertung.pdf. Zugriff am: 14.07.2015.
25. Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID). Krebssterblichkeit (Mortalität), altersstandardisierte Rate: C43 Malignes Melanom der Haut. 2015. URL: <http://www.gekid.de/>. Zugriff am: 25.06.2015.
26. Weide B, Faller C, Buttner P, et al. Prognostic factors of melanoma patients with satellite or in-transit metastasis at the time of stage III diagnosis. *PloS one*. 2013;8(4):e63137.
27. IMS. Definition der Abfrage in IMS PADDs Combined Datenbank (IMS DPM + IMS DKM). 2015.

28. Statistisches Bundesamt (DESTATIS). Körpermaße nach Altersgruppen und Geschlecht. 2013. URL: <https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/GesundheitszustandRelevantesVerhalten/Tabellen/Koerpermasse.html> Zugriff am: 14.07.2015.
29. BRISTOL-MYERS SQUIBB. Fachinformation YERVOY® (Ipilimumab). Stand: Juni 2015. URL: www.fachinfo.de. Zugriff am: 14.07.2015.
30. Eigentler TK, Schlaak M, Hassel JC, et al. Effectiveness and tolerability of ipilimumab: experiences from 198 patients included in a named-patient program in various daily-practice settings and multiple institutions. *Journal of immunotherapy*. 2014;37(7):374-81.
31. Hodi FS, O'Day SJ, McDermott DF, et al. Improved survival with ipilimumab in patients with metastatic melanoma. *N Engl J Med*. 2010;363(8):711-23.

3.3 Kosten der Therapie für die gesetzliche Krankenversicherung

Im Abschnitt 3.3 wird an mehreren Stellen gefordert, Spannen anzugeben, wenn dies an den entsprechenden Stellen zutrifft. Mit diesen Spannen ist in den nachfolgenden Tabellen konsequent weiterzurechnen, sodass daraus in Tabelle 3-10 Angaben für Jahrestherapiekosten pro Patient und für die GKV insgesamt mit einer Unter- und Obergrenze resultieren.

Therapieabbrüche sind in den Tabellen 3-1 bis 3-10 nicht zu veranschlagen; sie sind im Abschnitt 3.3.6 darzustellen.

3.3.1 Angaben zur Behandlungsdauer

Geben Sie in der nachfolgenden Tabelle 3-11 an, nach welchem Behandlungsmodus (z. B. kontinuierlich, in Zyklen, je Episode, bei Bedarf) das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie eingesetzt werden. Machen Sie diese Angaben getrennt für die Zielpopulation sowie für die Patientengruppen mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen (siehe Abschnitt 3.1). Geben Sie die Anzahl der Behandlungen pro Patient **pro Jahr**, die Behandlungsdauer je Behandlung in Tagen sowie die daraus resultierenden Behandlungstage **pro Jahr** an. Falls eine Therapie länger als ein Jahr dauert, jedoch zeitlich begrenzt ist, soll zusätzlich die Gesamttherapiedauer angegeben werden. Fügen Sie für jede Therapie, Behandlungssituation und jede Population bzw. Patientengruppe eine neue Zeile ein.

Zur Ermittlung der Kosten der Therapie müssen Angaben zur Behandlungsdauer auf Grundlage der Fachinformation gemacht werden. Zunächst ist auf Grundlage der Fachinformation zu prüfen, ob es unterschiedliche Behandlungssituationen oder Behandlungsdauern gibt. Mit einer Behandlungssituation ist gemeint, dass für Patienten aufgrund unterschiedlicher Eigenschaften unterschiedliche Behandlungsdauern veranschlagt werden, z. B. 12 Wochen vs. 24 Wochen. Mit Behandlungsdauer ist hier gemeint, dass unabhängig von diesen in der Fachinformation vorgegebenen Patienteneigenschaften eine Spanne der Behandlungsdauer gewählt werden kann, z. B. 12 bis 15 Wochen. Die Angaben sind für jede Behandlungssituation einzeln zu machen. Ist für eine Behandlungssituation keine eindeutige Behandlungsdauer angegeben, sondern eine Zeitspanne, dann ist die jeweilige Unter- und Obergrenze anzugeben und bei den weiteren Berechnungen zu verwenden. Wenn aus der Fachinformation keine maximale Behandlungsdauer hervorgeht, ist die Behandlung grundsätzlich für ein Jahr anzusetzen, ansonsten die zulässige Anzahl an Gaben, z. B. maximal mögliche Anzahl der Zyklen pro Jahr.

Tabelle 3-11: Angaben zum Behandlungsmodus (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungsmodus	Anzahl Behandlungen pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne) ^a	Behandlungsdauer je Behandlung in Tagen (ggf. Spanne)
Pembrolizumab	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	21-Tage-Zyklus: Pembrolizumab 2 mg/kg Körpergewicht wird 1 x alle 3 Wochen als intravenöse Infusion über 30 Minuten gegeben (1).	17 Zyklen	1 Tag je Zyklus
Dacarbazin	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	21-Tage Zyklus: 850 mg/m ² Körperoberfläche als intravenöse Infusion am 1. Tag und danach 1 x alle 3 Wochen (2).	17 Zyklen	1 Tag je Zyklus
Temozolomid	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	28-Tage-Zyklus: Temozolomid wird oral in Form von Hartkapseln verabreicht. Für die ersten 5 Tage der Therapie täglich 150 mg/m ² Körperoberfläche in den weiteren Zyklen im 4-Wochen-Intervall an jeweils 5 aufeinanderfolgenden Tagen 200 mg/m ² Körperoberfläche (bei guter Verträglichkeit) (3, 4).	13 Zyklen	5 Tage je Zyklus
Paclitaxel	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	56-Tage-Zyklus: Paclitaxel, als Induktionstherapie eine intravenöse Infusion mit 100 mg/m ² über 3 Stunden an Tag 1 der Wochen 1, 2, 3, 4, 5, 6, anschließend 2 Wochen Pause (5).	7 Zyklen	6 Tage je Zyklus
Carboplatin + Paclitaxel	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	CarboTax-Schema: Carboplatin AUC6 intravenös + Paclitaxel 225 mg/m ² intravenös an Tag 1 alle 3 Wochen, ab dem 5. Zyklus Dosisreduktion	17 Zyklen	1 Tag je Zyklus

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungsmodus	Anzahl Behandlungen pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne) ^a	Behandlungsdauer je Behandlung in Tagen (ggf. Spanne)
		(Carboplatin AUC5/ Paclitaxel 175 mg/m ²) (4).		
<p><i>Wenn eine Behandlung nicht dauerhaft, aber länger als ein Jahr, z. B. bei einer Infektionskrankheit, durchgeführt werden muss, ist dies anzumerken. In den folgenden Tabellen müssen die Kosten dann sowohl für ein Jahr als auch für die gesamte Behandlungsdauer pro Patient und die entsprechende Patientengruppe angegeben werden.</i></p> <p>a: Rechnerisch auf ein Jahr standardisiert. Jahr definiert als 52 Wochen. AUC = Target area under the concentration versus time curve in mg/mL*min (6).</p>				

Begründen Sie die Angaben in Tabelle 3-11 unter Nennung der verwendeten Quellen.

Angaben zum Behandlungsmodus von Pembrolizumab

Laut Fachinformation ist Pembrolizumab als Monotherapie zur Behandlung des fortgeschrittenen (nicht resezierbaren oder metastasierenden) Melanoms bei Erwachsenen angezeigt. Gemäß Fachinformation wird Pembrolizumab in einer Dosierung von 2 mg/kg intravenös über einen Zeitraum von 30 Minuten in einem 21-Tage-Zyklus verabreicht. Die Behandlungsdauer basiert auf den Vorgaben der jeweiligen Fachinformation und erfolgt bis zum Fortschreiten der Krebserkrankung bzw. bis zum Auftreten nicht tolerierbarer Toxizität (1).

Eine präzise, maximale Therapiedauer ist in der Fachinformation von Pembrolizumab nicht angegeben. In diesen Fällen soll als Behandlungsdauer rechnerisch ein Jahr angenommen werden (7, 8).

Angaben zum Behandlungsmodus von Dacarbazin

Gemäß Fachinformation wird Dacarbazin als Monotherapie oder Kombinationstherapie mit weiteren Arzneimitteln, unter anderem zur Behandlung des metastasierenden malignen Melanoms bei Erwachsenen eingesetzt.

Entsprechend der Fachinformation erfolgt die Behandlung mit einer Dosierung von 850 mg/m² Körperoberfläche, als intravenöse Infusion über einen Zeitraum von 30–60 Minuten, einmal alle drei Wochen (2).

Für die Berechnung wird ein Behandlungstag je Zyklus zugrunde gelegt. Eine präzise, maximale Therapiedauer ist in der Fachinformation von Dacarbazin nicht angegeben. In diesen Fällen soll als Behandlungsdauer rechnerisch ein Jahr angenommen werden (7, 8).

Angaben zum Behandlungsmodus von Temozolomid

Entsprechend der Fachinformation und S3 Leitlinie „Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Melanoms“ wird zur Therapieempfehlung für Temozolomid folgende Dosierungsmöglichkeit angegeben: Im ersten Zyklus in der Tagesdosis von 150 mg/m² Körperoberfläche, in den weiteren Zyklen bei guter Verträglichkeit gesteigert auf 200 mg/m² Körperoberfläche (3, 4).

Eine präzise, maximale Therapiedauer ist in der Fachinformation von Temozolomid nicht angegeben. In diesen Fällen soll als Behandlungsdauer rechnerisch ein Jahr angenommen werden (7, 8).

Angaben zum Behandlungsmodus von Paclitaxel

Die empfohlene Dosierung beträgt gemäß Studie 100 mg/m² Körperoberfläche in Woche 1, 2, 3, 4, 5 und 6, mit anschließend zwei Wochen Therapiepause (5).

Eine präzise, maximale Therapiedauer ist in der Fachinformation von Paclitaxel nicht angegeben. In diesen Fällen soll als Behandlungsdauer rechnerisch ein Jahr angenommen werden (7, 8).

Angaben zum Behandlungsmodus von Paclitaxel in Kombination mit Carboplatin.

Die S3 Leitlinie „Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Melanoms“ (4) gibt zur Therapieempfehlung für das CarboTax-Schema folgende Dosierungsmöglichkeiten an: In den ersten vier Zyklen, Carboplatin AUC6 (AUC = Target area under the concentration versus time curve in mg/mL*min) intravenös, Paclitaxel 225 mg/m² an Tag eins alle drei Wochen. Ab dem 5. Zyklus wird die Reduzierung der Dosis empfohlen (4). Carboplatin von AUC6 auf AUC5 intravenös und Paclitaxel von 225 mg/m² auf 175 mg/m² an Tag 1 alle drei Wochen. Insgesamt kommt es also zu 17 Zyklen über eine Behandlungsdauer von einem Jahr (7, 8). Paclitaxel basierte Chemotherapien in Kombination mit Carboplatin stellen relevante Behandlungsoptionen in der besonderen Versorgungssituation für das unter Kodierung A des vorliegenden Dossiers untersuchte Teilanwendungsgebiet („Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten“) dar.

Geben Sie in der nachfolgenden Tabelle 3-12 die Behandlungstage pro Patient pro Jahr für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie an. Machen Sie diese Angaben getrennt für die Zielpopulation und die Patientengruppen mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen. Die Behandlungstage pro Patient pro Jahr ergeben sich aus der Anzahl der Behandlungen pro Patient pro Jahr und der Behandlungsdauer je Behandlung (siehe Tabelle 3-11). Fügen Sie für jede Therapie, Behandlungssituation und jede Population bzw. Patientengruppe eine neue Zeile ein.

Tabelle 3-12: Behandlungstage pro Patient pro Jahr (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungsmodus	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)
Pembrolizumab	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	21-Tage-Zyklus: Pembrolizumab 2 mg/kg Körpergewicht wird 1 x alle 3 Wochen als intravenöse Infusion über 30 Minuten gegeben (1).	17 ^a
Dacarbazin	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	21-Tage Zyklus: 850 mg/m ² Körperoberfläche als intravenöse Infusion am 1. Tag und danach 1 x alle 3 Wochen (2).	17 ^a
Temozolomid	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	28-Tage-Zyklus: Temozolomid wird oral in Form von Hartkapseln verabreicht. Für die ersten 5 Tage der Therapie täglich 150 mg/m ² Körperoberfläche in den weiteren Zyklen im 4-Wochen-Intervall an jeweils 5 aufeinanderfolgenden Tagen 200 mg/m ² Körperoberfläche (bei guter Verträglichkeit) (3, 4).	65 ^a
Paclitaxel	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	56-Tage-Zyklus: Paclitaxel, als Induktionstherapie 1 intravenöse Infusion mit 100 mg/m ² über 3 Stunden an Tag 1 der Wochen 1, 2, 3, 4, 5, 6, anschließend 2 Wochen Pause (5).	42 ^a
Paclitaxel + Carboplatin	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	CarboTax-Schema: Carboplatin AUC6 intravenös + Paclitaxel 225 mg/m ² intravenös an Tag 1 alle 3 Wochen, ab dem 5. Zyklus Dosisreduktion (Carboplatin AUC5/	17 ^a

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungsmodus	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)
		Paclitaxel 175 mg/m ² (4).	
<i>Wenn eine Behandlung nicht dauerhaft, aber länger als ein Jahr, z. B. bei einer Infektionskrankheit, durchgeführt werden muss, ist dies anzumerken. In den folgenden Tabellen müssen die Kosten dann sowohl für ein Jahr als auch für die gesamte Behandlungsdauer pro Patient und die entsprechende Patientengruppe angegeben werden.</i>			
a: Es handelt sich um eine rechnerische Darstellung auf Basis der Jahrestherapie. AUC = Target area under the concentration versus time curve in mg/mL*min (6).			

Die Anzahl der Behandlungstage pro Patient pro Jahr wurde wie folgt berechnet:

Pembrolizumab:

Bei der zugrunde gelegten Therapiedauer für Pembrolizumab wird am ersten Tag eines 21-tägigen Zyklus je eine intravenöse Infusion verabreicht. Da die Therapie laut der Fachinformation zeitlich nicht begrenzt ist, wird die Behandlungsdauer standardisiert auf ein Jahr (365 Tage) ausgewiesen. Dies entspricht je einen Tag in 17 Zyklen, also insgesamt 17 Behandlungstagen im Jahr (1).

Dacarbazin:

Dacarbazin wird am ersten Tag eines 21-tägigen Zyklus verabreicht. Bei einer Behandlungsdauer von einem Jahr entspricht dies je einen Tag in 17 Zyklen, also maximal 17 Behandlungstagen im Jahr (2).

Temozolomid:

Temozolomid wird im 4-Wochen-Intervall an jeweils fünf aufeinanderfolgenden Tagen verabreicht. Bei einer Behandlungsdauer von einem Jahr entspricht dies 65 Gaben (= 65 Behandlungstage) und 13 Zyklen (3, 4).

Paclitaxel:

Paclitaxel wird im 8-Wochen-Intervall in den ersten sechs Wochen wöchentlich verabreicht mit anschließend zwei Wochen Pause. Die gesamte relevante Behandlungsdauer nach Tagen betrug in dieser Studie 42 Tage (5).

Paclitaxel und Carboplatin:

Paclitaxel und Carboplatin werden am ersten Tag eines 21-tägigen Zyklus verabreicht. Basierend auf einer Behandlungsdauer von einem Jahr entspricht dies je einen Tag in 17 Zyklen, also maximal 17 Behandlungstagen im Jahr (4).

3.3.2 Angaben zum Verbrauch für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie

Geben Sie in der nachfolgenden Tabelle 3-13 den Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient für das zu bewertende Arzneimittel sowie für die zweckmäßige Vergleichstherapie in DDD (Defined Daily Dose) an, d. h. Anzahl DDDs pro Jahr. Zusätzlich ist die festgelegte bzw. den Berechnungen zugrunde liegende Maßeinheit der jeweiligen DDD (z. B. 10 mg) anzugeben. Falls die zweckmäßige Vergleichstherapie eine nichtmedikamentöse Behandlung ist, geben Sie ein anderes im jeweiligen Anwendungsgebiet international gebräuchliches Maß für den Jahresdurchschnittsverbrauch der zweckmäßigen Vergleichstherapie an. Fügen Sie für jede Therapie eine neue Zeile ein.

Tabelle 3-13: Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD; im Falle einer nicht medikamentösen Behandlung Angabe eines anderen im jeweiligen Anwendungsgebiet international gebräuchlichen Maßes)
Pembrolizumab	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	17 ^a	weiblich: 2 mg/kg x 68,4 kg = 136,8 mg → 3 Durchstechflaschen à 50 mg männlich: 2 mg/kg x 84,3 kg = 168,6 mg → 4 Durchstechflaschen à 50 mg	weiblich: 17 Zyklen x 3 Durchstechflaschen à 50 mg, Gesamtverbrauch = 51 Durchstechflaschen à 50 mg männlich: 17 Zyklen x 4 Durchstechflaschen à 50 mg, Gesamtverbrauch = 68 Durchstechflaschen à 50 mg
Dacarbazin	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	17 ^a	weiblich: 850 mg/m ² x 1,75 m ² = 1.487,5 mg → 1 Durchstechflasche à 1.000 mg + 1 Durchstechflasche à 500 mg männlich: 850 mg/m ² x 2,02 m ² = 1.717 mg → 1 Durchstechflasche à 1.000 mg + 1 Durchstechflasche à 500 mg + 1 Durchstechflasche à 200 mg + 1 Durchstechflasche à 100 mg	weiblich: 17 Zyklen x (1 Durchstechflasche à 1.000 mg + 1 Durchstechflasche à 500 mg), Gesamtverbrauch = 17 Packungen à 1.000 mg 17 Packungen à 500 mg männlich: 17 Zyklen x (1 Durchstechflasche à 1.000 mg + 1 Durchstechflasche à 500 mg + 1 Durchstechflasche à 200 mg + 1 Durchstechflasche à 100 mg), Gesamtverbrauch = 17 Packungen à 1.000 mg, 17 Packungen à 500 mg, 2 Packungen (je 10 Stück) à 200 mg, 2 Packungen (je 10 Stück)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD; im Falle einer nicht medikamentösen Behandlung Angabe eines anderen im jeweiligen Anwendungsgebiet international gebräuchlichen Maßes)
				à 100 mg
Temozolomid	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	65 ^a (13 Zyklen à 5 Gaben)	<p>weiblich: 1. Zyklus: 150 mg/m² x 1,75 m² = 262,5 mg → 1 Hartkapsel à 180 mg + 1 Hartkapsel à 100 mg 2. – 13. Zyklus: 200 mg/m² x 1,75 m² = 350 mg → 1 Hartkapsel à 250 mg + 1 Hartkapsel à 100 mg</p> <p>männlich: 1. Zyklus: 150 mg/m² x 2,02 m² = 303 mg → 1 Hartkapsel à 180 mg + 1 Hartkapsel à 140 mg 2. – 13. Zyklus: 200 mg/m² x 2,02 m² = 404 mg → 1 Hartkapsel à 250 mg + 1 Hartkapsel à 180 mg</p>	<p>weiblich: 1. Zyklus: 5 Hartkapseln à 180 mg + 5 Hartkapseln à 100 mg 2. – 13. Zyklus: 12 Zyklen x (5 Hartkapseln à 250 mg + 5 Hartkapseln à 100 mg) Gesamtverbrauch = 12 Packungen (je 5 Stück) à 250 mg, 1 Packung (je 5 Stück) à 180 mg, 13 Packungen (je 5 Stück) à 100 mg</p> <p>männlich: 1. Zyklus: 5 Hartkapseln à 180 mg + 5 Hartkapseln à 140 mg 2. – 13. Zyklus: 12 Zyklen x (5 Hartkapseln à 250 mg + 5 Hartkapseln à 180 mg) Gesamtverbrauch = 12 Packungen (je 5 Stück) à 250 mg, 13 Packungen (je 5 Stück) à 180 mg, 1 Packung (je 5 Stück) à 140 mg</p>
Paclitaxel	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	42 ^a	<p>weiblich: 100 mg/m² x 1,75 m² = 175 mg → 2 Durchstechflaschen à 100 mg</p> <p>männlich: 100mg/m² x 2,02 m² = 202 mg → 2 Durchstechflaschen à 100 mg + 1 Durchstechflasche à 30 mg</p>	<p>weiblich: 42 Behandlungstage x 2 Durchstechflaschen à 100 mg, Gesamtverbrauch = 84 Packungen à 100 mg</p> <p>männlich: 42 Behandlungstage x (2 Durchstechflaschen à 100 mg + 1 Durchstechflasche à 30 mg), Gesamtverbrauch = 84 Packungen à 100 mg, 42 Packungen à 30 mg</p>
Carboplatin und Paclitaxel	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	17 ^a	<p>weiblich: <u>Carboplatin:</u> 1. – 4. Zyklus: AUC6 = 760,5 mg</p>	<p>weiblich: <u>Carboplatin:</u> 1. – 4. Zyklus: 4 Zyklen x (1 Durchstechflasche</p>

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD; im Falle einer nicht medikamentösen Behandlung Angabe eines anderen im jeweiligen Anwendungsgebiet international gebräuchlichen Maßes)
			<p>[Calvert, 1989] → 1 Durchstechflasche à 600 mg + 1 Durchstechflasche à 150 mg + 1 Durchstechflasche à 50 mg 5. – 17. Zyklus: AUC5 = 633,7 mg [Calvert, 1989] → 1 Durchstechflasche à 600 mg + 1 Durchstechflasche à 50 mg <u>Paclitaxel:</u> 1. – 4. Zyklus: 225 mg/m² x 1,75 m² = 393,75 mg → 1 Durchstechflasche à 300 mg + 1 Durchstechflasche à 100 mg 5. – 17. Zyklus: 175 mg/m² x 1,75 m² = 306,25 mg → 1 Durchstechflasche à 300 mg + 1 Durchstechflasche à 30 mg männlich: <u>Carboplatin:</u> 1. – 4. Zyklus: AUC6 = 908,7 mg [Calvert, 1989] → 1 Durchstechflasche à 600 mg + 1 Durchstechflasche à 450 mg 5. – 17. Zyklus: AUC5 = 757,3 mg [Calvert, 1989] → 1 Durchstechflasche à 600 mg + 1 Durchstechflasche à 150 mg + 1 Durchstech-</p>	<p>à 600 mg + 1 Durchstechflasche à 150 mg + 1 Durchstechflasche à 50 mg) 5. – 17. Zyklus: 13 Zyklen x (1 Durchstechflasche à 600 mg + 1 Durchstechflasche à 50 mg), Gesamtverbrauch = 17 Packungen à 600 mg, 4 Packungen à 150 mg, 17 Packungen à 50 mg <u>Paclitaxel:</u> 1. – 4. Zyklus: 4 Zyklen x (1 Durchstechflasche à 300 mg + 1 Durchstechflasche à 100 mg) 5. – 17. Zyklus: 13 Zyklen x (1 Durchstechflasche à 300 mg + 1 Durchstechflasche à 30 mg), Gesamtverbrauch = 17 Packungen à 300 mg, 4 Packungen à 100 mg 13 Packungen à 30 mg männlich: <u>Carboplatin:</u> 1. – 4. Zyklus: 4 Zyklen x (1 Durchstechflasche à 600 mg + 1 Durchstechflasche à 450 mg) 5. – 17. Zyklus: 13 Zyklen x (1 Durchstechflasche à 600 mg + 1 Durchstechflasche à 150 mg + 1 Durchstechflasche à 50 mg), Gesamtverbrauch = 17 Packungen à 600 mg, 4 Packungen à 450 mg, 13 Packungen à 150 mg 13 Packungen à 50 mg <u>Paclitaxel:</u> 1. – 4. Zyklus: 4 Zyklen x (1 Durchstechflasche à 300 mg + 1 Durchstechflasche à 100 mg + 2 Durchstechflaschen à 30 mg)</p>

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD; im Falle einer nicht medikamentösen Behandlung Angabe eines anderen im jeweiligen Anwendungsgebiet international gebräuchlichen Maßes)
			flasche à 50 mg <u>Paclitaxel:</u> 1. – 4. Zyklus: $225 \text{ mg/m}^2 \times 2,02 \text{ m}^2 = 454,5 \text{ mg}$ → 1 Durchstechflasche à 300 mg + 1 Durchstechflasche à 100 mg + 2 Durchstechflaschen à 30 mg 5. – 17. Zyklus: $175 \text{ mg/m}^2 \times 2,02 \text{ m}^2 = 353,5 \text{ mg}$ → 1 Durchstechflasche à 300 mg + 2 Durchstechflaschen à 30 mg	5. – 17. Zyklus: 13 Zyklen x (1 Durchstechflasche à 300 mg + 2 Durchstechflaschen à 30 mg), Gesamtverbrauch = 17 Packungen à 300 mg, 4 Packungen à 100 mg 34 Packungen à 30 mg
a: Es handelt sich um eine rechnerische Darstellung auf Basis der Jahrestherapie. AUC = target area under the concentration versus time curve in mg/mL*min (6).				

Begründen Sie die Angaben in Tabelle 3-13 unter Nennung der verwendeten Quellen. Nehmen Sie ggf. Bezug auf andere Verbrauchsmaße, die im Anwendungsgebiet gebräuchlich sind (z. B. IU [International Unit], Dosierung je Quadratmeter Körperoberfläche, Dosierung je Kilogramm Körpergewicht).

Angaben zu den Kalkulationsgrundlagen (Berechnung des Verbrauchs)

Grundlage der Berechnung des Jahresdurchschnittsverbrauchs, pro Patient für die jeweilige zweckmäßige Vergleichstherapie, sind die offiziellen Angaben zu den Dosierungen der betrachteten Arzneimittel in den jeweils aktuell gültigen Fachinformationen (1-3), Studien (5) und der S3-Leitlinie (4).

Bei Medikamenten, die nach Körperoberfläche patientenindividuell dosiert werden, wurde die durchschnittliche Körperoberfläche auf der Basis der Formel nach Du Bois und Du Bois (9) und den Angaben des Mikrozensus 2013 (10) zur durchschnittlichen Körpergröße und zum durchschnittlichen Körpergewicht errechnet. Da die durchschnittliche Körpergröße und das durchschnittliche Körpergewicht in Abhängigkeit des Geschlechts stark variieren, wird der Verbrauch geschlechtsspezifisch dargestellt.

Gemäß Mikrozensus 2013 liegt die durchschnittliche Körpergröße einer erwachsenen Frau bei 165 cm und eines erwachsenen Mannes in Deutschland bei 178 cm. Das durchschnittliche Körpergewicht bei Frauen wird mit 68,4 kg angegeben, und bei Männern mit 84,3 kg (10).

Basierend auf den Angaben aus dem Mikrozensus 2013 (10) wurden auf Basis der geschlechterspezifischen Kalkulation der Körperoberflächen (KOF) Formel nach Du Bois und Du Bois (9) folgende durchschnittliche Körperoberflächen berechnet.

Oberfläche

$$O = G^{0,425} \times H^{0,725} \times 71,84 \quad (O = \text{Oberfläche}, G = \text{Gewicht}, H = \text{Körpergröße})$$

$$O (\text{♀}) = 68,4^{0,425} \times 165^{0,725} \times 71,84$$

$$O (\text{♀}) = 1.74927654 \text{ m}^2$$

$$O (\text{♂}) = 84,3^{0,425} \times 178^{0,725} \times 71,84$$

$$O (\text{♂}) = 2.02180619 \text{ m}^2$$

Somit ergeben sich durchschnittliche Körperoberflächen von 1,75 m² bei Frauen und 2,02 m² bei Männern.

Die Berechnung der Dosierung für Carboplatin folgte nach den Angaben der S3-Leitlinie (4). Diese sieht eine individuelle Dosierung anhand der AUC vor, die ein Maß für die Exposition eines individuellen Patienten gegenüber dem Wirkstoff ist. Die Fachinformation von CARBOPLATIN ACCORD[®] (11) sieht hierfür die Dosiskalkulation nach der Calvert-Formel (6) vor.

Diese lautet: Carboplatin Dosis (mg) = Ziel – AUC x (Nierenfunktion + 25).

Die Nierenfunktion ist hier mit der glomerulären Filtrationsrate (GFR) gleichzusetzen, die wie folgt berechnet wurde:

$$\text{GFR} = \text{Geschlecht} * ((140 - \text{Alter}[\text{Jahre}]/ (\text{Serumkreatinin}[\text{mg/dl}])) * (\text{Gewicht}[\text{kg}] / 72)$$

Dabei gilt für Geschlecht für Männer der Wert 1 und für Frauen der Wert 0,85.

Bei der Umrechnung der AUC Angaben in mg, wurde das durchschnittliche Gewicht getrennt nach Geschlecht, wie auch in den vorhergehenden Abschnitten, aus dem Mikrozensus 2013 entnommen (10).

Entsprechend der Quelle des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung wurde das Durchschnittsalter nach Geschlecht einbezogen, die bei Frauen bei 45.5 Jahren und bei Männern bei 42.8 Jahren liegt (12).

Bei den Serum Creatinin Werten ist der Mittelwert der Referenzbereiche, die geschlechtsspezifisch variiert, in die Kalkulation einbezogen (13).

Angaben zum Jahresdurchschnittsverbrauch Pembrolizumab

Die Fachinformation von Pembrolizumab empfiehlt eine Dosierung von 2 mg/kg Körpergewicht (1). Entsprechend des durchschnittlichen Körpergewichts einer erwachsenen Frau in Deutschland (10) ergeben sich 136,8 mg. Das entspricht drei Durchstechflaschen à 50 mg Pembrolizumab. Bei 17 Zyklen führt dies zu einem jährlichen Gesamtverbrauch von 51 Packungen à 50 mg Pembrolizumab pro erwachsene Patientin.

Entsprechend des durchschnittlichen Körpergewichts eines erwachsenen Mannes in Deutschland (10) resultieren 168,6 mg. Das entspricht vier Durchstechflaschen à 50 mg Pembrolizumab. Bei 17 Zyklen entspricht dies, einem Jahresdurchschnittsverbrauch von 68 Packungen à 50 mg Pembrolizumab pro erwachsenen Patienten.

Die hier angewandte Kalkulationsmethode stellt aus Sicht von MSD eine Überschätzung der Kosten der Therapie für die GKV dar.

In der Versorgungsrealität findet die Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem malignen Melanom in spezialisierten Zentren statt. Dort wird durch gezielte Einbestellung der Patienten und eine regelgerechte Abrechnung laut Hilfstaxe (14) bei der Therapie mit Pembrolizumab Verwurf vermieden, da nach den klaren Abrechnungsregeln der Hilfstaxe lediglich beim letzten Patienten eines Tages Verwurf anfällt und abgerechnet wird. Bei allen anderen Patienten wird mg-genau lediglich die tatsächlich applizierte Menge abgerechnet.

Folgt man der wissenschaftlichen Literatur [z. B. (15)], so stellt zudem die Annahme, dass alle Patienten über ein gesamtes Jahr therapiert werden, eine Überschätzung der Kosten für die GKV dar.

Angaben zum Jahresdurchschnittsverbrauch Dacarbazin

Entsprechend der Angaben der Fachinformation (2) und den Empfehlungen der S3-Leitlinie (4) wird Dacarbazin in einer Dosis von 850 mg/m² Körperoberfläche pro Tag einmal alle drei Wochen verabreicht.

Als Durchschnittsverbrauch pro Zyklus ergeben sich somit 1.487 mg (9) pro Patientin. Dies entspricht einer Durchstechflasche à 1.000 mg und einer Durchstechflasche à 500 mg. Bei Berücksichtigung des Verwurfs pro Infusion ergibt sich bei 17 Zyklen pro Jahr ein Gesamtverbrauch von 17 Packungen à 1.000 mg und 17 Packungen à 500 mg Dacarbazin pro Patientin.

Pro Zyklus resultiert je Patient ein Durchschnittsverbrauch von 1.717 mg (9). Dies entspricht einer Durchstechflasche à 1.000 mg, einer Durchstechflasche à 500 mg, einer Durchstechflasche à 200 mg und einer Durchstechflasche à 100 mg. Bei 17 Zyklen entspricht dies einem Jahresdurchschnittsverbrauch von 17 Packungen à 1.000 mg, 17 Packungen à 500 mg, zwei Packungen (je zehn Stück) à 200 mg und zwei Packungen (je zehn Stück) à 100 mg Dacarbazin pro Patient unter Berücksichtigung des Verwurfes pro Infusion.

Angaben zum Jahresdurchschnittsverbrauch Temozolomid

Temozolomid wird nach Körperoberfläche patientenindividuell dosiert. Die Fachinformation (3) empfiehlt im ersten Zyklus eine Dosierung von 150 mg/m² Körperoberfläche. Ab dem zweiten Zyklus bis zum 13. Zyklus wird die Erhöhung der Dosierung auf 200 mg/m² Körperoberfläche empfohlen.

Entsprechend der durchschnittlichen Körperoberfläche wird pro Gabe bei einer Patientin von einem Verbrauch von 262,5 mg (9) Temozolomid im ersten Zyklus ausgegangen, dies entspricht einer Hartkapsel à 180 mg und einer Hartkapsel à 100 mg Temozolomid. Ab dem 2. Zyklus ist von 350 mg (9) auszugehen, das ergibt eine Hartkapsel à 250 mg und eine Hartkapsel à 100 mg Temozolomid pro Gabe. Bei einer Annahme von 13 Zyklen pro Jahr und fünf Gaben pro Behandlung (Zyklus) ergibt sich ein Jahresdurchschnittsverbrauch von zwölf Packungen (je fünf Stück) à 250 mg, eine Packung (je fünf Stück) à 180 mg und 13 Packungen (je fünf Stück) à 100 mg pro Patientin.

Bei einem Patienten liegt der angenommene Verbrauch bei 303 mg im ersten Zyklus und 404 mg (9) in den Zyklen zwei bis 13. Pro Gabe entspricht das im ersten Zyklus eine Hartkapsel à 180 mg und eine Hartkapsel à 140 mg Temozolomid bei einem männlichen Patienten über 18 Jahren. In den Zyklen zwei bis 13 benötigt der männliche Patient eine Hartkapsel à 250 mg und eine Hartkapsel à 180 mg Temozolomid pro Behandlung. Daraus resultiert bei 13 Zyklen pro Jahr und fünf Gaben pro Behandlung (Zyklus) ein Gesamtverbrauch von zwölf Packungen (je fünf Stück) à 250 mg, 13 Packungen (je fünf Stück) à 180 mg und eine Packung (je fünf Stück) à 140 mg pro Patient.

Angaben zum Jahresdurchschnittsverbrauch Paclitaxel

Laut Zimpfer-Rechner et al. (5) sollte Paclitaxel für das Anwendungsgebiet Melanom mit 100 mg/m² Körperoberfläche verabreicht werden. Damit wird pro Patientin je Gabe von einem Verbrauch von 175 mg (9), aufgerundet 200 mg Paclitaxel, ausgegangen. Nach Aufrundung werden somit pro Patientin zwei Durchstechflaschen à 100 mg Paclitaxel pro Gabe benötigt. Daraus ergibt sich bei 42 Behandlungstagen pro Jahr ein Jahresdurchschnittsverbrauch von 84 Packungen à 100 mg Paclitaxel pro Patientin.

Bei einem Patient wird pro Gabe von einem Verbrauch von 202 mg (9), aufgerundet 230 mg Paclitaxel, ausgegangen. Somit werden pro Patient, nach Aufrundung, zwei Durchstechflaschen à 100 mg und eine Durchstechflasche à 30 mg Paclitaxel je Gabe verabreicht. Dies entspricht bei 42 Behandlungstagen pro Jahr einem Jahresdurchschnittsverbrauch von 84 Packungen à 100 mg und 42 Packungen à 30 mg Paclitaxel pro Patient.

Angaben zum Jahresdurchschnittsverbrauch Carboplatin & Paclitaxel

Im klinischen Alltag wird häufig, insbesondere bei Patienten mit hoher Tumorlast, rascher Metastasierungsdynamik und/oder Progress nach Vortherapie das CarboTax Schema eingesetzt. In diesen Polychemotherapie-Schemata wird die Kombination Carboplatin und Paclitaxel angewendet (4). Die Anwendung dieser Kombinationstherapie Paclitaxel mit

Carboplatin unterscheidet sich von den Monotherapien. Hinzu kommt, dass es für Carboplatin standardisierte Dosierungen gibt, im Sinne einer $AUC = \text{target area under the concentration versus time curve in mg/mL}\cdot\text{min}$ (6).

Die Dosierungsempfehlung der S3-Leitlinie (4) für die Kombination Paclitaxel und Carboplatin ist wie folgt:

In den ersten vier Zyklen wird Carboplatin AUC6 und Paclitaxel intravenös an Tag eins alle drei Wochen verabreicht. Bei Carboplatin entspricht dies laut Calvert Formel (6) 760,5 mg je Patientin. Daraus resultieren pro Gabe eine Durchstechflasche à 600 mg, eine Durchstechflasche à 150 mg und eine Durchstechflasche à 50 mg Carboplatin pro Patientin. Bei Paclitaxel wird ein Induktionsregime von 225 mg/m² empfohlen. Dies entspricht 393,75 mg (9) pro Patientin und ergibt unter Berücksichtigung des Verwurfs eine Durchstechflasche à 300 mg und eine Durchstechflasche à 100 mg Paclitaxel.

Ab dem 5. Zyklus wird die Reduzierung der Dosis empfohlen (4). Carboplatin auf AUC5 intravenös und Paclitaxel auf 175 mg/m² an Tag eins alle drei Wochen. Die Dosierung AUC5 entspricht in den Zyklen fünf bis 17 bei einer Patientin 633,7 mg (6) pro Gabe. Unter Berücksichtigung des Verwurfs ergibt sich somit eine Durchstechflasche à 600 mg und eine Durchstechflasche à 50 mg Carboplatin pro Patientin. Bei der Paclitaxel Therapie wird bei einer erwachsenen Patientin in den Zyklen fünf bis 17 die Dosierung auf 306,25 mg (9) reduziert. Daraus ergibt sich eine Durchstechflasche à 300 mg und eine Durchstechflasche à 30 mg Paclitaxel je Gabe pro Patientin.

Bei einer Annahme von 17 Zyklen pro Jahr, ergibt sich ein Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patientin von 17 Packungen à 600 mg, vier Packungen à 150 mg und 17 Packungen à 50 mg Carboplatin und 17 Packungen à 300 mg, vier Packungen à 100 mg und 13 Packungen à 30 mg Paclitaxel.

Bei einem erwachsenen Patienten wird in den ersten vier Zyklen pro Gabe Carboplatin AUC6 und Paclitaxel intravenös an Tag eins alle drei Wochen verabreicht. Bei Carboplatin entspricht dies laut Calvert Formel (6) 908,7 mg je Patient. Daraus resultieren pro Gabe eine Durchstechflasche à 600 mg, eine Durchstechflasche à 450 mg Carboplatin pro Patient. Bei Paclitaxel wird ein Induktionsregime von 225 mg/m² empfohlen. Dies entspricht 454,5 mg (9) pro Patient und ergibt unter Berücksichtigung des Verwurfs eine Durchstechflasche à 300 mg, eine Durchstechflasche à 100 mg und zwei Durchstechflaschen à 30 mg Paclitaxel.

Ab dem 5. Zyklus wird die Reduzierung der Dosis empfohlen (4). Carboplatin auf AUC5 intravenös und Paclitaxel auf 175 mg/m² an Tag eins alle drei Wochen. Die Dosierung AUC5 entspricht in den Zyklen fünf bis 17 bei einem Patienten 757,3 mg (6) pro Gabe. Unter Berücksichtigung des Verwurfs ergibt sich somit eine Durchstechflasche à 600 mg, eine Durchstechflasche à 150 mg und eine Durchstechflasche à 50 mg Carboplatin pro Patient. Bei der Paclitaxel Therapie wird bei einem erwachsenen Patienten in den Zyklen fünf bis 17 die Dosierung auf 353,5 mg (9) reduziert. Daraus ergibt sich eine Durchstechflasche à 300 mg und zwei Durchstechflaschen à 30 mg Paclitaxel je Gabe pro Patient.

Bei einer Annahme von 17 Zyklen pro Jahr, ergibt sich ein Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient von 17 Packungen à 600 mg, vier Packungen à 450 mg, 13 Packungen à 150 mg und 13 Packungen à 50 mg Carboplatin und 17 Packungen à 300 mg, vier Packungen à 100 mg und 34 Packungen à 30 mg Paclitaxel.

3.3.3 Angaben zu Kosten des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie

Geben Sie in Tabelle 3-14 an, wie hoch die Apothekenabgabepreise für das zu bewertende Arzneimittel sowie für die zweckmäßige Vergleichstherapie sind. Generell soll(en) die für die Behandlungsdauer zweckmäßigste(n) und wirtschaftlichste(n) verordnungsfähige(n) Packungsgröße(n) gewählt werden. Sofern Festbeträge vorhanden sind, müssen diese angegeben werden. Sofern keine Festbeträge bestehen, soll das günstigste Arzneimittel gewählt werden. Importarzneimittel sollen nicht berücksichtigt werden. Geben Sie zusätzlich die den Krankenkassen tatsächlich entstehenden Kosten an. Dazu ist der Apothekenabgabepreis nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Rabatte (siehe § 130 und § 130a SGB V mit Ausnahme der in § 130a Absatz 8 SGB V genannten Rabatte) anzugeben. Im Falle einer nichtmedikamentösen zweckmäßigen Vergleichstherapie sind entsprechende Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive zu machen. Fügen Sie für jede Therapie eine neue Zeile ein.

Tabelle 3-14: Kosten des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
Pembrolizumab	KEYTRUDA [®] 50mg 1 Stück: Taxe-VK = 2.245,20 €	2.118,48 € ¹ (1,77 € ² ; 124,95 € ³)
Dacarbazin	DETIMEDAC [®] 100mg 10 Stück: Taxe-VK = 213,27 €	178,34 € ^a (1,77 € ^b ; 9,60 € ^c ; 7,56 € ^d ; 16,00 € ^e)
	DETIMEDAC [®] 200mg 10 Stück: Taxe-VK = 415,56 €	282,79 € ^a (1,77 € ^b ; 19,20 € ^c ; 79,80 € ^d ; 32,00 € ^e)
	DETIMEDAC [®] 500mg 1 Stück: Taxe-VK = 112,13 €	72,78 € ^a (1,77 € ^b ; 4,80 € ^c ; 24,78 € ^d ; 8,00 € ^e)
	DETIMEDAC [®] 1.000mg 1 Stück: Taxe-VK = 213,27 €	130,71 € ^a (1,77 € ^b ; 9,60 € ^c ; 55,19 € ^d ; 16,00 € ^e)
Temozolomid	TEMOZOLOMIDE SUN [®] 100 mg 5 Stück: FB = 509,49 €	507,72 € ^a (1,77 € ^b)
	TEMOZOLOMIDE SUN [®] 140 mg 5 Stück: FB = 714,49 €	712,72 € ^a (1,77 € ^b)
	TEMOZOLOMIDE SUN [®] 180 mg 5 Stück: FB = 918,49 €	916,72 € ^a (1,77 € ^b)
	TEMOZOLOMIDE SUN [®] 250 mg 5 Stück: FB = 1.278,49 €	1.276,72 € ^a (1,77 € ^b)
Carboplatin	CARBOPLATIN ACCORD [®] 50mg 1 Stück: Taxe-VK = 37,10 €	32,02 € ^a (1,77 € ^b ; 1,24 € ^c ; 2,07 € ^e)
	CARBOPLATIN ACCORD [®] 150mg 1 Stück: Taxe-VK = 91,05 €	79,15 € ^a (1,77 € ^b ; 3,80 € ^c ; 6,33 € ^e)
	CARBOPLATIN ACCORD [®] 450mg 1 Stück: Taxe-VK = 252,91 €	220,52 € ^a (1,77 € ^b ; 11,48 € ^c ; 19,14 € ^e)
	CARBOPLATIN ACCORD [®] 600mg 1 Stück: Taxe-VK = 333,84 €	291,21 € ^a (1,77 € ^b ; 15,32 € ^c ; 25,54 € ^e)
Paclitaxel	PACLITAXEL ACCORD [®] 6 mg/ml 30 mg 1 Stück: Taxe-VK = 137,34 €	129,57 € ^a (1,77 € ^b ; 6,00 € ^c)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
	PACLITAXEL ACCORD® 6 mg/ml 100 mg 1 Stück: Taxe-VK = 400,55 €	349,48 € ^a (1,77 € ^b ; 18,49 € ^c ; 30,81 € ^e)
	PACLITAXEL ACCORD® 6 mg/ml 300 mg 1 Stück: Taxe-VK = 1.281,62 €	1.219,55 € ^a (1,77 € ^b ; 60,30 € ^c)
Quelle: Lauer-Taxe (16-19)(Stand: 01.07. 2015); eigene Berechnungen a: Kosten GKV nach Abzug der gesetzlichen Rabatte b: Rabatt nach § 130 Abs.1 SGB V c: Rabatt nach § 130a Abs. 1 und 1a SGB V d: Rabatt nach § 130a Abs. 3a SGB V e: Rabatt nach § 130a Abs. 3b SGB V; Taxe-VK: Apothekenverkaufspreis; FB: Festbetrag; GKV: gesetzliche Krankenversicherung		

Begründen Sie die Angaben in Tabelle 3-14 unter Nennung der verwendeten Quellen.

Die Angaben in Tabelle 3-14 stellen die Apothekenverkaufspreise (Taxe-VK, inkl. 19 % MwSt.) zu patienten- und therapiegerechten Packungsgrößen dar und beziehen sich auf die aktuellen günstigsten Taxe-VK abzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Rabatte der ausgewählten Packungen. Dazu wurde die Handelsform mit dem günstigsten Preis pro mg gemäß Taxe-VK der Lauer-Taxe (Preisstand: 01.07.2015, Online-Version) aus den im Beratungsprotokoll genannten Arzneiprodukten herangezogen. Parallel- und Re-Importe wurden nicht berücksichtigt.

Zu berücksichtigende gesetzliche Rabatte bei Medikamentenversorgung:

- Apothekenrabatt nach § 130 Abs. 1 SGB V
- Herstellerrabatt nach § 130a Abs. 1 und 1a SGB V
- Preismoratorium nach § 130a Abs. 3a SGB V
- Generikarabatt nach § 130a Abs. 3b SGB V

Die im Rahmen der Verhandlung nach § 130b SGB V auf Basis der Nutzenbewertung vereinbarten Rabatte sind bei den folgenden Kostenberechnungen berücksichtigt.

Basierend auf den dargestellten Angaben zum Jahresdurchschnittsverbrauch (Tabelle 3-13) und den dargestellten Angaben zu den Arzneimittelkosten (Tabelle 3-14) werden zunächst die jährlichen Kosten der Arzneimitteltherapie ermittelt.

Pembrolizumab:

Pembrolizumab ist als 50 mg Durchstechflasche erhältlich. Der Apothekenabgabepreis für Pembrolizumab beträgt 2.245,20 € je Packung.

Daraus ergeben sich Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte von 2.118,48 € je 50 mg Packung.

Tabelle 3-15: Kosten des zu bewertenden Arzneimittels pro Patient und Patientin

Bezeichnung	KEYTRUDA® 50 mg
Apothekenverkaufspreis (Taxe-VK)	2.245,20 €
abzgl. Apothekenrabatt [§130 Abs. 1 SGB V]	-1,77 €
abzgl. Herstellerrabatt [§130a Abs. 1 und 1a SGB V]	-124,95 €
abzgl. Preismoratorium [§ 130a Abs. 3a SGB V]	k. A.
abzgl. Generikarabatt [§ 130a Abs. 3b SGB V]	k. A.
Arzneimittelkosten je Darreichungsform GKV-Perspektive = (Taxe-VK – Apothekenrabatt – Herstellerrabatt)	2.118,48 €
Maximale Arzneimittelkosten pro erwachsene Patientin aus GKV-Perspektive	$(2.118,48 \text{ €} \times 3) \times 17 \text{ Zyklen} = 108.042,48 \text{ €}$
Maximale Arzneimittelkosten pro erwachsener Patient aus GKV-Perspektive	$(2.118,48 \text{ €} \times 4) \times 17 \text{ Zyklen} = 144.056,64 \text{ €}$
k. A.: Keine Angabe	

Die Dosierungsempfehlung für KEYTRUDA® liegt bei 2 mg/kg Körpergewicht.

Der Durchschnittsverbrauch (inklusive der rechnerischen Einbeziehung von Verwurf) liegt pro Behandlung je Patientin bei 150 mg (dreimal 50 mg) und je Patient bei 200 mg (viermal 50 mg).

Die Behandlungen sollten im Abstand von jeweils drei Wochen stattfinden, womit sich in einem Jahr 17 Behandlungen ergeben. Auf ein Jahr bezogen, entstehen der GKV maximale Arzneimittelkosten in Höhe von 108.042,48 € pro Patientin und 144.056,64 € pro Patient. Eventuell anfallender Verwurf wurde bei dieser Kalkulation entgegen der Versorgungsrealität pro Patient berücksichtigt.

Im Folgenden wird die Berechnung der maximalen Arzneimittelkosten aus GKV-Perspektive pro mg dargestellt.

Tabelle 3-16: Kosten des zu bewertenden Arzneimittels pro mg pro Patient und Patientin

Bezeichnung	KEYTRUDA® 1 mg
Apothekenverkaufspreis (Taxe-VK)	44,90 €
abzgl. Apothekenrabatt [§130 Abs. 1 SGB V]	-0,0354 €
abzgl. Herstellerrabatt [§130a Abs. 1 und 1a SGB V]	-2,50 €
abzgl. Preismoratorium [§ 130a Abs. 3a SGB V]	k. A.
abzgl. Generikarabatt [§ 130a Abs. 3b SGB V]	k. A.
Arzneimittelkosten je Darreichungsform GKV-Perspektive = (Taxe-VK – Apothekenrabatt – Herstellerrabatt)	42,37 €
Maximale Arzneimittelkosten pro erwachsene Patientin aus GKV-Perspektive	$(136,8 \text{ mg} \times 42,37 \text{ €}) \times 17 \text{ Zyklen} = 98.534,74 \text{ €}$
Maximale Arzneimittelkosten pro erwachsener Patient aus GKV-Perspektive	$(168,6 \text{ mg} \times 42,37 \text{ €}) \times 17 \text{ Zyklen} = 121.439,75 \text{ €}$
k. A.: Keine Angabe	

Dacarbazin:

Der Apothekenabgabepreis für eine Packung Dacarbazin 100 mg beträgt 213,27 € je zehn Durchstechflaschen, für eine Packung Dacarbazin 200 mg 415,56 € je zehn Durchstechflaschen, für Dacarbazin 500 mg 112,13 € je Packung und für Dacarbazin 1.000 mg 213,27 € je Packung (16).

Tabelle 3-17: Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie Dacarbazin pro Patient und Patientin

Bezeichnung	DETIMEDAC [®]			
	100 mg (10 Stück)	200 mg (10 Stück)	500 mg (1 Stück)	1.000 mg (1 Stück)
Apothekenverkaufspreis (Taxe-VK)	213,27 €	415,56 €	112,13 €	213,27 €
abzgl. Apothekenrabatt [§130 Abs. 1 SGB V]	-1,77 €	-1,77 €	-1,77 €	-1,77 €
abzgl. Herstellerrabatt [§130a Abs. 1 und 1a SGB V]	-9,60 €	-19,20 €	-4,80 €	-9,60 €
abzgl. Preismoratorium [§ 130a Abs. 3a SGB V]	-7,56 €	-79,80 €	-24,78 €	-55,19 €
abzgl. Generikarabatt [§ 130a Abs. 3b SGB V]	-16,00 €	-32,00 €	-8,00 €	-16,00 €
Arzneimittelkosten je Darreichungsform GKV-Perspektive = (Taxe-VK – Apothekenrabatt – Herstellerrabatt – Preismoratorium – Generikarabatt)	178,34 €	282,79 €	72,78 €	130,71 €
Maximale Arzneimittelkosten pro erwachsene Patientin aus GKV-Perspektive	17 Zyklen x 1 Gabe x (1 x 1.000 mg + 1 x 500 mg) = 3.459,33 €			
Maximale Arzneimittelkosten pro erwachsener Patient aus GKV-Perspektive	(17 Zyklen x 1 Gabe x (1 x 1.000 mg + 1 x 500 mg)) + ((2 x 100 mg (10 Stück)) + (2 x 200 mg (10 Stück))) = 4.381,59 €			
Quelle: (16) (Stand: 01.07.2015)				

Der Taxe-VK für Dacarbazin beruht auf der Wirkstärke von DETIMEDAC[®] (16), das als preisgünstigstes Präparat (Preisstand: 01.07.2015) aus der Lauer-Taxe entnommen wurde.

Unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen Rabatte, ergibt sich ein Arzneimittelpreis aus GKV-Perspektive je Packung von:

178,34 € für die 100 mg (zehn Stück) Packung
 282,79 € für die 200 mg (zehn Stück) Packung
 72,78 € für die 500 mg (ein Stück) Packung
 130,71 € für die 1.000 mg (ein Stück) Packung

Bei einem Jahresdurchschnittsverbrauch von je 17 Packungen zu 1.000 mg, 17 Packungen zu 500 mg ergeben sich jährliche Arzneimittelkosten von insgesamt 3.459,33 € pro Patientin.

Pro Patient ergibt sich ein Jahresdurchschnittsverbrauch von 17 Packungen zu 1.000 mg, 17 Packungen zu 500 mg und zwei Packungen zu 200 mg mit zehn Stück, sowie zwei Packungen

zu 100 mg mit zehn Stück. Dies entspricht Arzneimittelkosten in Höhe von insgesamt 4.381,59 € pro Patient.

Eventuell anfallender Verwurf wurde bei diesen Kalkulationen berücksichtigt.

Temozolomid:

Der Apothekenabgabepreis für eine Packung Temozolomid 100 mg beträgt 509,49 € je fünf Stück, für eine Packung Temozolomid 140 mg beträgt 714,49 € je fünf Stück, für eine Packung Temozolomid 180 mg beträgt 918,49 € je fünf Stück, für eine Packung Temozolomid 250 mg beträgt 1.278,49 € je fünf Stück (17).

Tabelle 3-18: Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie Temozolomid pro Patient und Patientin

Bezeichnung	TEMOZOLOMIDE SUN [®]			
	100 mg (5 Stück)	140 mg (5 Stück)	180 mg (5 Stück)	250 mg (5 Stück)
Festbetrag § 35 SGB V	509,49 €	714,49 €	918,49 €	1.278,49 €
abzgl. Apothekenrabatt [§130 Abs. 1 SGB V]	-1,77 €	-1,77 €	-1,77 €	-1,77 €
Arzneimittelkosten je Darreichungsform GKV-Perspektive = (Festbetrag – Apothekenrabatt)	507,72 €	712,72 €	916,72 €	1.276,72 €
Maximale Arzneimittelkosten pro erwachsene Patientin aus GKV-Perspektive	Zyklus 1 = 1 x 100 mg (5 Stk.) + 1 x 180 mg (5 Stk.) Zyklus 2–13 = 12 x 250 mg (5 Stk.) + 12 x 100 mg (5 Stk.) Gesamtkosten = 22.837,72 €			
Maximale Arzneimittelkosten pro erwachsener Patient aus GKV-Perspektive	Zyklus 1 = 1 x 140 mg (5 Stk.) + 1 x 180 mg (5 Stk.) Zyklus 2–13 = 12 x 250 mg (5 Stk.) + 12 x 180 mg (5 Stk.) Gesamtkosten = 27.950,72 €			
Quelle: (17) (Stand: 01.07.2015)				

Seit dem 1. Januar 2013 gelten Festbeträge für den Wirkstoff Temozolomid (17). Der Festbetrag für Temozolomid beruht auf der Wirkstärke von TEMOZOLOMIDE SUN[®]. Der Taxe-VK für Temozolomid beruht auf der Wirkstärke von TEMOZOLOMIDE SUN[®] (17), das als preisgünstigstes Präparat (Preisstand: 01.07.2015) aus der Lauer-Taxe entnommen wurde.

507,72 € für die 100 mg (fünf Stück) Packung
 717,72 € für die 140 mg (fünf Stück) Packung
 916,72 € für die 180 mg (fünf Stück) Packung
 1.276,72 € für die 250 mg (fünf Stück) Packung

Basierend auf dem Jahresdurchschnittsverbrauch für eine Patientin, ergeben sich folgende Packungsgrößen als die günstigste Verschreibungsvariante:

13 Packungen (je fünf Stück) à 100 mg

Eine Packung (je fünf Stück) à 180 mg

Zwölf Packungen (je fünf Stück) à 250 mg

Dies führt zu jährlichen Arzneimittelkosten von insgesamt 22.837,72 € pro Patientin.

Basierend auf dem Jahresdurchschnittsverbrauch für einen Patienten, ergeben sich folgende Packungsgrößen als die günstigste Verschreibungsvariante:

Eine Packung (je fünf Stück) à 140 mg

13 Packungen (je fünf Stück) à 180 mg

Zwölf Packungen (je fünf Stück) à 250 mg

Dies führt zu jährlichen Arzneimittelkosten in Höhe von 27.950,72 € pro Patient.

Paclitaxel:

Der Apothekenabgabepreis für Paclitaxel 30 mg beträgt 137,34 € je Packung, für Paclitaxel 100 mg beträgt 400,55 € je Packung und für Paclitaxel 300 mg beträgt 1.281,62 € je Packung (19).

Tabelle 3-19: Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie Paclitaxel pro Patient und Patientin

Bezeichnung	PACLITAXEL ACCORD®		
	30 mg (1 Stück)	100 mg (1 Stück)	300 mg (1 Stück)
Apothekenverkaufspreis (Taxe-VK)	137,34 €	400,55 €	1.281,62 €
abzgl. Apothekenrabatt [§130 Abs. 1 SGB V]	-1,77 €	-1,77 €	-1,77 €
abzgl. Herstellerrabatt [§130a Abs. 1 und 1a SGB V]	-6,00 €	-18,49 €	-60,30 €
abzgl. Preismoratorium [§ 130a Abs. 3a SGB V]	k. A.	k. A.	k. A.
abzgl. Generikarabatt [§ 130a Abs. 3b SGB V]	k. A.	-30,81 €	k. A.
Arzneimittelkosten je Dargebotsform GKV-Perspektive = (Taxe-VK – Apothekenrabatt – Herstellerrabatt)	129,57 €	349,48 €	1.219,55 €
Maximale Arzneimittelkosten pro erwachsene Patientin aus GKV-Perspektive	42 Behandlungstage x (2 x 100 mg) = 29.356,32 €		
Maximale Arzneimittelkosten pro erwachsener Patient aus GKV-Perspektive	42 Behandlungstage x (2 x 100 mg + 1 x 30 mg) = 34.798,26 €		
Quelle: (19) (Stand: 01.07.2015) k. A.: Keine Angabe			

Der Taxe-VK für Paclitaxel beruht auf der Wirkstärke von PACLITAXEL ACCORD® (19), das als preisgünstigstes Präparat pro mg (Preisstand: 01.07.2015) aus der Lauer-Taxe entnommen wurde.

Unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen Rabatte, ergibt sich ein Arzneimittelpreis aus GKV-Perspektive je Packung von:

129,57 € für die 30 mg (ein Stück) Packung

349,48 € für die 100 mg (ein Stück) Packung

1.219,55 € für die 300 mg (ein Stück) Packung

Pro erwachsene Patientin ergibt sich ein Jahresdurchschnittsverbrauch von insgesamt 84 Packungen mit 100 mg. Die jährlichen Arzneimittelkosten pro Patientin liegen insgesamt bei 29.356,32 €.

Pro erwachsenen Patient ergibt sich ein Jahresdurchschnittsverbrauch von insgesamt 84 Packungen mit 100 mg und 42 Packungen mit 30 mg. Die jährlichen Arzneimittelkosten pro Patient liegen insgesamt bei 34.798,26 €.

Carboplatin & Paclitaxel als Kombinationstherapie:

Tabelle 3-20: Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie Carboplatin & Paclitaxel pro Patient und Patientin

Bezeichnung	CARBOPLATIN ACCORD®				PACLITAXEL ACCORD®		
	50 mg (1 Stück)	150 mg (1 Stück)	450 mg (1 Stück)	600 mg (1 Stück)	30 mg (1 Stück)	100 mg (1 Stück)	300 mg (1 Stück)
Apothekenverkaufspreis (Taxe-VK)	37,10 €	91,05 €	252,91 €	333,84 €	137,34 €	400,55 €	1.281,62 €
abzgl. Apothekenrabatt [§130 Abs. 1 SGB V]	-1,77 €	-1,77 €	-1,77 €	-1,77 €	-1,77 €	-1,77 €	-1,77 €
abzgl. Herstellerrabatt [§130a Abs. 1 und 1a SGB V]	-1,24 €	-3,80 €	-11,48 €	-15,32 €	-6,00 €	-18,49 €	-60,30 €
abzgl. Preismoratorium [§130a Abs. 3a SGB V]	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
abzgl. Generikarabatt [§130a Abs. 3b SGB V]	-2,07 €	-6,33 €	-19,14 €	-25,54 €	k. A.	-30,81 €	k. A.
Arzneimittelkosten je Darreichungsform GKV- Perspektive = (Festbetrag – Apothekenrabatt)	32,02 €	79,15 €	220,52 €	291,21 €	129,57 €	349,48 €	1.219,55 €
Maximale Arzneimittelkosten pro erwachsene Patientin aus GKV-Perspektive	Zyklus 1 – 4 = 4 Zyklen x (600 mg + 150 mg + 50 mg) Zyklus 5 – 17 = 13 Zyklen (600 mg + 50 mg) Gesamtkosten = 5.811,51 €				Zyklus 1 – 4 = 4 Zyklen x (300 mg + 100 mg) Zyklus 5 – 17 = 13 Zyklen x (300 mg + 30 mg) Gesamtkosten = 23.814,68 €		
Maximale Arzneimittelkosten pro erwachsener Patient aus GKV-Perspektive	Zyklus 1 – 4 = 4 Zyklen x (600 mg + 450 mg) Zyklus 5 – 17 = 13 Zyklen x (600 mg + 150 mg + 50 mg) Gesamtkosten = 7.277,86 €				Zyklus 1 – 4 = 4 Zyklen x (300 mg + 100 mg + (2 x 30 mg)) Zyklus 5 – 17 = 13 Zyklen x (300 mg + (2 x 30 mg)) Gesamtkosten = 26.535,65 €		
Quellen: (18, 19) (Stand: 01.07.2015)							

Zur Berechnung der Jahrestherapiekosten von Paclitaxel in Kombination mit Carboplatin wurde, wie schon in den Monotherapien, die preisgünstigsten Präparate pro mg (Preisstand: 01.07.2015) aus der Lauer-Taxe entnommen (PACLITAXEL ACCORD® (19) / CARBOPLATIN ACCORD® (18)).

Unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen Rabatte ergibt sich ein Arzneimittelpreis aus GKV-Perspektive je Packung von:

CARBOPLATIN ACCORD[®]

32,02 € für die 50 mg (ein Stück) Packung
79,15 € für die 150 mg (ein Stück) Packung
220,52 € für die 450 mg (ein Stück) Packung
291,21 € für die 600 mg (ein Stück) Packung

PACLITAXEL ACCORD[®]

129,57 € für die 30 mg (ein Stück) Packung
349,48 € für die 100 mg (ein Stück) Packung
1.219,55 € für die 300 mg (ein Stück) Packung

Pro erwachsene Patientin ergeben sich folgende Packungsgrößen als die günstigste Verschreibungsvariante:

Carboplatin:

17 Packungen à 50 mg
Vier Packungen à 150 mg
17 Packungen à 600 mg

Paclitaxel:

13 Packungen à 30 mg
Vier Packungen à 100 mg
17 Packungen à 300 mg

Pro erwachsene Patientin ergeben sich für die Kombinationstherapie Carboplatin und Paclitaxel somit jährliche Arzneimittelkosten von insgesamt 29.626,19 €.

Pro erwachsener Patient ergeben sich folgende Packungsgrößen als die günstigste Verschreibungsvariante:

Carboplatin:

13 Packungen à 50 mg
13 Packungen à 150 mg
Vier Packungen à 450 mg
17 Packungen à 600 mg

Paclitaxel:

34 Packungen à 30 mg
Vier Packungen à 100 mg
17 Packungen à 300 mg

Pro erwachsenen Patient ergeben sich für die Kombinationstherapie Carboplatin und Paclitaxel somit jährliche Arzneimittelkosten von insgesamt 33.813,51 €.

Eventuell anfallender Verwurf wurde bei diesen Kalkulationen berücksichtigt.

3.3.4 Angaben zu Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen

Bestehen bei Anwendung des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie entsprechend der Fach- oder Gebrauchsinformation regelhaft Unterschiede bei der notwendigen Inanspruchnahme ärztlicher Behandlung oder bei der Verordnung sonstiger Leistungen zwischen dem zu bewertenden Arzneimittel und der zweckmäßigen Vergleichstherapie, sind diese bei den Krankenkassen tatsächlich entstehenden Kosten zu berücksichtigen. Im nachfolgenden Abschnitt werden die Kosten dieser zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen dargestellt.

Geben Sie in der nachfolgenden Tabelle 3-21 an, welche zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen (notwendige regelhafte Inanspruchnahme ärztlicher Behandlung oder Verordnung sonstiger Leistungen zulasten der GKV) bei Anwendung des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie entsprechend der Fach- oder Gebrauchsinformation entstehen. Geben Sie dabei auch an, wie häufig die Verordnung zusätzlich notwendiger GKV-Leistungen pro Patient erforderlich ist: Wenn die Verordnung abhängig vom Behandlungsmodus (Episode, Zyklus, kontinuierlich) ist, soll dies vermerkt werden. Die Angaben müssen sich aber insgesamt auf einen Jahreszeitraum beziehen. Machen Sie diese Angaben sowohl für das zu bewertende Arzneimittel als auch für die zweckmäßige Vergleichstherapie sowie getrennt für die Zielpopulation und die Patientengruppen mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen (siehe Abschnitt 3.1). Fügen Sie für jede Therapie, jede Population bzw. Patientengruppe und jede zusätzlich notwendige GKV-Leistung eine neue Zeile ein. Begründen Sie ihre Angaben zu Frequenz und Dauer.

Tabelle 3-21: Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen bei Anwendung der Arzneimittel gemäß Fach- oder Gebrauchsinformation (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Bezeichnung der zusätzlichen GKV-Leistung	Anzahl der zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen je Episode, Zyklus etc.	Anzahl der zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen pro Patient pro Jahr
Pembrolizumab (KEYTRUDA®)	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	Zuschlag für die Herstellung parenteraler Lösungen mit monoklonalen Antikörpern (14)	1	17
Dacarbazin (DETIMEDAC®)	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten.	Zuschlag für die Herstellung einer Zytostatika-haltigen parenteralen Zubereitung (14)	1	17
Temozolomid (TEMOZOLOMIDE SUN®)	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten.	k. A.	k. A.	k. A.
Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD®)	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten.	Praxisklinische Betreuung (reine Betreuungszeit mindestens 121 Minuten)	1	42
		Dreifache Prämedikation vor jeder Gabe Paclitaxel, Kortikosteroid, i. v.: Dexamethason 20 mg	6	42
		Dreifach Prämedikation vor jeder Gabe Paclitaxel (Diphenhydramin i. v. 30 – 60 Min. vorher)	6	42
		Dreifach Prämedikation vor jeder Gabe Paclitaxel, H2-Antagonist, i. v.: Ranitidin 50mg	6	42
Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD®) und	Mit Ipilimumab vorbehandelte	Praxisklinische Betreuung (reine Betreuungszeit	1	17

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Bezeichnung der zusätzlichen GKV-Leistung	Anzahl der zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen je Episode, Zyklus etc.	Anzahl der zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen pro Patient pro Jahr
Carboplatin (CARBOPLATIN ACCORD®)	Patienten.	mindestens 241 Minuten)		
		Prämedikation vor jeder Gabe Paclitaxel, Kortikosteroid, i. v.: Dexamethason 20 mg	1	17
		Prämedikation vor jeder Gabe Paclitaxel, Antiemistische prophylaxe (Diphenhydramin i. v. 30 – 60 Min. vorher)	1	17
		Prämedikation vor jeder Gabe Paclitaxel, H2-Antagonist, i. v.: Ranitidin 50mg	1	17
Quellen: Fachinformationen zu KEYTRUDA® (Stand: Juli 2015) (1), DETIMEDAC® (Stand: März 2015) (2), TEMOZOLOMIDE SUN® (Stand: Juni 2015) (3), PACLITAXEL ACCORD® (Stand: April 2015) (20), CARBOPLATIN ACCORD® (Stand: April 2015) (11), (4, 7, 8, 21) k. A.: Keine Angabe				

Begründen Sie die Angaben in Tabelle 3-21 unter Nennung der verwendeten Quellen. Ziehen Sie dabei auch die Angaben zur Behandlungsdauer (wie im Abschnitt 3.3.1 angegeben) heran.

Die in Tabelle 3-21 dargestellten zusätzlichen Leistungen zu Lasten der GKV wurden auf Basis der aktuellen Fach- oder Gebrauchsinformationen für Pembrolizumab (1), Dacarbazin (2), Temozolomid (3), einer S3-Leitlinie malignen Melanom (4) und zusätzlichen Studiendaten für Paclitaxel (5) sowie die Kombinationstherapie Paclitaxel und Carboplatin zusammengestellt. Dabei werden nur mit der Anwendung der Arzneimitteltherapie unmittelbar in Zusammenhang stehende Kosten berücksichtigt, die durch regelhaft erforderliche zusätzliche Leistungen angefallen sind.

Zusatzleistungen, bei denen sich laut Fach- und Gebrauchsinformation bei der Inanspruchnahme keine regelhaften Unterschiede bei allen oben aufgeführten Produkten ergeben (wie zum Beispiel die Grundpauschale für onkologische Behandlung durch einen Facharzt), wurden nicht berücksichtigt.

Auf Basis der aus den Fachinformationen herangezogenen Angaben werden die Häufigkeit der relevanten zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen pro Behandlung oder Episode pro Jahr ermittelt. Bei Angaben je Behandlungszyklus wurden die Mengen mit der Anzahl der jeweiligen Behandlungszyklen pro Jahr multipliziert.

Angaben zu den Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen bei Behandlung mit Pembrolizumab (KEYTRUDA®)

Herstellung parenteraler Lösungen mit monoklonalen Antikörpern

Entsprechend der Fachinformation von Pembrolizumab ist die Herstellung einer parenteralen Zubereitung mit monoklonalen Antikörpern notwendig.

Für die Herstellung parenteraler Zubereitungen mit monoklonalen Antikörpern ist ein Zuschlag von 71,00 € je Einheit abrechnungsfähig (14).

Angaben zu den Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen bei Behandlung mit Dacarbazin (DETIMEDAC®)

Herstellung einer Zytostatika-haltigen parenteralen Zubereitung

Laut der Fachinformation von Dacarbazin ist die Herstellung einer Zytostatika-haltigen parenteralen Zubereitung erforderlich.

Für die Herstellung Zytostatika-haltiger parenteraler Zubereitungen ist ein Zuschlag von 81,00 € je Einheit abrechnungsfähig (14).

Angaben zu den Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen bei Behandlung mit Temozolomid (TEMOZOLOMIDE SUN®)

Keine Angaben.

Angaben zu den Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen bei Behandlung mit Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD®)

Praxisklinische Betreuung und Nachsorge

Entsprechend der Anforderungen der Fachinformation wird PACLITAXEL ACCORD® (20) im empfohlenen Induktionsregime intravenös über einen Zeitraum von 180 Minuten verabreicht (22). Somit erfolgt die praxisklinische Betreuung für die Dauer der Infusionszeit zuzüglich der Vor- und Nachbetreuung und fällt einmal pro Behandlung/ Gabe für PACLITAXEL ACCORD® an.

Prämedikation

Als Prämedikation sollte Dexamethason oral oder intravenös (20 mg) ca. zwölf und sechs Stunden bzw. 30 bis 60 Minuten vor jeder Gabe von PACLITAXEL ACCORD® verabreicht werden. Zusätzlich beinhaltet die Prämedikation die intravenöse Gabe Diphenhydramin und eines H2-Blockers, z. B. Ranitidin mit einer jeweiligen Dosierung von 50 mg oder 300 mg, die 30 bis 60 Minuten vor der Gabe von Paclitaxel erfolgen soll.

Angaben zu den Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen bei Behandlung mit einer Carboplatin (CARBOPLATIN ACCORD[®]) und Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD[®]) Kombinationstherapie

Praxisklinische Betreuung und Nachsorge

Entsprechend der Anforderungen der Fachinformation wird PACLITAXEL ACCORD[®] (20) im empfohlenen Induktionsregime intravenös über einen Zeitraum von 180 Minuten verabreicht (22). Anschließend erfolgt die Gabe von Carboplatin (4). Die praxisklinische Betreuung für die Dauer der Infusionszeiten zuzüglich der Vor- und Nachbetreuung (reine Betreuungszeit mindestens 241 Minuten) fällt einmal pro Behandlung/Gabe für Carboplatin (CARBOPLATIN ACCORD[®]) und Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD[®]) Kombinationstherapie an.

Prämedikation

Als Prämedikation sollte Dexamethason oral oder intravenös (20 mg) ca. zwölf und sechs Stunden bzw. 30 bis 60 Minuten vor jeder Gabe von PACLITAXEL ACCORD[®] verabreicht werden. Zusätzlich beinhaltet die Prämedikation die intravenöse Gabe von Diphenhydramin und Ranitidin oder Cimetidin mit einer jeweiligen Dosierung von 50 mg oder 300 mg, die 30 bis 60 Minuten vor der Gabe von Paclitaxel erfolgen soll.

Geben Sie in der nachfolgenden Tabelle 3-22 an, wie hoch die Kosten der in Tabelle 3-21 benannten zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen pro Einheit jeweils sind. Geben Sie, so zutreffend, EBM-Ziffern oder OPS Codes an. Fügen Sie für jede zusätzlich notwendige GKV-Leistung eine neue Zeile ein.

Tabelle 3-22: Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen – Kosten pro Einheit

Bezeichnung der zusätzlich notwendigen GKV-Leistung	Kosten pro Leistung in Euro
Zu bewertendes Arzneimittel: Pembrolizumab (KEYTRUDA®)	
Zuschlag für die Herstellung parenteraler Zubereitungen mit monoklonalen Antikörpern (14)	71,00 €
Zweckmäßige Vergleichstherapie: Patientenindividuelle Therapie nach Maßgabe des behandelnden Arztes unter Berücksichtigung des Zulassungsstatus und der jeweiligen Vortherapie – Dacarbazin (DETIMEDAC®)	
Zuschlag für die Herstellung einer Zytostatika-haltigen parenteralen Zubereitung (14)	81,00 €
Zweckmäßige Vergleichstherapie: Patientenindividuelle Therapie nach Maßgabe des behandelnden Arztes unter Berücksichtigung des Zulassungsstatus und der jeweiligen Vortherapie – Temozolomide (TEMOZOLOMIDE SUN®)	
k. A.	k. A.
Zweckmäßige Vergleichstherapie: Patientenindividuelle Therapie nach Maßgabe des behandelnden Arztes unter Berücksichtigung des Zulassungsstatus und der jeweiligen Vortherapie – Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD®)	
Praxisklinische Betreuung Dauer mehr als 2 Stunden (EBM Ziffer 01510)	51,56 €
Prämedikation: vor jeder Gabe Paclitaxel Behandlung muss eine Prämedikation mit Corticosteroiden erfolgen (i. v. Dexamethason, 20 mg)	2,06 €
Prämedikation: vor jeder Gabe Paclitaxel Behandlung muss eine Prämedikation mit Antihistaminika erfolgen (i. v. Diphenhydramin, 50 mg)	1,66 €
Prämedikation: vor jeder Gabe Paclitaxel Behandlung muss eine Prämedikation mit H2-Antagonisten erfolgen (i. v. Ranitidin 50 mg)	2,61 €
Zweckmäßige Vergleichstherapie: Patientenindividuelle Therapie nach Maßgabe des behandelnden Arztes unter Berücksichtigung des Zulassungsstatus und der jeweiligen Vortherapie – Carboplatin (CARBOPLATIN ACCORD®) und Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD®) Kombinationstherapie	
Praxisklinische Betreuung Dauer mehr als 4 Stunden (EBM Ziffer 01511)	98,10 €
Prämedikation: vor jeder Gabe PACLITAXEL ACCORD® muss eine Prämedikation mit Kortikosteroiden erfolgen (i. v. Dexamethason, 20 mg)	2,06 €
Prämedikation: vor jeder Gabe PACLITAXEL ACCORD® muss eine Prämedikation mit Antihistaminika erfolgen (i. v. Diphenhydramin, 50 mg)	1,66 €
Prämedikation: vor jeder Gabe PACLITAXEL ACCORD® muss eine Prämedikation mit H2-Antagonisten erfolgen (i. v. Ranitidin 50 mg)	2,61 €
Quellen: Fachinformationen zu KEYTRUDA® (Stand: Juli 2015) (1), DETIMEDAC® (Stand: März 2015) (2), TEMOZOLOMIDE SUN® (Stand: Juni 2015) (3), PACLITAXEL ACCORD® (Stand: April 2015) (20), CARBOPLATIN ACCORD® (Stand: April 2015) (11), (4, 5, 21). Die aufgeführten Kosten pro Einheit der einzelnen GKV-Leistungen für zusätzlich notwendige ärztlichen Leistungen in Bezug auf praxisklinische Betreuung wurden der Asgard Verlag Software "Der Kommentar zu EBM und GOÄ" EBM 2014 (Stand: 26.06.2015) entnommen. Laut EBM werden diese Leistungen pro Quartal wie oben angegeben vergütet. k. A.: Keine Angabe	

Begründen Sie die Angaben in Tabelle 3-22 unter Nennung der verwendeten Quellen.

Berechnung der Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen

Zur Berechnung der Kosten, für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen, wurden für die Darstellung der diagnostischen Tests und Laboruntersuchungen die entsprechenden Ziffern aus dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) herangezogen (Tabelle 3-17). Der aktuell gültige bundeseinheitliche Orientierungswert und der kalkulatorische Punktwert liegen bei 10 Cent (Stand: 26.06.2015) (21).

Ärztliche Leistungen

Die aufgeführten Kosten pro Einheit der einzelnen GKV-Leistungen für zusätzlich notwendige ärztlichen Leistungen in Bezug auf praxisklinische Betreuung wurden der Asgard Verlag Software "Der Kommentar zu EBM und GOÄ" EBM 2014 (Stand: 26.06.2015) entnommen. Laut EBM werden diese Leistungen pro Quartal wie oben angegeben vergütet.

Herstellung einer Zytostatika-haltigen parenteralen Zubereitung, sowie Herstellung einer parenteralen Zubereitung mit monoklonalen Antikörpern

Zur Darstellung der Kosten für Zytostatika-haltige parenterale Zubereitungen ist die Hilfstaxe (14) heranzuziehen, da die zusätzlich anfallenden Kosten nicht in den von der Lauer-Taxe veröffentlichten Apothekenverkaufspreisen einbezogen sind. Laut Hilfstaxe fällt für die Herstellung einer Zytostatika-haltigen parenteralen Zubereitung ein Zuschlag von 81,00 € je fertiger Applikation an (14). Für die Herstellung parenteraler Lösungen mit monoklonalen Antikörpern fällt ein Zuschlag von 71,00 € je fertiger Applikation an (14).

Geben Sie in Tabelle 3-23 an, wie hoch die zusätzlichen Kosten bei Anwendung der Arzneimittel gemäß Fach- oder Gebrauchsinformation pro Jahr sind, und zwar pro Patient sowie für die jeweilige Population / Patientengruppe insgesamt. Führen Sie hierzu die Angaben aus Tabelle 3-21 (Anzahl zusätzlich notwendiger GKV-Leistungen), Tabelle 3-22 (Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen je Einheit), Tabelle 3-8 (Anzahl der Patienten in der Zielpopulation) und Tabelle 3-10 (Anzahl Patienten mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen) zusammen. Fügen Sie für jede Therapie und Population bzw. Patientengruppe sowie jede zusätzlich notwendige GKV-Leistung eine neue Zeile ein.

Tabelle 3-23: Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen – Zusatzkosten für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie pro Jahr (pro Patient und für die jeweilige Population / Patientengruppe insgesamt)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Bezeichnung der zusätzlich notwendigen GKV-Leistung	Zusatzkosten pro Patient pro Jahr in Euro	Zusatzkosten für die Population bzw. Patientengruppe insgesamt in Euro
Pembrolizumab (KEYTRUDA®)	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	Zuschlag für die Herstellung parenteraler Zubereitungen (14)	1.207,00 €	1,237.175,00 € – 1.546.167,00 €
Dacarbazin (DETIMEDAC®)	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten	Zuschlag für die Herstellung einer Zytostatika-haltigen parenteralen Zubereitung (14)	1.377,00 €	1.411.425,00 € – 1.763.937,00 €
Temozolomid (TEMOZOLOMIDE SUN®)	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten.	k. A.	k. A.	k. A.
Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD®)	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten.	Praxisklinische Betreuung (reine Betreuungszeit mindestens 121 Minuten) (EBM-Ziffer 01510)	2.165,52 €	2.219.658,00 € – 2.774.031,12 €
		Prämedikation: vor jeder Gabe Paclitaxel Behandlung muss eine Prämedikation mit Corticosteroiden erfolgen (i. v. Dexamethason, 20 mg)	86,52 €	88.683,00 € – 110.832,12 €
		Prämedikation: vor jeder Gabe Paclitaxel Behandlung muss eine Prämedikation mit Anthistaminika erfolgen (i. v. Diphenhydramin, 50 mg)	69,72 €	71.463,00 € – 89.311,32 €
		Prämedikation: vor jeder Gabe Paclitaxel Behandlung muss eine Prämedikation mit H2-Antagonisten erfolgen (i. v. Ranitidin 50 mg)	109,62 €	112.360,50 € – 140.423,22 €

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Bezeichnung der zusätzlich notwendigen GKV-Leistung	Zusatzkosten pro Patient pro Jahr in Euro	Zusatzkosten für die Population bzw. Patientengruppe insgesamt in Euro
Carboplatin (CARBOPLATIN ACCORD®) und Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD®) als Kombinationstherapie	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten.	Praxisklinische Betreuung Dauer mehr als 4 Stunden (EBM Ziffer 01511)	1.667,70 €	1.709.392,50 € – 2.136.323,70 €
		Prämedikation: vor jeder Gabe PACLITAXEL ACCORD® muss eine Prämedikation mit Kortikosteroiden erfolgen (i. v. Dexamethason, 20 mg)	35,02 €	35.895,50 € – 44.860,62 €
		Prämedikation: vor jeder Gabe PACLITAXEL ACCORD® muss eine Prämedikation mit Antihistaminika erfolgen (i. v. Diphenhydramin, 50 mg)	28,22 €	28.925,50 € – 36.149,82 €
		Prämedikation: vor jeder Gabe PACLITAXEL ACCORD® muss eine Prämedikation mit H2-Antagonisten erfolgen (i. v. Ranitidin 50 mg)	44,37 €	45.479,25 € – 56.837,97 €
Die Bandbreite der Zielgruppe bezieht sich auf 1.025 bis 1.281 Patienten (siehe Tabelle 3-8). k. A.: keine Angaben				

Die Spannbreite der Zusatzkosten für die Population ergibt sich aus einer Patientenbandbreite von 1.025 bis 1.281 Patienten (siehe Tabelle 3-8).

3.3.5 Angaben zu Jahrestherapiekosten

Geben Sie in Tabelle 3-24 die Jahrestherapiekosten für die GKV durch Zusammenführung der in den Abschnitten 3.3.1 bis 3.3.4 entwickelten Daten an, und zwar getrennt für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie sowie getrennt für die Zielpopulation und die Patientengruppen mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen. Weisen Sie die Jahrestherapiekosten sowohl bezogen auf einen einzelnen Patienten als auch für die GKV insgesamt (d. h. für die gesamte jeweilige Population bzw. Patientengruppen

nach Abschnitt 3.2.3, Tabelle 3-8, sowie Abschnitt 3.2.5, Tabelle 3-10) aus. Fügen Sie für jede Therapie, Behandlungssituation und jede Population bzw. Patientengruppe eine neue Zeile ein. Unsicherheit sowie variierende Behandlungsdauern sollen in Form von Spannen ausgewiesen werden.

Tabelle 3-24: Jahrestherapiekosten für die GKV für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie (pro Patient und insgesamt)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Jahrestherapiekosten pro Patient in Euro	Jahrestherapiekosten GKV insgesamt in Euro ^a
Pembrolizumab (KEYTRUDA [®])	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten.	weiblich: 109.249,48 € männlich: 145.263,64 €	weiblich: 55.990.358,50 € - 69.974.291,94 € männlich: 74.447.615,50 € - 93.041.361,42 €
Dacarbazin (DETIMEDAC [®])	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten.	weiblich: 4.836,33 € männlich: 5.758,59 €	weiblich: 2.478.619,13 € – 3.097.669,37 € männlich: 2.951.277,38 € – 3.688.376,90 €
Temozolomid (TEMOZOLOMIDE SUN [®])	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten.	weiblich: 22.837,72 € männlich: 27.950,72 €	weiblich: 11.704.331,50 € – 14.627.559,66 € männlich: 14.285.102,13 € – 17.852.893,49 €
Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD [®])	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten.	weiblich: 31.787,70 € männlich: 37.229,64 €	weiblich: 16.291.196,25 € – 20.360.021,85 € männlich: 19.080.190,50 € – 23.845.584,42 €
Carboplatin (CARBOPLATIN ACCORD [®]) und Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD [®]) Kombinationstherapie	Mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten.	weiblich: 31.401,50 € männlich: 35.588,82 €	weiblich: 16.093.268,75 € – 20.112.660,75 € männlich: 18.239.270,25 € - 22.794.639,21 €
a: Als Jahrestherapiekosten GKV insgesamt sollen die Kosten ausgewiesen werden, die der GKV entstehen, wenn die in Abschnitt 3.2.3, Tabelle 3-8, sowie Abschnitt 3.2.5, Tabelle 3-10 dargestellte Zielpopulation bzw. Patientengruppen vollständig mit dem zu bewertenden Arzneimittel behandelt werden.			
Die Bandbreite der Zielgruppe bezieht sich auf 1.025 bis 1.281 Patienten. Die geschlechterspezifische Aufteilung erfolgt 1:1. Somit befindet sich die Bandbreite für die weiblichen Patienten bei 512,5 bis 640,5 Patienten und für die männlichen Patienten bei 512,5 bis 640,5 Patienten (23).			

Pembrolizumab (KEYTRUDA[®])

Die Jahrestherapiekosten für die Pembrolizumab (KEYTRUDA[®]) -Behandlung summieren sich pro erwachsene Patientin auf insgesamt circa 109.249,48 € bzw. pro erwachsenen Patienten auf insgesamt circa 145.263,64 €.

Für die Therapie mit Pembrolizumab (KEYTRUDA[®]) ergeben sich, unter Zugrundelegung der geschätzten Zielpopulation, GKV-Jahrestherapiekosten für das zu bewertende Arzneimittel bei Patientinnen in Höhe von insgesamt mindestens ca. 55.990.358,50 € (109.249,48 € x 512,5 minimale Patientenzahl) bis maximal ca. 69.974.291,94 € (109.249,48 € x 640,5 maximale Patientenzahl) sowie bei Patienten in Höhe von insgesamt mindestens ca. 74.447.615,50 € (145.263,64 € x 512,5 minimale Patientenzahl) bis maximal ca. 93.041.361,42 € (145.263,64 € x 640,5 maximale Patientenzahl) (23).

Dacarbazin (DETIMEDAC[®])

Die Jahrestherapiekosten für die Dacabazin (DETIMEDAC[®]) –Behandlung bei Patienten summieren sich auf insgesamt circa 4.836,33 € pro Patientin bzw. circa 5.758,59 € pro Patient.

Für die Therapie mit Dacarbazin (DETIMEDAC[®]) ergeben sich GKV-Jahrestherapiekosten, unter Zugrundelegung der geschätzten Zielpopulation, für das zu bewertende Arzneimittel bei erwachsenen Patientinnen in Höhe von insgesamt ca. 2.478.619,13 € (4.836,33 € x 512,5 minimale Patientenzahl) bis maximal ca. 3.097.669,37 € (4.836,33 € x 640,5 maximale Patientenzahl) bzw. bei erwachsenen Patienten in Höhe von insgesamt mindestens ca. 2.951.277,38 € (5.758,59 € x 512,5 minimale Patientenzahl) bis maximal ca. 3.688.376,90 € (5.758,59 € x 640,5 maximale Patientenzahl) (23).

Temozolomid (TEMOZOLOMIDE SUN[®])

Die Jahrestherapiekosten für die Temozolomid (TEMOZOLOMIDE SUN[®]) –Behandlung summieren sich pro erwachsene Patientin auf insgesamt circa 22.837,72 € bzw. pro erwachsenen Patient auf insgesamt circa 27.950,72 €.

Für die Therapie mit Temozolomid (TEMOZOLOMIDE SUN[®]) ergeben sich GKV-Jahrestherapiekosten, unter Zugrundelegung der geschätzten Zielpopulation, für das zu bewertende Arzneimittel bei erwachsenen Patientinnen in Höhe von insgesamt ca. 11.704.331,50 € (22.837,72 € x 512,5 minimale Patientenzahl) bis maximal ca. 14.627.559,66 € (22.837,72 € x 640,5 maximale Patientenzahl) bzw. bei erwachsenen Patienten in Höhe von insgesamt mindestens ca. 14.324.744,00 € (27.950,72 € x 512,5 minimale Patientenzahl) bis maximal ca. 17.902.436,16 € (27.950,72 € x 640,5 maximale Patientenzahl) (23).

Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD[®])

Die Jahrestherapiekosten für die Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD[®]) –Behandlung summieren sich bei pro erwachsene Patientin auf insgesamt circa 31.787,70 € bzw. pro erwachsener Patient auf insgesamt circa 37.229,64 €.

Für die Therapie mit Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD[®]) ergeben sich GKV-Jahrestherapiekosten, unter Zugrundelegung der geschätzten Zielpopulation, für das zu bewertende Arzneimittel bei erwachsenen Patientinnen in Höhe von insgesamt ca. 16.291.196,25 € (31.787,70 € x 512,5 minimale Patientenanzahl) bis maximal ca. 20.360.021,85 € (31.787,70 € x 640,5 maximale Patientenanzahl) bzw. bei erwachsenen Patienten in Höhe von insgesamt mindestens ca. 19.080.190,50 € (37.229,64 € x 512,5 minimale Patientenanzahl) bis maximal ca. 23.845.584,42 € (37.229,64 € x 640,5 maximale Patientenanzahl) (23).

Carboplatin (CARBOPLATIN ACCORD[®]) und Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD[®]) Kombinationstherapie

Die Jahrestherapiekosten für die Carboplatin (CARBOPLATIN ACCORD[®]) und Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD[®]) Kombinations-Behandlung summieren sich pro erwachsene Patientin auf insgesamt circa 31.401,50 € bzw. pro erwachsener Patient auf insgesamt circa 35.588,82 €.

Für die Carboplatin (CARBOPLATIN ACCORD[®]) und Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD[®]) Kombinations-Behandlung ergeben sich GKV-Jahrestherapiekosten, unter Zugrundelegung der geschätzten Zielpopulation, für das zu bewertende Arzneimittel für erwachsenen Patientinnen in Höhe von insgesamt ca. 16.093.268,75 € (31.401,50 € x 512,5 minimale Patientenanzahl) bis maximal ca. 20.112.660,75 € (31.401,50 € x 640,5 maximale Patientenanzahl) bzw. für erwachsene Patienten in Höhe von insgesamt mindestens ca. 18.239.270,25 € (35.588,82 € x 512,5 minimale Patientenanzahl) bis maximal ca. 22.794.639,21 € (35.588,82 € x 640,5 maximale Patientenanzahl) (23).

3.3.6 Angaben zu Versorgungsanteilen

Beschreiben Sie unter Bezugnahme auf die in Abschnitt 3.2.3 dargestellten Daten zur aktuellen Prävalenz und Inzidenz, welche Versorgungsanteile für das zu bewertende Arzneimittel innerhalb des Anwendungsgebiets, auf das sich das vorliegende Dokument bezieht, zu erwarten sind. Nehmen Sie bei Ihrer Begründung auch Bezug auf die derzeit gegebene Versorgungssituation mit der zweckmäßigen Vergleichstherapie. Beschreiben Sie insbesondere auch, welche Patientengruppen wegen Kontraindikationen nicht mit dem zu bewertenden Arzneimittel behandelt werden sollten. Weiterhin ist zu erläutern, welche Raten an Therapieabbrüchen in den Patientengruppen zu erwarten sind. Im Weiteren sollen bei dieser Abschätzung auch der Versorgungskontext und Patientenpräferenzen berücksichtigt werden. Differenzieren Sie nach ambulantem und stationärem Versorgungsbereich. Benennen Sie die zugrunde gelegten Quellen.

Versorgungskontext

Das unter Kodierung A des vorliegenden Dossiers betrachtete Teilanwendungsgebiet umfasst mit Ipilimumab vorbehandelte Patienten.

Patienten, für welche die Resektion und/oder Strahlentherapie mit kurativer Zielsetzung angezeigt ist, stellen innerhalb der vom Anwendungsgebiet umschriebenen Patientengruppe Ausnahmefälle dar und werden im Rahmen der vorliegenden Fragestellung nicht betrachtet. Als Zielpopulation wird von denjenigen Patienten ausgegangen, für die eine Resektion und/oder Strahlentherapie mit kurativer Zielsetzung nicht angezeigt ist und die deshalb einer systemischen Therapie bedürfen.

Die systemische Therapie umfasst in Deutschland die Behandlung mit einer Chemotherapie, Ipilimumab und die Therapie mit BRAF-Inhibitoren (Dabrafenib oder Vemurafenib) (4).

Wie in Abschnitt 3.1.2 des vorliegenden Dossiers dargelegt, kommt für die hier zu betrachtende Patientenpopulation nur noch eine Chemotherapie als weitere Behandlung in Frage.

In Abschnitt 3.2.3 wurden Berechnungen zu Inzidenz und Prävalenz für das betrachtete Teilanwendungsgebiet angestellt. Die darin aufgeführten Szenarien schätzen den Anteil der neu erkrankten, erwachsenen Patienten an der (GKV)-Zielpopulation. Den Aufstellungen zufolge kommen 1.025 – 1.281 Patienten für eine Behandlung in Frage (Tabelle 3-5 in Abschnitt 3.2.3).

Voraussichtlicher Versorgungsanteil von Pembrolizumab im genannten Anwendungsgebiet

Für die Patienten, die prinzipiell für die Behandlung mit Pembrolizumab in Frage kommen, ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der Patienten aufgrund von Kontraindikationen, Therapieabbrüchen (unerwünschte Ereignisse) oder Patientenpräferenzen nicht behandelt werden könnte.

Kontraindikationen

Pembrolizumab ist kontraindiziert bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder gegen einen sonstig enthaltenen Bestandteil. Angaben zu relativen Anteilen an Patienten, die diesen Einschränkungen unterworfen sind, sind nicht verfügbar. Es wird aber aufgrund des hohen therapeutischen Bedarfs in dieser Indikation davon ausgegangen, dass nur sehr wenige Patienten aufgrund dieser Einschränkungen keine Therapie mit Pembrolizumab erhalten werden. Daher wird die Zielpopulation nicht aufgrund von Kontraindikationen eingeschränkt.

Therapieabbrüche wegen unerwünschter Ereignisse

Die zu erwartende Rate an Therapieabbrüchen orientiert sich an den Ergebnissen zu der klinischen Studie Keynote-002 (15). Der relative Anteil an unerwünschten Ereignissen, die zum Studienabbruch führten, betrug 8 %.

Patientenpräferenzen in Deutschland

In einer prospektiven Phase III Studie entschieden sich 70 % der Patienten bei der Zweitlinientherapie des fortgeschrittenen malignen Melanoms für eine Chemotherapie (24). Es wird davon ausgegangen, dass dieser Anteil bei Pembrolizumab aufgrund der höheren

Wirksamkeit und besseren Verträglichkeit von Pembrolizumab deutlich höher sein wird. Daher wird die Zielpopulation nicht aufgrund von Patientenpräferenzen eingeschränkt.

Basierend auf dem Therapiestandard im Teilanwendungsgebiet entsprechend der Leitlinien (4) wird ein Behandlungsanteil von 80 % für eine Therapie mit Anti-PD-1 Antikörpern angenommen. Es wird erwartet, dass zum Zeitpunkt der Markteinführung von Pembrolizumab ein weiterer Anti-PD-1 Antikörper im Anwendungsgebiet verfügbar sein wird (Nivolumab: Commission Decision wurde am 19.06.2015 erteilt (25)). Nivolumab und Pembrolizumab gehören der gleichen Wirkstoffklasse an, daher stehen die Präparate als alternative Therapieoptionen zur Verfügung. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass eine Obergrenze von bis zu 820 – 1.025 GKV-Patienten ($1.025 \cdot 0,8 / 1.281 \cdot 0,8$) in dem betrachteten Teilanwendungsgebiet für eine Therapie mit Anti-PD-1 Antikörpern zur Verfügung stehen.

Aufteilung ambulant/stationär

Die Versorgung von Patienten mit malignem Melanom findet vor allem in spezialisierten Hauttumorzentren statt. Es wird daher davon ausgegangen, dass Pembrolizumab im Krankenhaus fast vollständig im Rahmen der ambulanten Behandlung (§ 116 SGB V und § 129a SGB V) verabreicht wird. Auf eine Unterscheidung zwischen ambulanter und stationärer Behandlung wird hier daher verzichtet.

Beschreiben Sie auf Basis der von Ihnen erwarteten Versorgungsanteile, ob und, wenn ja, welche Änderungen sich für die in Abschnitt 3.3.5 beschriebenen Jahrestherapiekosten ergeben. Benennen Sie die zugrunde gelegten Quellen.

Aufgrund der gerade erfolgten Zulassung eines weiteren PD-1-Inhibitors, ist die Entwicklung der Versorgungsanteile von Pembrolizumab schwer vorherzusagen.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass eine Änderung der Versorgungsanteile die in Abschnitt 3.3.5 beschriebenen Jahrestherapiekosten pro Patient von Pembrolizumab nicht verändern werden.

3.3.7 Beschreibung der Informationsbeschaffung für Abschnitt 3.3

Erläutern Sie das Vorgehen zur Identifikation der in den Abschnitten 3.2.1 bis 3.2.5 genannten Quellen (Informationsbeschaffung). Im Allgemeinen sollen deutsche Quellen bzw. Quellen, die über die epidemiologische Situation in Deutschland Aussagen erlauben, herangezogen werden. Weiterhin sind bevorzugt offizielle Quellen zu nutzen. Aktualität und Repräsentativität sind bei der Auswahl zu berücksichtigen und ggf. zu diskutieren. Sofern erforderlich können Sie zur Beschreibung der Informationsbeschaffung weitere Quellen nennen.

Wenn eine Recherche in offiziellen Quellen oder in bibliografischen Datenbanken durchgeführt wurde, sollen Angaben zu den Suchbegriffen, den Datenbanken/Suchoberflächen, dem Datum der Recherche nach den üblichen Vorgaben gemacht werden. Die Ergebnisse der Recherche sollen dargestellt werden, damit nachvollziehbar ist, welche Daten bzw. Publikationen berücksichtigt bzw. aus- und eingeschlossen wurden. Sofern erforderlich, können Sie zur Beschreibung der Informationsbeschaffung weitere Quellen benennen.

Wenn eine (hier optionale) systematische bibliografische Literaturrecherche durchgeführt wurde, soll eine vollständige Dokumentation erfolgen. Die entsprechenden Anforderungen an die Informationsbeschaffung sollen nachfolgend analog den Vorgaben in Modul 4 (siehe Abschnitte 4.2.3.2 Bibliografische Literaturrecherche, 4.3.1.1.2 Studien aus der bibliografischen Literaturrecherche, Anhang 4-A, 4-C) umgesetzt werden.

In den Abschnitten 3.3.1 bis 3.3.6 wurden die folgenden Quellen berücksichtigt.

Angaben zum Behandlungsmodus (Patientengruppe, Dosierung, Behandlungsdauer, Verordnungseinschränkungen und Gegenanzeigen) für die zu berücksichtigenden Medikamente Pembrolizumab (KEYTRUDA[®]) (1), Dacarbazin (DETIMEDAC[®]) (2), Temozolomid (TEMOZOLOMIDE SUN[®]) (3), Paclitaxel (PACLITAXEL ACCORD[®]) (20) und Carboplatin (CARBOPLATIN ACCORD[®]) (11) wurden den jeweiligen Fachinformationen in ihrer aktuellen Form und/ oder bestehenden Studien entnommen.

Die Kosten des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie wurden der Lauer-Taxe (Stand: 01.07.2015) entnommen (16-19). Die Kosten wurden nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte unter Berücksichtigung der Vorgaben in den Paragraphen § 130 SGB V und § 130a SGB V bestimmt.

Angaben zu den Kosten der zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen wurden dem einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) für Innere Medizin entnommen. Die Berechnung der Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen, für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie erfolgte durch MSD unter Berücksichtigung der zuvor genannten Quellen.

Die Angabe zum durchschnittlichen Körpergewicht und der durchschnittlichen Körpergröße wurde aus dem Statistischen Bundesamt zitiert (Mikrozensus 2013 – Fragen zur Gesundheit – Körpermaße der Bevölkerung Wiesbaden) (10).

Alle Quellen sind hinter den entsprechenden Aussagen zitiert.

3.3.8 Referenzliste für Abschnitt 3.3

Listen Sie nachfolgend alle Quellen (z. B. Publikationen), die Sie in den Abschnitten 3.3.1 bis 3.3.7 angegeben haben (als fortlaufend nummerierte Liste). Verwenden Sie hierzu einen

allgemein gebräuchlichen Zitierstil (z. B. Vancouver oder Harvard). Geben Sie bei Fachinformationen immer den Stand des Dokuments an.

1. MSD SHARP & DOHME. Fachinformation KEYTRUDA[®] (Pembrolizumab). Stand: Juli 2015.
2. MEDAC. Fachinformation DETIMEDAC[®] (Dacarbazin). Stand: März 2015. URL: www.fachinfo.de. Zugriff am: 14.07.2015
3. SUN PHARMA. Fachinformation TEMOZOLOMIDE SUN[®] (Temozolomid). Stand: Juni 2015. URL: www.fachinfo.de. Zugriff am: 14.07.2015
4. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), Deutschen Krebsgesellschaft (DKG), Deutschen Krebshilfe. Leitlinienprogramm Onkologie: Malignes Melanom S3-Leitlinie „Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Melanoms“, Version 1.1, Langversion. Stand: Februar 2013. URL: <http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/032-024OL.html>. Zugriff am: 14.07.2015.
5. Zimpfer-Rechner C, Hofmann U, Figl R, et al. Randomized phase II study of weekly paclitaxel versus paclitaxel and carboplatin as second-line therapy in disseminated melanoma: a multicentre trial of the Dermatologic Co-operative Oncology Group (DeCOG). *Melanoma research*. 2003;13(5):531-6.
6. Calvert AH, Newell DR, Gumbrell LA, et al. Carboplatin Dosage: Prospective Evaluation of a Simple Formula Based on Renal Function. *Journal of Clinical Oncology*. 1989;7(11):1748-56.
7. Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA). Tragende Gründe zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach § 35a SGB V - Eribulin. Stand: 19.04. 2012. URL: https://www.g-ba.de/downloads/40-268-1925/2012-04-19_AM-RL-XII_Eribulin_TrG.pdf. Zugriff am: 14.07.2015.
8. Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA). Tragende Gründe zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach § 35a SGB V - Vemurafenib. Stand: 06.03. 2014. URL: https://www.g-ba.de/downloads/40-268-2713/2014-03-06_AM-RL-XII_Vemurafenib_2013-09-15-D-074_TrG.pdf. Zugriff am: 14.07.2015.
9. Du Bois D, Du Bois EF. A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known. 1916. *Nutrition*. 1989;5(5):303-11; discussion 12-3.
10. Statistisches Bundesamt (DESTATIS). Körpermaße nach Altersgruppen und Geschlecht. 2013. URL: <https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/GesundheitszustandRelevantesVerhalten/Tabellen/Koerpermasse.html> Zugriff am: 14.07.2015.
11. ACCORD. Fachinformation CARBOPLATIN ACCORD[®] (Carboplatin). Stand: April 2015. URL: <http://accord-healthcare.de/produkte/fachinformationen/>. Zugriff am: 14.07.2015.
12. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB). Durchschnittsalter der Bevölkerung. 2015. URL: http://www.bib-demografie.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/D/durchschnittsalter_bevoelkerung.html. Zugriff am: 29.06.2015.

13. DocCheck Flexikon. Serumkreatinin. 2015. URL: <http://flexikon.doccheck.com/de/Serumkreatinin>. Zugriff am: 29.06.2015.
14. GKV-Spitzenverband. Anlage 3 Preisbildung für parenterale Lösungen, Stand: 15.01.2015. URL: https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/arzneimittel/rahmenvertrage/hilfstaxe/Anlage_3_zur_Hilfstaxe_Stand_01012015.pdf. Zugriff am: 14.07.2015.
15. Ribas A, Puzanov I, Dummer R, et al. Pembrolizumab versus investigator-choice chemotherapy for ipilimumab-refractory melanoma (KEYNOTE-002): a randomised, controlled, phase 2 trial. The Lancet Oncology. Elektronische Veröffentlichung vor dem Druck 24.06.2015; DOI:10.1016/s1470-2045(15)00083-2. T. 2015.
16. LAUER-FISCHER. Lauertaxe für DETIMEDAC[®] (Dacarbazin), Stand: 01.07. 2015. URL: <http://taxe.lauer-fischer.de/Taxe/taxe.aspx>. Zugriff am: 01.07.2015.
17. LAUER-FISCHER. Lauertaxe für TEMOZOLOMIDE SUN[®] (Temozolomid), Stand: 01.07. 2015. URL: <http://taxe.lauer-fischer.de/Taxe/taxe.aspx>. Zugriff am: 01.07.2015.
18. LAUER-FISCHER. Lauertaxe für CARBOPLATIN ACCORD[®] (Carboplatin), Stand: 01.07. 2015. URL: <http://taxe.lauer-fischer.de/Taxe/taxe.aspx>. Zugriff am: 01.07.2015.
19. LAUER-FISCHER. Lauertaxe für PACLITAXEL ACCORD[®] (Paclitaxel), Stand: 01.07. 2015. URL: <http://taxe.lauer-fischer.de/Taxe/taxe.aspx>. Zugriff am: 01.07.2015.
20. ACCORD. Fachinformation PACLITAXEL ACCORD[®] (Paclitaxel). Stand: April 2015. URL: <http://accord-healthcare.de/produkte/fachinformationen/>. Zugriff am: 14.07.2015
21. Kassenärztliche Vereinigung Berlin. Einheitlicher Bewertungsmaßstab EBM. 2015. URL: https://www.kvberlin.de/20praxis/30abrechnung_honorar/10ebm/. Zugriff am: 14.07.2015.
22. Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO). Melanom Leitlinie, Stand: Oktober 2014. URL: <https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/melanom/@@view/html/index.html>. Zugriff am: 14.07.2015.
23. Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID). Der GEKID Atlas, Ergebnisse der Hochrechnungen für Deutschland (Datenlieferung Dezember 2013) 2014. URL: http://www.gekid.de/Atlas/CurrentVersion/Help/Ergebnisse%20GEKID%20Atlas%20Deutschland_2014.pdf. Zugriff am: 14.07.2015.
24. Hofmann MA, Hauschild A, Mohr P, et al. Prospective evaluation of supportive care with or without CVD chemotherapy as a second-line treatment in advanced melanoma by patient's choice: a multicentre Dermatologic Cooperative Oncology Group trial. Melanoma research. 2011;21(6):516-23.
25. European Commission: Community register of medicinal products for human use. Authorisation Opdivo (nivolumab). 2015. URL: <http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1014.htm>. Zugriff am: 14.07.2015.

3.4 Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung

3.4.1 Anforderungen aus der Fach- und Gebrauchsinformation

Benennen Sie Anforderungen, die sich aus der Fach- und Gebrauchsinformation des zu bewertenden Arzneimittels für eine qualitätsgesicherte Anwendung ergeben. Beschreiben Sie insbesondere Anforderungen an die Diagnostik, die Qualifikation der Ärzte und Ärztinnen und des weiteren medizinischen Personals, die Infrastruktur und die Behandlungsdauer. Geben Sie auch an, ob kurz- oder langfristige Überwachungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen, ob die behandelnden Personen oder Einrichtungen für die Durchführung spezieller Notfallmaßnahmen ausgerüstet sein müssen und ob Interaktionen mit anderen Arzneimitteln oder Lebensmitteln zu beachten sind. Benennen Sie die zugrunde gelegten Quellen.

Anforderungen an die Diagnostik

Diagnostik zur Selektion von Patienten für eine Anwendung von KEYTRUDA®

Nicht zutreffend.

Diagnostik bei atypischem Ansprechen

Atypisches Ansprechen (im Sinne eines anfänglichen vorübergehenden Tumorwachstums oder kleiner neuer Läsionen innerhalb der ersten wenigen Monate mit anschließender Tumorregression) wurde beobachtet. Es wird empfohlen, klinisch stabile Patienten mit initialem Befund eines Fortschreitens der Krebserkrankung bis zur Bestätigung des Fortschreitens der Krebserkrankung weiter zu behandeln (1).

Diagnostik zur Erkennung und Behandlung von Nebenwirkungen

Siehe Abschnitt 3.4.5 „Weitere Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung“, insbesondere Unterabschnitt „Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“.

Anforderungen an Qualifikation der Ärzte und Ärztinnen und des Weiteren medizinischen Personals

KEYTRUDA® ist als Monotherapie zur Behandlung des fortgeschrittenen (nicht resezierbaren oder metastasierenden) Melanoms bei Erwachsenen angezeigt.

Die Behandlung muss von einem in der Durchführung von onkologischen Therapien erfahrenen Arzt eingeleitet und überwacht werden (1).

Weitere Informationen bzgl. einer qualitätsgesicherten Anwendung siehe Abschnitt 3.4.5 „Weitere Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung“.

Anforderungen an die Behandlungsdauer

Die Patienten sollten mit KEYTRUDA® bis zum Fortschreiten der Krebserkrankung oder bis zum Auftreten unzumutbarer Toxizität behandelt werden. Atypisches Ansprechen (im Sinne

eines anfänglichen vorübergehenden Tumorwachstums oder kleiner neuer Läsionen innerhalb der ersten wenigen Monate mit anschließender Tumorregression) wurde beobachtet. Es wird empfohlen, klinisch stabile Patienten mit initialem Befund eines Fortschreitens der Krebserkrankung bis zur Bestätigung des Fortschreitens der Krebserkrankung weiter zu behandeln (1).

Weitere Informationen bzgl. der Behandlungsdauer bzw. einer Unterbrechung oder dauerhaftem Absetzen der Behandlung mit KEYTRUDA[®] insbesondere bei Auftreten von Nebenwirkungen siehe Abschnitt 3.4.5 „Weitere Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung“.

Anforderungen an kurz- oder langfristige Überwachungsmaßnahmen

Überwachungsmaßnahmen zur Erkennung und Behandlung von Nebenwirkungen

Siehe Abschnitt 3.4.5 „Weitere Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung“, insbesondere die Unterabschnitte „Dosierung“ und „Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“.

Überwachungsmaßnahmen bei besonderen Patientengruppen

Die Anwendung von KEYTRUDA[®] wurde bei einigen besonderen Patientengruppen nicht untersucht bzw. es liegen nur begrenzte Daten zu Wirksamkeit und Sicherheit vor, so dass es für diese Patientengruppen einer besonderen klinischen Überwachung bedarf.

Ältere Patienten

Insgesamt wurden keine Unterschiede hinsichtlich Sicherheit oder Wirksamkeit zwischen älteren (≥ 65 Jahre) und jüngeren (< 65 Jahren) Patienten berichtet. Eine Dosisanpassung ist für diese Patienten nicht erforderlich.

Eingeschränkte Nierenfunktion

Eine Dosisanpassung ist bei Patienten mit leichter oder moderater Einschränkung der Nierenfunktion nicht erforderlich. KEYTRUDA[®] wurde bei Patienten mit schwerer Einschränkung der Nierenfunktion nicht untersucht.

Eingeschränkte Leberfunktion

Eine Dosisanpassung ist bei Patienten mit leichter Einschränkung der Leberfunktion nicht erforderlich. KEYTRUDA[®] wurde bei Patienten mit moderater oder schwerer Einschränkung der Leberfunktion nicht untersucht.

Melanom des Auges

Bei Patienten mit Melanom des Auges stehen limitierte Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit von KEYTRUDA[®] zur Verfügung.

Kinder und Jugendliche

Die Sicherheit und Wirksamkeit von KEYTRUDA[®] ist bei Kindern im Alter von unter 18 Jahren bisher noch nicht erwiesen. Es liegen keine Daten vor.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung über das nationale Meldesystem anzuzeigen (1).

Anforderungen an die Durchführung spezieller Notfallmaßnahmen

Informationen zu einer Überdosierung mit Pembrolizumab (dem Wirkstoff von KEYTRUDA®) liegen nicht vor.

Im Falle einer Überdosierung müssen die Patienten engmaschig auf Anzeichen oder Symptome von Nebenwirkungen überwacht und angemessen symptomatisch behandelt werden (1).

Anforderungen an die Beachtung von Interaktionen mit anderen Arzneimitteln oder Lebensmitteln

Es wurden keine formalen pharmakokinetischen Wechselwirkungsstudien mit Pembrolizumab durchgeführt. Da Pembrolizumab durch katabolischen Abbau aus dem Blutkreislauf eliminiert wird, sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln zu erwarten.

Eine systemische Anwendung von Kortikosteroiden oder Immunsuppressiva vor Therapiebeginn mit Pembrolizumab sollte aufgrund möglicher Beeinträchtigungen der pharmakodynamischen Aktivität und der Wirksamkeit von Pembrolizumab vermieden werden. Systemische Kortikosteroide oder andere Immunsuppressiva können jedoch nach Beginn der Therapie mit Pembrolizumab zur Behandlung von immunvermittelten Nebenwirkungen angewendet werden (1).

Beschreiben Sie, ob für Patientengruppen mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen abweichende Anforderungen als die zuvor genannten bestehen und, wenn ja, welche dies sind.

Nicht zutreffend.

3.4.2 Bedingungen für das Inverkehrbringen

Benennen Sie Anforderungen, die sich aus Annex IIb (Bedingungen der Genehmigung für das Inverkehrbringen) des European Assessment Reports (EPAR) des zu bewertenden Arzneimittels für eine qualitätsgesicherte Anwendung ergeben. Benennen Sie die zugrunde gelegten Quellen.

Die Anforderungen an diesen Abschnitt werden insofern interpretiert, als dass Angaben zu den Informationen gemäß Anhang IIB – Bedingungen oder Einschränkungen für die Abgabe

und den Gebrauch, als auch gemäß Anhang IIC – Sonstige Bedingungen und Auflagen der Genehmigung für das Inverkehrbringen sowie Anhang IID – Bedingungen oder Einschränkungen für die sichere und wirksame Anwendung des Arzneimittels zu machen sind.

Anhang IIB – Bedingungen oder Einschränkungen für die Abgabe und den Gebrauch

Arzneimittel auf eingeschränkte ärztliche Verschreibung (siehe Anhang I: Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels, Abschnitt 4.2).

Siehe hierzu auch Abschnitt 3.4.5 „Weitere Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung“.

Anhang IIC – Sonstige Bedingungen und Auflagen der Genehmigung für das Inverkehrbringen

Regelmäßig aktualisierte Unbedenklichkeitsberichte

Der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen legt regelmäßig aktualisierte Unbedenklichkeitsberichte für dieses Arzneimittel gemäß den Anforderungen der – nach Artikel 107 c Absatz 7 der Richtlinie 2001/83/EG vorgesehenen und im europäischen Internetportal für Arzneimittel veröffentlichten – Liste der in der Union festgelegten Stichtage (EURD-Liste) vor.

Anhang IID – Bedingungen oder Einschränkungen für die sichere und wirksame Anwendung des Arzneimittels

Risikomanagement-Plan (RMP)

Der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen führt die notwendigen, im vereinbarten RMP beschriebenen und in Modul 1.8.2 der Zulassung dargelegten Pharmakovigilanzaktivitäten und Maßnahmen sowie alle künftigen vereinbarten Aktualisierungen des RMP durch.

Ein aktualisierter RMP ist einzureichen:

- Nach Aufforderung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur;
- Jedes Mal wenn das Risikomanagement-System geändert wird, insbesondere infolge neuer eingegangener Informationen, die zu einer wesentlichen Änderung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses führen können oder infolge des Erreichens eines wichtigen Meilensteins (in Bezug auf Pharmakovigilanz oder Risikominimierung).

Fallen die Vorlage eines PSUR („Periodic Safety Update Report“) und die Aktualisierung eines RMP zeitlich zusammen, können beide gleichzeitig vorgelegt werden.

Zusätzliche Maßnahmen zur Risikominimierung

Vor der Produkteinführung von KEYTRUDA[®] in jedem Mitgliedstaat muss der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen den Inhalt und das Format des Schulungs- und

Informationsprogramms einschließlich der Kommunikationsmedien und der Verbreitungsmodalitäten, sowie alle weiteren Aspekte bzgl. des Programms mit der jeweiligen zuständigen nationalen Behörde abstimmen.

Das Schulungs- und Informationsprogramm dient zur Erhöhung der Aufmerksamkeit im Hinblick auf mögliche

- Immunvermittelte Nebenwirkungen
- Infusionsbedingte Reaktionen

die mit der Anwendung von KEYTRUDA[®] zusammenhängen, wie diese behandelt werden können und um die Aufmerksamkeit der Patienten oder deren Betreuungspersonen im Hinblick auf Anzeichen und Symptome zu erhöhen, um ein frühes Erkennen/Feststellen dieser Nebenwirkungen zu ermöglichen.

Der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen stellt sicher, dass in jedem Mitgliedstaat, in dem KEYTRUDA[®] vermarktet wird, sowohl alle Ärzte/medizinisches Fachpersonal, die KEYTRUDA[®] voraussichtlich verordnen/anwenden werden, als auch alle Patienten und deren Betreuungspersonen, die mit KEYTRUDA[®] behandelt werden, Zugang zu folgendem Schulungs- und Informationsmaterial erhalten, bzw. ihnen dieses zur Verfügung gestellt wird:

- Schulungs- und Informationsmaterial für den Arzt/medizinisches Fachpersonal
- Schulungs- und Informationsmaterial für den Patienten

Das Schulungs- und Informationsmaterial für den Arzt/medizinisches Fachpersonal sollte folgendes beinhalten:

- Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (SmPC)
- Informationsbroschüre für den Arzt/medizinisches Fachpersonal mit häufig gestellten Fragen (Fragen- und Antwort-Format)

Schwerpunkthinhalte der Informationsbroschüre für den Arzt/medizinisches Fachpersonal mit häufig gestellten Fragen (Fragen- und Antwort-Format):

- Auflistung der wichtigen immunvermittelten Nebenwirkungen und ihrer Symptome, einschließlich der Vorsichtsmaßnahmen und Behandlungsoptionen wie in Abschnitt 4.4 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (SmPC) beschrieben:
 - Immunvermittelte Hypophysitis (einschließlich Hypophysenunterfunktion und sekundärer Nebenniereninsuffizienz)
 - Immunvermittelte Pneumonitis
 - Immunvermittelte Schilddrüsenerkrankung (einschließlich Hypothyreose und Hyperthyreose)
 - Immunvermittelte Uveitis

- Immunvermittelte Kolitis
- Immunvermittelte Pankreatitis
- Immunvermittelte Hepatitis
- Immunvermittelter Typ-I-Diabetes
- Immunvermittelte Myositis
- Immunvermittelte Nephritis
- Immunvermittelte schwere Hautreaktionen
- Infusionsbedingte Nebenwirkungen
- Angaben, wie arzneimittelsicherheitsrelevante Bedenken durch angemessene Überwachung und Behandlung zu minimieren sind.
- Erinnerung, die Informationsbroschüre für den Patienten sowie die Patientenkarte abzugeben.

Das Schulungs- und Informationsmaterial für den Patienten sollte folgendes beinhalten:

- Informationsbroschüre für den Patienten
- Patientenkarte

Schwerpunkthinhalte der Informationsbroschüre für den Patienten und der Patientenkarte:

- Eine Beschreibung der wesentlichen Anzeichen oder Symptome von immunvermittelten Nebenwirkungen, und die Wichtigkeit, den behandelnden Arzt sofort zu informieren, falls Symptome von immunvermittelten Nebenwirkungen auftreten.
- Hinweise darauf, dass es wichtig ist, jegliche Symptome nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem behandelnden Arzt selbst zu behandeln.
- Hinweise darauf, dass es wichtig ist, dass der Patient die Patientenkarte immer bei sich trägt und sie bei allen anderen Arztbesuchen dem medizinischen Fachpersonal vorlegt, z. B. bei medizinischem Notfallpersonal. Die Karte erinnert den Patienten an wichtige Symptome, die sofort dem Arzt oder medizinischem Fachpersonal mitgeteilt werden müssen. Weiterhin besteht auf der Karte die Möglichkeit, die Kontaktdaten des behandelnden Arztes einzutragen. Außerdem enthält die Karte einen Hinweis für andere Ärzte, dass der Patient mit KEYTRUDA[®] behandelt wird.

Verpflichtung zur Durchführung von Maßnahmen nach der Zulassung

Der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen schließt innerhalb des festgelegten Zeitrahmens folgende Maßnahmen ab:

Tabelle 3-25: Vereinbarte Maßnahmen nach der Zulassung

Beschreibung	Fällig am
1. Wirksamkeits-Studie nach Zulassung (Post-authorisation efficacy study (PAES)): Der Zulassungsinhaber muss den abschließenden Studienbericht für Studie-P002 einreichen: Randomisierte, Phase-II-Studie über MK-3475 versus Chemotherapie bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom – Abschließender Studienbericht	1Q 2017
2. Wirksamkeits-Studie nach Zulassung (Post-authorisation efficacy study (PAES)): Der Zulassungsinhaber muss den abschließenden Studienbericht für Studie-P006 einreichen: Multizentrische, randomisierte, kontrollierte, dreiarmlige, Phase-III-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit zweier Dosierungsschemata von MK-3475 im Vergleich zu Ipilimumab bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom – Abschließender Studienbericht	1Q 2017
3. Wirksamkeits-Studie nach Zulassung (Post-authorisation efficacy study (PAES)): Um den Nutzen bei den Patientensubgruppen mit BRAF-V600-Mutation und mit PD-L1-negativem Status in der empfohlenen Dosierung zu bestätigen, muss der Zulassungsinhaber aktualisierte Analysen der Studien P001 und P002 liefern: <ul style="list-style-type: none"> • Aktualisierte Wirksamkeitsdaten aus der P002-Abschlussanalyse bezüglich der Subgruppen, in denen die 2 mg/kg versus der 10 mg/kg Q3W Dosierung verglichen wird. • Wirksamkeitsdaten der Subgruppen, in denen die 2 mg/kg versus der 10 mg/kg Q3W Dosierung aus P001 verglichen wird, unter Einbeziehung des Daten-„Cut-off-Date“ vom 18-Okt-2014 (Teil B2 und Teil D der P001 nach Dosierungshöhe). 	1Q 2017 3Q 2015
4. Der Nutzen von Biomarkern hinsichtlich der Vorhersage der Wirksamkeit von Pembrolizumab sollte weiter untersucht werden, insbesondere: Obwohl der PD-L1-Status bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom prädiktiv für die Immunantwort ist, wurde nachhaltiges Ansprechen bei PD-L1 negativen Patienten beobachtet. Weitere Biomarker neben einem immunhistochemisch nachgewiesenen PD-L1-Expressionsstatus (z. B. PD-L2, RNA-Signatur, etc.) zur Vorhersage der Wirksamkeit von Pembrolizumab sollten untersucht werden, zusammen mit weiteren Informationen bezüglich des PD-L1-Expressionsmusters, die in den laufenden Studien zu Melanom (P001, P002 und P006) gewonnen wurden: <ul style="list-style-type: none"> • Vergleich der immunhistochemischen Färbung des PD-L1 zwischen historischen und frischen Gewebeproben • Vergleich der immunhistochemischen Färbung des PD-L1 zwischen Tumorgewebe vor und nach Behandlung • Daten zur Nanostring-RNA-Gen-Signatur • Immunhistochemischer Nachweis von PD-L2 • Daten zu RNA und zum proteomischen Serum-Profil • Daten zum Immunzell-Profil (aus peripherem Blut) 	1Q 2017
Quelle: (2)	

Beschreiben Sie, ob für Patientengruppen mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen abweichende Anforderungen als die zuvor genannten bestehen und, wenn ja, welche dies sind.

Nicht zutreffend.

3.4.3 Bedingungen oder Einschränkungen für den sicheren und wirksamen Einsatz des Arzneimittels

Sofern im zentralen Zulassungsverfahren für das zu bewertende Arzneimittel ein Annex IV (Bedingungen oder Einschränkungen für den sicheren und wirksamen Einsatz des Arzneimittels, die von den Mitgliedsstaaten umzusetzen sind) des EPAR erstellt wurde, benennen Sie die dort genannten Anforderungen. Benennen Sie die zugrunde gelegten Quellen.

Nicht zutreffend.

Beschreiben Sie, ob für Patientengruppen mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen abweichende Anforderungen als die zuvor genannten bestehen und, wenn ja, welche dies sind.

Nicht zutreffend.

3.4.4 Informationen zum Risk-Management-Plan

Benennen Sie die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Risikominimierung („proposed risk minimization activities“), die in der Zusammenfassung des EU-Risk-Management-Plans beschrieben und im European Public Assessment Report (EPAR) veröffentlicht sind. Machen Sie auch Angaben zur Umsetzung dieser Maßnahmen. Benennen Sie die zugrunde gelegten Quellen.

Nachfolgend in Tabelle 3-26 sind die Sicherheitsbedenken und die zugehörigen Maßnahmen zur Risikominimierung tabellarisch aufgeführt. Die Informationen entstammen dem zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments aktuell genehmigten Zulassungsdossier, Modul 1.8.2 Risk Management System (3).

In Übereinstimmung mit den aktuellen Bestimmungen der EU Gesetzgebung zur Pharmakovigilanz in Bezug auf die verstärkte Überwachung neu zugelassener Arzneimittel, wurden folgende Informationen am Anfang von sowohl in Fach- als auch Gebrauchsinformation entsprechend aufgenommen, welche alle Risikoelemente, d. h. die wichtigen identifizierten als auch die potentiellen Risiken als auch die Risiken durch fehlende Informationen gleichermaßen betreffen.

Informationen am Anfang der Fachinformation

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8 (1).

Informationen am Anfang der Gebrauchsinformation

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Ende Abschnitt 4 (4).

Tabelle 3-26: Tabellarische Übersicht der Sicherheitsbedenken und Maßnahmen zur Risikominimierung (3)

Sicherheitsbedenken	Routinemaßnahmen zur Risikominimierung	Weitere Maßnahmen zur Risikominimierung
Wichtige identifizierte Risiken: Immunvermittelte Nebenwirkungen		
Hypophysitis (einschließlich Hypophysenunterfunktion und sekundärer Nebenniereninsuffizienz)	Das Risiko einer immunvermittelten Hypophysitis (einschließlich Hypophysenunterfunktion und sekundärer Nebenniereninsuffizienz) als Nebenwirkung, die mit der Anwendung von Pembrolizumab zusammenhängt, ist in den Abschnitten 4.2, 4.4 und 4.8 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben, einschließlich geeigneter Empfehlungen zur Risikominimierung für den verschreibenden Arzt.	Schulungs- und Informationsmaterial
Schilddrüsenerkrankung (einschließlich Hypothyreose, Hyperthyreose und Thyreoiditis)	Das Risiko einer immunvermittelten Schilddrüsenerkrankung (einschließlich Hypothyreose, Hyperthyreose und Thyreoiditis) als Nebenwirkung, die mit der Anwendung von Pembrolizumab zusammenhängt, ist in den Abschnitten 4.2, 4.4 und 4.8 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben, einschließlich geeigneter Empfehlungen zur Risikominimierung für den verschreibenden Arzt.	Schulungs- und Informationsmaterial
Uveitis	Das Risiko einer immunvermittelten Uveitis als Nebenwirkung, die mit der Anwendung von Pembrolizumab zusammenhängt, ist in den Abschnitten 4.4 und 4.8 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben, einschließlich geeigneter Empfehlungen zur Risikominimierung für den verschreibenden Arzt.	Schulungs- und Informationsmaterial
Pankreatitis	Das Risiko einer immunvermittelten Pankreatitis als Nebenwirkung, die mit der Anwendung von Pembrolizumab zusammenhängt, ist in den Abschnitten 4.4 und 4.8 der Zusammenfassung der Merkmale des	Schulungs- und Informationsmaterial

Sicherheitsbedenken	Routinemaßnahmen zur Risikominimierung	Weitere Maßnahmen zur Risikominimierung
	Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben, einschließlich geeigneter Empfehlungen zur Risikominimierung für den verschreibenden Arzt.	
Hepatitis	Das Risiko einer immunvermittelten Hepatitis als Nebenwirkung, die mit der Anwendung von Pembrolizumab zusammenhängt, ist in den Abschnitten 4.2, 4.4 und 4.8 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben, einschließlich geeigneter Empfehlungen zur Risikominimierung für den verschreibenden Arzt.	Schulungs- und Informationsmaterial
Typ-I-Diabetes mellitus	Das Risiko eines immunvermittelten Typ-1-Diabetes mellitus als Nebenwirkung, die mit der Anwendung von Pembrolizumab zusammenhängt, ist in den Abschnitten 4.2, 4.4 und 4.8 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben, einschließlich geeigneter Empfehlungen zur Risikominimierung für den verschreibenden Arzt.	Schulungs- und Informationsmaterial
Myositis	Das Risiko einer immunvermittelten Myositis als Nebenwirkung, die mit der Anwendung von Pembrolizumab zusammenhängt, ist in den Abschnitten 4.4 und 4.8 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben, einschließlich geeigneter Empfehlungen zur Risikominimierung für den verschreibenden Arzt.	Schulungs- und Informationsmaterial
Nephritis	Das Risiko einer immunvermittelten Nephritis als Nebenwirkung, die mit der Anwendung von Pembrolizumab zusammenhängt, ist in den Abschnitten 4.2, 4.4 und 4.8 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben, einschließlich geeigneter Empfehlungen zur Risikominimierung für den verschreibenden Arzt.	Schulungs- und Informationsmaterial
Pneumonitis	Das Risiko einer immunvermittelten Pneumonitis als Nebenwirkung, die mit der Anwendung von Pembrolizumab zusammenhängt, ist in den Abschnitten 4.2, 4.4 und 4.8 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben, einschließlich geeigneter	Schulungs- und Informationsmaterial

Sicherheitsbedenken	Routinemaßnahmen zur Risikominimierung	Weitere Maßnahmen zur Risikominimierung
	Empfehlungen zur Risikominimierung für den verschreibenden Arzt.	
Schwere Hautreaktionen	Das Risiko von immunvermittelten schweren Hautreaktionen als Nebenwirkung, die mit der Anwendung von Pembrolizumab zusammenhängt, ist in den Abschnitten 4.4 und 4.8 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben, einschließlich geeigneter Empfehlungen zur Risikominimierung für den verschreibenden Arzt.	Schulungs- und Informationsmaterial
Wichtige identifizierte Risiken: Infusionsbedingte Nebenwirkungen		
Infusionsbedingte Nebenwirkungen	Das Risiko von infusionsbedingten Nebenwirkungen, die mit der Anwendung von Pembrolizumab zusammenhängen, ist in den Abschnitten 4.2, 4.4 und 4.8 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben, einschließlich geeigneter Empfehlungen zur Risikominimierung für den verschreibenden Arzt.	Schulungs- und Informationsmaterial
Wichtige potentielle Risiken: Immunvermittelte unerwünschte Ereignisse		
Gastrointestinale Perforation in Folge einer Kolitis	Das Risiko einer gastrointestinalen Perforation in Folge einer immunvermittelten Kolitis als Nebenwirkung, die mit der Anwendung von Pembrolizumab zusammenhängt, ist in den Abschnitten 4.4 und 4.8 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben, einschließlich geeigneter Empfehlungen zur Risikominimierung für den verschreibenden Arzt.	Keine
Wichtige potentielle Risiken: Immunogenität		
Immunogenität	Das Risiko einer Immunogenität, die mit der Anwendung von Pembrolizumab zusammenhängt, ist in Abschnitt 4.8 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben.	Keine
Fehlende Informationen		
Sicherheit bei Patienten mit moderater oder schwerer Einschränkung der Leberfunktion	Das Fehlen von Daten zur Sicherheit bei Patienten mit moderater oder schwerer Einschränkung der Leberfunktion ist in den Abschnitten 4.2 und 4.4 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation)	Keine

Sicherheitsbedenken	Routinemaßnahmen zur Risikominimierung	Weitere Maßnahmen zur Risikominimierung
	beschrieben.	
Sicherheit bei Patienten mit schwerer Einschränkung der Nierenfunktion	Das Fehlen von Daten zur Sicherheit bei Patienten mit schwerer Einschränkung der Nierenfunktion ist in den Abschnitten 4.2 und 4.4 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben.	Keine
Sicherheit bei Patienten mit aktiver, systemischer Autoimmunerkrankung	Das Fehlen von Daten zur Sicherheit bei Patienten mit aktiver, systemischer Autoimmunerkrankung ist in den Abschnitten 4.4 und 5.1 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben.	Keine
Sicherheit bei Patienten mit HIV oder Hepatitis B oder Hepatitis C Infektion	Das Fehlen von Daten zur Sicherheit bei Patienten mit HIV oder Hepatitis B oder Hepatitis C Infektion ist in den Abschnitten 4.4 und 5.1 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben.	Keine
Sicherheit bei Kindern und Jugendlichen	Das Fehlen von Daten zur Sicherheit bei Kindern und Jugendlichen ist in Abschnitt 4.2 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben.	Keine
Schwangerschaft, Stillzeit und Fertilität	Die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit ist in den Abschnitten 4.6 und 5.3 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben.	Keine
Langzeitsicherheit	Keine	Keine
Sicherheit bei Patienten-populationen verschiedener ethnischer Herkunft	Keine	Keine
Mögliche pharmakodynamische Wechselwirkungen mit systemischen Immunsuppressiva	Das Fehlen von Daten zu möglichen pharmakodynamischen Wechselwirkungen mit systemischen Immunsuppressiva ist in den Abschnitten 4.4 und 4.5 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben.	Keine
Sicherheit bei Patienten mit vormaliger Überempfindlichkeit gegenüber anderen monoklonalen Antikörpern	Das Fehlen von Daten zur Sicherheit bei Patienten mit vormaliger Überempfindlichkeit gegenüber anderen monoklonalen Antikörpern ist in den Abschnitten 4.4 und 5.1 der Zusammenfassung der Merkmale des	Keine

Sicherheitsbedenken	Routinemaßnahmen zur Risikominimierung	Weitere Maßnahmen zur Risikominimierung
	Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben.	
Sicherheit bei Patienten mit schweren (Grad 3) oder lebensbedrohlichen immun-vermittelten Nebenwirkungen unter Ipilimumab in der Anamnese, die eine Kortikosteroid-Behandlung über mehr als 12 Wochen erforderten, oder mit anhaltenden Nebenwirkungen einer Vortherapie mit Ipilimumab	Das Fehlen von Daten zur Sicherheit bei Patienten mit schweren (Grad 3) oder lebensbedrohlichen immunvermittelten Nebenwirkungen unter Ipilimumab in der Anamnese, die eine Kortikosteroid-Behandlung über mehr als 12 Wochen erforderten, oder mit anhaltenden Nebenwirkungen einer Vortherapie mit Ipilimumab, ist in Abschnitt 4.4 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) beschrieben.	Keine

Beschreiben Sie, ob für Patientengruppen mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen abweichende Anforderungen als die zuvor genannten bestehen und, wenn ja, welche dies sind.

Nicht zutreffend.

3.4.5 Weitere Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung

Benennen Sie weitere Anforderungen, die sich aus Ihrer Sicht hinsichtlich einer qualitätsgesicherten Anwendung des zu bewertenden Arzneimittels ergeben, insbesondere bezüglich der Dauer eines Therapieversuchs, des Absetzens der Therapie und ggf. notwendiger Verlaufskontrollen. Benennen Sie die zugrunde gelegten Quellen.

KEYTRUDA[®] ist als Monotherapie zur Behandlung des fortgeschrittenen (nicht resezierbaren oder metastasierenden) Melanoms bei Erwachsenen angezeigt.

Die Behandlung muss von einem in der Durchführung von onkologischen Therapien erfahrenen Arzt eingeleitet und überwacht werden.

Dosierung

Die empfohlene Dosis von KEYTRUDA[®] beträgt 2 mg/kg Körpergewicht alle drei Wochen und wird als intravenöse Infusion über 30 Minuten gegeben. Die Patienten sollten mit KEYTRUDA[®] bis zum Fortschreiten der Krebserkrankung oder bis zum Auftreten unzumutbarer Toxizität behandelt werden. Atypisches Ansprechen (im Sinne eines anfänglichen vorübergehenden Tumorwachstums oder kleiner neuer Läsionen innerhalb der ersten wenigen Monate mit anschließender Tumorregression) wurde beobachtet. Es wird empfohlen, klinisch stabile Patienten mit initialem Befund eines Fortschreitens der Krebserkrankung bis zur Bestätigung des Fortschreitens der Krebserkrankung weiter zu behandeln (1).

Aufschub der Dosierung oder Absetzen der Therapie

Tabelle 3-27: Vorgaben für eine Unterbrechung oder Absetzen der Behandlung mit KEYTRUDA®

Immunvermittelte Nebenwirkungen	Schweregrad	Modifikation der Behandlung
Pneumonitis	Grad 2 Pneumonitis	Unterbrechung ^a
	Grad 3 oder 4 oder wiederholt Grad 2 Pneumonitis	dauerhaftes Absetzen
Kolitis	Grad 2 oder 3 Kolitis	Unterbrechung ^a
	Grad 4 Kolitis	dauerhaftes Absetzen
Nephritis	Grad 2 Nephritis mit einer > 1,5 bis 3-fachen Erhöhung von Serumkreatinin über dem oberen Normwert (ULN)	Unterbrechung ^a
	Grad ≥ 3 Nephritis mit ≥ 3-facher Erhöhung von Serumkreatinin über dem oberen Normwert (ULN)	dauerhaftes Absetzen
Endokrinopathien	Symptomatische Hypophysitis Typ-1-Diabetes assoziiert mit einer Grad > 3 Hyperglykämie (Glucose > 250 mg/dl oder > 13,9 mmol/l) oder assoziiert mit einer Ketoazidose Hyperthyreose Grad ≥ 3	Unterbrechung ^a Bei Patienten mit Grad 3 oder Grad 4 Endokrinopathien, die sich auf Grad 2 oder weniger bessern und – falls angezeigt – mit Hormonsubstitution kontrolliert sind, kann eine Wiederaufnahme von Pembrolizumab nach Ausschleichen der Kortikosteroidbehandlung (falls benötigt) erwogen werden. Andernfalls sollte die Behandlung abgebrochen werden. Hypothyreose kann mit Substitutionstherapie ohne Unterbrechung der Behandlung kontrolliert werden.
Hepatitis	Hepatitis mit > 3 bis 5-facher Erhöhung von Aspartataminotransferase (AST) oder Alaninaminotransferase (ALT) über dem oberen Normwert (ULN) oder > 1,5 bis 3-fache Erhöhung von Gesamtbilirubin über dem oberen Normwert (ULN) (Grad 2)	Unterbrechung ^a
	Hepatitis mit > 5-facher Erhöhung von AST oder ALT über dem oberen Normwert (ULN) oder > 3-facher Erhöhung von Gesamtbilirubin über	dauerhaftes Absetzen

Immunvermittelte Nebenwirkungen	Schweregrad	Modifikation der Behandlung
	dem oberen Normwert (ULN) (Grad ≥ 3)	
	Bei Patienten mit Lebermetastasen mit einer Grad 2 Erhöhung von AST oder ALT zu Behandlungsbeginn: Hepatitis mit einem relativ zu den Ausgangswerten ≥ 50 %igen und ≥ 1 Woche anhaltendem Anstieg von AST oder ALT	dauerhaftes Absetzen
Infusionsbezogene Reaktionen	Grad 3 oder 4 infusionsbezogene Reaktionen	dauerhaftes Absetzen
Zur Beachtung: Die Toxizität/Schweregrade stimmen mit den „Allgemeinen Terminologie-Kriterien für Nebenwirkungen des US National Cancer Institute“ Version 4.0 [NCI-CTCAE v.4] überein.		
a: Bis sich die Nebenwirkungen auf Grad 0-1 gebessert haben.		

Die Behandlung mit KEYTRUDA[®] ist dauerhaft abzusetzen:

- Bei Grad 4 Toxizität, außer bei Endokrinopathien, die mit Hormonsubstitution kontrolliert sind
- Wenn die Kortikosteroid-Dosierung innerhalb von zwölf Wochen nicht auf ≤ 10 mg Prednison oder eines entsprechenden Äquivalents pro Tag reduziert werden kann
- Wenn eine behandlungsbedingte Toxizität nicht auf Grad 0-1 innerhalb von zwölf Wochen nach Gabe der letzten Dosis von KEYTRUDA[®] abklingt
- Wenn ein Ereignis erneut mit Grad ≥ 3 Schweregrad auftritt.

Patienten, die mit KEYTRUDA[®] behandelt werden, müssen die Patientenkarte erhalten und müssen über die Risiken von KEYTRUDA[®] informiert werden (siehe auch Packungsbeilage).

Art der Anwendung

KEYTRUDA[®] sollte als intravenöse Infusion über 30 Minuten gegeben werden.

Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile.

Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Immunvermittelte Nebenwirkungen

Die meisten immunvermittelten Nebenwirkungen, die während der Behandlung mit Pembrolizumab auftraten, waren reversibel und waren durch Unterbrechung der Therapie mit Pembrolizumab, Gabe von Kortikosteroiden und/oder unterstützende Maßnahmen beherrschbar. Immunvermittelte Nebenwirkungen traten auch nach Gabe der letzten Dosis Pembrolizumab auf.

Bei Verdacht auf immunvermittelte Nebenwirkungen sollte eine angemessene Abklärung zur Bestätigung der Ätiologie oder zum Ausschluss anderer Ursachen sichergestellt werden. Entsprechend des Schweregrades der Nebenwirkung sollte die Gabe von Pembrolizumab unterbrochen werden und Kortikosteroide gegeben werden. Bei Besserung auf Grad 1 oder weniger sollte mit der Reduktion der Kortikosteroid-Dosis begonnen und über mindestens einen Monat ausgeschlichen werden. Basierend auf limitierten Daten aus klinischen Studien mit Patienten, bei denen die immunvermittelten Nebenwirkungen nicht mit Kortikosteroiden kontrolliert werden konnten, kann die Gabe von anderen systemischen Immunsuppressiva erwogen werden.

Die Therapie mit Pembrolizumab kann innerhalb von zwölf Wochen nach der letzten Dosis KEYTRUDA[®] wieder aufgenommen werden, wenn die Nebenwirkungen auf Grad 1 oder weniger verbleiben und die Kortikosteroid-Dosis auf ≤ 10 mg Prednison oder eines entsprechenden Äquivalents pro Tag reduziert wurde.

Pembrolizumab ist dauerhaft abzusetzen, falls eine weitere Episode jeglicher Grad 3 immunvermittelter Nebenwirkung erneut auftritt oder bei Auftreten jeglicher Grad 4 immunvermittelter Toxizität, außer es handelt sich um Endokrinopathien, die mit Hormonsubstitutionstherapie kontrolliert werden können.

Immunvermittelte Pneumonitis

Pneumonitis wurde bei Patienten unter Pembrolizumab berichtet. Patienten sollten auf Anzeichen und Symptome einer Pneumonitis überwacht werden. Ein bestehender Verdacht auf Pneumonitis sollte durch eine radiologische Untersuchung bestätigt und andere Ursachen sollten ausgeschlossen werden. Kortikosteroide sollten ab Grad ≥ 2 Ereignissen gegeben werden (Anfangsdosierung 1–2 mg/kg/Tag Prednison oder eines Äquivalents mit anschließendem Ausschleichen). Die Therapie mit Pembrolizumab sollte bei Grad 2 Pneumonitis unterbrochen und bei Grad 3, Grad 4 oder wiederholter Grad 2 Pneumonitis dauerhaft abgesetzt werden. In einer Studie mit 550 Patienten mit nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom (NSCLC) wurde ein Fall von Pneumonitis mit tödlichem Ausgang berichtet.

Immunvermittelte Kolitis

Kolitis wurde bei Patienten unter Pembrolizumab berichtet. Patienten sollten auf Anzeichen und Symptome einer Kolitis überwacht und andere Ursachen ausgeschlossen werden. Kortikosteroide sollten ab Grad ≥ 2 Ereignissen gegeben werden (Anfangsdosierung 1–2 mg/kg/Tag Prednison oder eines Äquivalents mit anschließendem Ausschleichen). Die Therapie mit Pembrolizumab sollte bei Grad 2 oder Grad 3 Kolitis unterbrochen und bei Grad 4 Kolitis dauerhaft abgesetzt werden. Das potenzielle Risiko einer gastrointestinalen Perforation sollte in Betracht gezogen werden.

Immunvermittelte Hepatitis

Hepatitis wurde bei Patienten unter Pembrolizumab berichtet. Patienten sollten auf Abweichungen der Leberfunktion (zu Behandlungsbeginn, in regelmäßigen Abständen

während der Behandlung und wenn bei entsprechender klinischer Bewertung angezeigt) und auf Anzeichen einer Hepatitis überwacht werden und andere Ursachen einer Hepatitis sollten ausgeschlossen werden. Kortikosteroide sollten mit einer Anfangsdosierung von 0,5–1 mg/kg/Tag Prednison oder eines Äquivalents bei Grad 2 Ereignissen und 1–2 mg/kg/Tag Prednison oder eines Äquivalents ab Grad ≥ 3 Ereignissen mit anschließendem Ausschleichen gegeben werden. Entsprechend des Schweregrads der Leberenzymerrhöhung sollte die Therapie mit Pembrolizumab unterbrochen oder dauerhaft abgesetzt werden.

Immunvermittelte Nephritis

Nephritis wurde bei Patienten unter Pembrolizumab berichtet. Patienten sollten auf Abweichungen der Nierenfunktion überwacht werden und andere Ursachen einer Nierenfunktionsstörung sollten ausgeschlossen werden. Kortikosteroide sollten ab Grad ≥ 2 Ereignissen gegeben werden (Anfangsdosierung 1–2 mg/kg/Tag Prednison oder eines Äquivalents mit anschließendem Ausschleichen). Entsprechend des Schweregrads der Serumkreatininerhöhung sollte die Therapie mit Pembrolizumab bei Grad 2 Nephritis unterbrochen und bei Grad 3 oder Grad 4 Nephritis dauerhaft abgesetzt werden.

Immunvermittelte Endokrinopathien

Schwere Endokrinopathien, einschließlich Hypophysitis, Typ-I-Diabetes mellitus, diabetischer Ketoazidose, Hypothyreose und Hyperthyreose wurden unter Behandlung mit Pembrolizumab beobachtet.

Bei Fällen von immunvermittelten Endokrinopathien kann eine dauerhafte Hormonsubstitutionstherapie notwendig sein.

Hypophysitis wurde bei Patienten unter Pembrolizumab berichtet. Patienten sollten auf Anzeichen und Symptome einer Hypophysitis (einschließlich einer Unterfunktion der Hypophyse und sekundärer Nebenniereninsuffizienz) überwacht und andere Ursachen einer Hypophysitis sollten ausgeschlossen werden. Sofern klinisch indiziert, sollten Kortikosteroide zur Behandlung der sekundären Nebenniereninsuffizienz und andere Hormone zur Substitution gegeben werden. Die Therapie mit Pembrolizumab sollte bei symptomatischer Hypophysitis unterbrochen werden, bis diese mit Hormonsubstitutionstherapie unter Kontrolle ist. Eine Wiederaufnahme der Therapie mit Pembrolizumab kann nach Ausschleichen der Kortikosteroidtherapie, falls notwendig, erwogen werden. Die Hypophysenfunktion sowie die Hormonspiegel sollten überwacht werden, um eine angemessene Hormonsubstitution sicherzustellen.

Typ-I-Diabetes mellitus, einschließlich diabetischer Ketoazidose, wurde bei Patienten unter Pembrolizumab berichtet. Patienten sollten auf Hyperglykämie sowie auf andere Anzeichen und Symptome von Diabetes überwacht werden. Bei Typ-I-Diabetes sollte Insulin gegeben werden. Bei Fällen von Grad 3 Hyperglykämie sollte die Therapie mit Pembrolizumab unterbrochen werden bis der Stoffwechsel unter Kontrolle ist.

Störungen der Schilddrüsenfunktion, einschließlich Hypothyreose, Hyperthyreose sowie Thyreoiditis, wurden bei Patienten unter Pembrolizumab berichtet und können zu jeder Zeit

während der Behandlung auftreten. Daher sollten Patienten auf Änderungen der Schilddrüsenfunktion (zu Behandlungsbeginn, in regelmäßigen Abständen während der Behandlung und wenn bei entsprechender klinischer Bewertung angezeigt) und auf Anzeichen und Symptome einer Erkrankung der Schilddrüse überwacht werden. Eine Hypothyreose kann mit einer Hormonsubstitutionstherapie behandelt werden und erfordert keine Therapieunterbrechung oder Kortikosteroidgabe. Eine Hyperthyreose kann symptomatisch behandelt werden. Pembrolizumab sollte bei Grad ≥ 3 Hyperthyreose bis zur Besserung auf Grad ≤ 1 unterbrochen werden. Bei Patienten mit Grad 3 oder Grad 4 Hyperthyreose, die sich auf Grad 2 oder weniger gebessert hat, kann eine Wiederaufnahme der Therapie mit Pembrolizumab nach Ausschleichen der Kortikosteroidtherapie, falls notwendig, erwogen werden. Die Schilddrüsenfunktion sowie die Hormonspiegel sollten überwacht werden, um eine angemessene Hormonsubstitution sicherzustellen.

Andere immunvermittelte Nebenwirkungen

Folgende weitere klinisch relevante immunvermittelte Nebenwirkungen wurden bei Patienten unter Pembrolizumab berichtet: Uveitis, Arthritis, Myositis, Pankreatitis, schwere Hautreaktionen, Myasthenie-Syndrom, optische Neuritis, Rhabdomyolyse, hämolytische Anämie sowie fokale Krampfanfälle bei einem Patienten mit Entzündungsherden im Hirnparenchym.

Entsprechend des Schweregrads der Nebenwirkung sollte die Therapie mit Pembrolizumab unterbrochen und es sollten Kortikosteroide gegeben werden.

Die Therapie mit Pembrolizumab kann innerhalb von zwölf Wochen nach der letzten Dosis KEYTRUDA[®] wieder aufgenommen werden, wenn die Nebenwirkungen auf Grad 1 oder weniger verbleiben und die Kortikosteroid-Dosis auf ≤ 10 mg Prednison oder eines entsprechenden Äquivalents pro Tag reduziert wurde.

Die Behandlung mit Pembrolizumab ist dauerhaft abzusetzen, wenn jegliche Grad 3 immunvermittelte Nebenwirkung erneut auftritt und bei jeglicher Grad 4 immunvermittelter Toxizität.

Infusionsbedingte Reaktionen

Schwere infusionsbedingte Reaktionen wurden bei Patienten unter Pembrolizumab berichtet. Die Infusion sollte bei schweren Infusionsreaktionen gestoppt und Pembrolizumab dauerhaft abgesetzt werden. Patienten mit leichter oder moderater Reaktion auf die Infusion können Pembrolizumab unter engmaschiger Überwachung weiter erhalten, eine Prämedikation mit Antipyretika und Antihistaminika kann erwogen werden.

Von klinischen Studien ausgeschlossene Patienten

Die nachfolgend aufgeführten Patienten waren von den klinischen Studien ausgeschlossen: Patienten mit HIV-, Hepatitis-B- oder Hepatitis-C-Infektion; aktiven, systemischen Autoimmunerkrankungen; einer Pneumonitis oder schwerer Überempfindlichkeit gegen einen anderen monoklonalen Antikörper in der Anamnese; laufender Therapie mit Immunsuppressiva; sowie Patienten mit schweren immunvermittelten Nebenwirkungen unter

Ipilimumab in der Anamnese, definiert als jegliche Grad 4 oder Grad 3 Toxizität, die eine Kortikosteroid-Behandlung über mehr als zwölf Wochen erforderte (mehr als 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents in entsprechender Dosierung). Patienten mit aktiven Infektionserkrankungen wurden von den klinischen Studien ausgeschlossen und mussten ihre Infektion behandeln lassen, bevor sie mit Pembrolizumab behandelt werden konnten. Patienten, bei denen während der Behandlung mit Pembrolizumab aktive Infektionen auftraten, erhielten eine adäquate medizinische Behandlung. Patienten mit klinisch relevanten Abweichungen der Nierenfunktion ($> 1,5$ -fachen Erhöhung von Serumkreatinin über dem oberen Normwert (ULN)) oder Leberfunktion ($> 1,5$ -fachen Erhöhung von Gesamtbilirubin über dem oberen Normwert (ULN); $> 2,5$ -fachen Erhöhung von ALT oder AST über dem oberen Normwert (ULN) ohne Vorliegen von Lebermetastasen) vor Behandlungsbeginn waren von den klinischen Studien ausgeschlossen. Daher liegen nur begrenzte Daten bei Patienten mit schwerer Einschränkung der Nierenfunktion und bei Patienten mit moderater bis schwerer Einschränkung der Leberfunktion vor.

Diese Patientengruppen können mit Pembrolizumab unter adäquater medizinischer Therapie behandelt werden, nach sorgfältiger Abwägung des möglicherweise erhöhten Risikos.

Patientenkarte

Jeder Arzt, der KEYTRUDA[®] verordnet, muss mit der Fachinformation und den Vorgaben zur Behandlung vertraut sein. Der verordnende Arzt muss die Risiken einer Therapie mit KEYTRUDA[®] mit dem Patienten besprechen. Die Patientenkarte wird dem Patienten bei jeder Verordnung zur Verfügung gestellt.

Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Daten zur Anwendung von Pembrolizumab bei Schwangeren liegen nicht vor. Reproduktionsstudien bei Tieren wurden mit Pembrolizumab nicht durchgeführt; bei Modellen mit trächtigen Mäusen wurde jedoch gezeigt, dass die Blockierung des PD-L1-Signalwegs die feto-maternale Toleranz stört und zu einer Erhöhung der Abortrate führt. Diese Ergebnisse deuten auf ein potenzielles Risiko, dass die Gabe von Pembrolizumab während der Schwangerschaft, basierend auf dem Wirkmechanismus, eine fötale Beeinträchtigung, einschließlich erhöhter Abort- und Totgeburtsraten, verursachen kann. Es ist bekannt, dass humane Immunglobuline vom G4-Typ (IgG4) plazentagängig sind, und, da es sich bei Pembrolizumab um einen IgG4-Antikörper handelt, besteht die Möglichkeit, dass Pembrolizumab von der Mutter auf den sich entwickelnden Fötus übertragen werden kann. Pembrolizumab sollte während der Schwangerschaft nicht angewendet werden, es sei denn, der klinische Zustand der Frau erfordert eine Behandlung mit Pembrolizumab.

Frauen im gebärfähigen Alter müssen während der Behandlung mit Pembrolizumab und noch mindestens vier Monate nach der letzten Dosis von Pembrolizumab eine zuverlässige Verhütungsmethode anwenden.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Pembrolizumab in die Muttermilch übergeht. Da Antikörper bekanntlich in die Muttermilch übergehen können, kann ein Risiko für das Neugeborene bzw. den Säugling nicht ausgeschlossen werden. Eine Entscheidung muss darüber getroffen werden, ob das Stillen zu unterbrechen ist, oder ob auf die Behandlung mit Pembrolizumab verzichtet werden soll / die Behandlung mit Pembrolizumab zu unterbrechen ist. Dabei ist sowohl der Nutzen des Stillens für das Kind als auch der Nutzen der Therapie mit Pembrolizumab für die stillende Patientin zu berücksichtigen.

Fertilität

Es sind keine klinischen Daten über mögliche Auswirkungen von Pembrolizumab auf die Fertilität verfügbar. Obwohl keine Reproduktions- und Entwicklungstoxizitätsstudien mit Pembrolizumab durchgeführt wurden, wurden bei einer 1-Monats- und einer 6-Monats-Studie zur Toxizität bei wiederholter Gabe bei Affen keine beachtenswerten Wirkungen auf männliche und weibliche Reproduktionsorgane beobachtet.

Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Pembrolizumab hat möglicherweise einen geringen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. Nach Gabe von Pembrolizumab wurde über Müdigkeit/Erschöpfung berichtet.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung über das nationale Meldesystem anzuzeigen.

Ein entsprechender Hinweis zur Meldung von Nebenwirkungen ist ebenfalls in der Gebrauchsinformation angegeben. Patienten, die Nebenwirkungen bemerken, wenden sich an Ihren Arzt. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in der Gebrauchsinformation angegeben sind. Patienten können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen um dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit des Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden (1).

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung***Zubereitung und Anwendung***

- Vor der Rekonstitution kann die Durchstechflasche mit dem lyophilisierten Pulver bis zu 24 Stunden außerhalb des Kühlschranks (Temperaturen bei oder unter 25 °C) aufbewahrt werden.
- Fügen Sie unter aseptischen Bedingungen 2,3 ml Wasser für Injektionszwecke hinzu, um eine 25 mg/ml (pH 5,2–5,8)-Lösung von KEYTRUDA[®] zu erhalten.

- Um Schaumbildung zu vermeiden, lassen Sie das Wasser an der Wand der Durchstechflasche entlang und nicht direkt in das lyophilisierte Pulver rinnen.
- Schwenken Sie die Durchstechflasche langsam, um das lyophilisierte Pulver zu rekonstituieren. Warten Sie bis zu fünf Minuten, bis die Blasen verschwunden sind. Die Durchstechflaschen nicht schütteln.
- Parenterale Arzneimittel sind vor der Infusion auf sichtbare Partikel oder Verfärbung zu prüfen. Rekonstituiertes KEYTRUDA[®] ist eine klare bis leicht opaleszente, farblose bis schwach gelbliche Lösung. Verwerfen Sie den rekonstituierten Inhalt samt Durchstechflasche, wenn Sie Partikel beobachten.
- Entnehmen Sie das benötigte Volumen von bis zu 2 ml (50 mg) KEYTRUDA[®] und überführen Sie dieses in einen Infusionsbeutel mit 0,9 % Natriumchlorid- oder 5 % Glucoselösung, um eine verdünnte Lösung mit einer Endkonzentration von 1 bis 10 mg/ml herzustellen. Die verdünnte Lösung durch vorsichtiges Umdrehen mischen.
- Die chemische und physikalische Stabilität nach Anbruch der rekonstituierten und verdünnten Lösung wurde für 24 Stunden bei Raumtemperatur nachgewiesen (bei oder unter 25 °C). Aus mikrobiologischer Sicht muss das Produkt umgehend verwendet werden. Frieren Sie die rekonstituierte oder verdünnte Lösung nicht ein. Wird das Produkt nicht umgehend verwendet, liegen die Aufbewahrungsdauer und –bedingungen nach Anbruch vor Anwendung in der Verantwortung des Anwenders, wobei die Aufbewahrungsdauer eine Gesamtzeit von 24 Stunden nicht überschreiten darf. Der Aufbewahrungszeitraum von 24 Stunden kann bis zu sechs Stunden bei Raumtemperatur (bei oder unter 25 °C) umfassen, darüber hinaus muss die Lösung im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C aufbewahrt werden. Die Durchstechflaschen und/oder Infusionsbeutel sollten nach Aufbewahrung im Kühlschrank vor der Anwendung auf Raumtemperatur gebracht werden. Die Infusionslösung sollte intravenös über 30 Minuten gegeben werden unter Anwendung eines sterilen, pyrogenfreien 0,2 bis fünf Mikrometer In-line- oder Add-On-Filters mit geringer Proteinbindung.
- Andere Arzneimittel dürfen nicht über dieselbe Infusionskanüle gegeben werden.
- KEYTRUDA[®] ist nur zur einmaligen Anwendung. Nicht benötigte Reste in der Durchstechflasche sind zu verwerfen.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu beseitigen.

Dauer der Haltbarkeit / Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung

Dauer der Haltbarkeit

Ungeöffnete Durchstechflasche: 18 Monate

Nach Rekonstitution

Die chemische und physikalische Stabilität nach Anbruch der rekonstituierten und verdünnten Lösung wurde für 24 Stunden bei Raumtemperatur nachgewiesen (bei oder unter 25 °C). Aus mikrobiologischer Sicht muss das Produkt umgehend verwendet werden. Frieren Sie die rekonstituierte oder verdünnte Lösung nicht ein. Wird das Produkt nicht umgehend

verwendet, liegen die Aufbewahrungsdauer und –bedingungen nach Anbruch vor Anwendung in der Verantwortung des Anwenders, wobei die Aufbewahrungsdauer eine Gesamtzeit von 24 Stunden nicht überschreiten darf. Der Aufbewahrungszeitraum von 24 Stunden kann bis zu sechs Stunden bei Raumtemperatur (bei oder unter 25 °C) umfassen, darüber hinaus muss die Lösung im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C aufbewahrt werden. Die Durchstechflaschen und/oder Infusionsbeutel sollten nach Aufbewahrung im Kühlschrank vor der Anwendung auf Raumtemperatur gebracht werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung

Im Kühlschrank aufbewahren (2 °C bis 8 °C) (1).

Beschreiben Sie, ob für Patientengruppen mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen abweichende Anforderungen als die zuvor genannten bestehen und, wenn ja, welche dies sind.

Nicht zutreffend.

3.4.6 Beschreibung der Informationsbeschaffung für Abschnitt 3.4

Erläutern Sie das Vorgehen zur Identifikation der in den Abschnitten 3.4.1 bis 3.4.5 genannten Quellen (Informationsbeschaffung). Sofern erforderlich, können Sie zur Beschreibung der Informationsbeschaffung weitere Quellen benennen.

Die in Abschnitt 3.4 verwendeten Quellen sind ausschließlich Dokumente aus dem zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Dossiers aktuell genehmigten Zulassungsdossiers, oder weitere von den Zulassungsbehörden erstellte Dokumente (2, 3).

Die in Abschnitt 3.4.1 enthaltenen Informationen entstammen ausschließlich der zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Dossiers aktuell genehmigten Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) KEYTRUDA[®] (1). Die Informationen aus der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) KEYTRUDA[®] wurden zur bestmöglichen Darstellung nach den in diesem Abschnitt erforderlichen Gesichtspunkten entsprechend aufgeführt. Zur besseren Lesbarkeit wurden die Verweise auf andere Abschnitte der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) KEYTRUDA[®] hier nicht übernommen. Die vollständige Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) KEYTRUDA[®] ist als Referenz diesem Dossier beigelegt.

3.4.7 Referenzliste für Abschnitt 3.4

Listen Sie nachfolgend alle Quellen (z. B. Publikationen), die Sie in den Abschnitten 3.4.1 bis 3.4.6 angegeben haben (als fortlaufend nummerierte Liste). Verwenden Sie hierzu einen allgemein gebräuchlichen Zitierstil (z. B. Vancouver oder Harvard). Geben Sie bei Fachinformationen immer den Stand des Dokuments an.

1. MSD SHARP & DOHME. Fachinformation KEYTRUDA[®] (Pembrolizumab). Stand: Juli 2015.
2. MSD SHARP & DOHME. Anhang II: KEYTRUDA[®]. 2015.
3. MSD SHARP & DOHME. Modul 1.8.2 Risk Management System: KEYTRUDA[®], Stand: 9. Juni 2015.
4. MSD SHARP & DOHME. Gebrauchsinformation: Information für Patienten - KEYTRUDA[®] (Pembrolizumab) 50 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung. 2015.