

## Arzneimittel-Richtlinien

Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat in seiner Sitzung am 03. Juli 2000 beschlossen, die Anlage 2 der Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Arzneimittel-Richtlinien/AMR) in der Fassung vom 31. August 1993 (BANz. S. 11 155), zuletzt geändert am 3. August 1998 (BANz. S. 14 491), Anlage 2 zuletzt geändert am 10. April 2000 (BANz. ...) wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen:

### 1. Teil A der Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien wird wie folgt ergänzt bzw. geändert:

Festbetragsgruppen für Arzneimittel mit denselben Wirkstoffen (§ 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB V) und Vergleichsgrößen für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V):

<b>(Ä) Wirkstoff:</b>	<b>Mesalazin</b>
-----------------------	------------------

<b><u>Festbetragsgruppe 1:</u></b>	feste orale Darreichungsformen	(z.B. magensaftresistente Tabletten, Retardtabletten, <u>Retardgranulat Beutel</u> )
------------------------------------	-----------------------------------	---

<b>(Ä) Wirkstoff:</b>	<b>Tramadol</b>
-----------------------	-----------------

<b><u>Festbetragsgruppe 3:</u></b>	flüssige orale Darreichungsformen	(z.B. Tropfen, Lösung, <u>Saft</u> )
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**2. Teil C der Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien wird wie folgt ergänzt bzw. geändert:**

Festbetragsgruppen für Arzneimittel mit therapeutisch vergleichbarer Wirkung, insbesondere Arzneimittelkombinationen (§ 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB V) und Vergleichsgrößen für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V):

(Ä) Wirkstoffgruppe:	Glucocorticoide
<b><u>Festbetragsgruppe 2:</u></b>	<b>weitere Glucocorticoide, mittelstark wirksam</b>
	<u>Konzentrationsbereich</u>
- Alclometasondipropionat	ca. 0,05 %
- Betamethasonbenzoat	ca. 0,025 %
- Betamethasonvalerat	ca. 0,05 %
- Clobetasonbutyrat	ca. 0,05 %
- Clocortolonpivalat plus-hexanoat	je ca. 0,1 %
- Desonid	ca. 0,05 % - 0,1 %
- Desoximetason	ca. 0,05 %
- Dexamethason	ca. 0,05 - 0,1 %
- Flumethasonpivalat	ca. 0,02 %
- Fluocinolonacetamid	ca. 0,01 %
- Fluocinonid	ca. 0,01 %
- Fluocortolon	ca. 0,2 %
- Fluocortolonpivalat plus-hexanoat	je ca. 0,1 %
- Fluoprednidenacetat	ca. 0,05 % - 0,15 %
- Fluoroandrenolon - Fludroxycorticoid	ca. 0,025 % - 0,05 %
- Halcinonid	ca. 0,025 %
- Hydrocortison-17-butyrate 21-propionat	ca. 0,1 %
- Hydrocortisonaceponat	ca. 0,1 %
- Hydrocortisonbutyrat	ca. 0,1 %
- Methylprednisolonaceponat	ca. 0,1 %
- Prednicarbat	ca. 2,5 %
- Triamcinolonacetamid	ca. 0,0089% - 0,1 %
<b>topische Darreichungsformen</b>	(z.B. Creme, Emulsion, Lösung, <u>Liquidum</u> , Lotion, Paste, Salbe, Cremesalbe, Fettsalbe, Haftsalbe, Schaum, Spray, Tinktur)

Für die o.g. Festbetragsgruppen wird als Vergleichsgröße (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) die im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Standardeinheit zugrundegelegt.

Die Änderung der Richtlinien tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft.

Köln, den 3. Juli 2000

**Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen**

**Der Vorsitzende**

**Jung**