

# Beschluss

des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung  
der Arzneimittel-Richtlinie:

Anlage XII – Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen  
Wirkstoffen nach § 35a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch  
(SGB V)

Ivosidenib (Neubewertung eines Orphan Drugs nach  
Überschreitung der 30 Millionen Euro-Grenze: Akute  
Myeloische Leukämie mit IDH1-R132-Mutation, Erstlinie,  
Kombination mit Azacitidin)

Vom 20. August 2026

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 20. August 2026 beschlossen, die Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) in der Fassung vom 18. Dezember 2008 / 22. Januar 2009 (BAnz. Nr. 49a vom 31. März 2009), die zuletzt durch die Bekanntmachung des Beschlusses vom 6. August 2026 (BAnz AT 31.08.2026 B5) geändert worden ist, wie folgt zu ändern:

- I. In Anlage XII werden die Angaben zu dem Wirkstoff Ivosidenib in der Fassung des Beschlusses vom 18. Januar 2024 (BAnz AT 06.03.2024 B2) durch die folgenden Angaben ersetzt:**

## **Ivosidenib**

Beschluss vom: 20. August 2026

In Kraft getreten am: 20. August 2026

BAnz AT TT. MM JJJJ Bx

### **Anwendungsgebiet (laut Zulassung vom 4. Mai 2023):**

Tibsovo in Kombination mit Azacitidin wird angewendet zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML) mit einer Isocitrat-Dehydrogenase-1 (IDH1)-R132-Mutation, die für eine Standard-Induktionstherapie nicht geeignet sind.

### **Anwendungsgebiet des Beschlusses (Beschluss vom 20. August 2026):**

Siehe Anwendungsgebiet laut Zulassung.

## **1. Zusatznutzen des Arzneimittels im Verhältnis zur zweckmäßigen Vergleichstherapie**

Erwachsene mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML) mit einer Isocitratdehydrogenase-1 (IDH1)-R132-Mutation, die für eine Standard-Induktionstherapie nicht geeignet sind

### **Zweckmäßige Vergleichstherapie:**

- Venetoclax in Kombination mit Azacitidin
- oder
- Venetoclax in Kombination mit Decitabin

### **Ausmaß und Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens von Ivosidenib in Kombination mit Azacitidin gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie:**

Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.

### **Studienergebnisse nach Endpunkten:<sup>1</sup>**

Erwachsene mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML) mit einer Isocitratdehydrogenase-1 (IDH1)-R132-Mutation, die für eine Standard-Induktionstherapie nicht geeignet sind

Es liegen keine bewertbaren Daten vor.

---

<sup>1</sup> Daten aus der Dossierbewertung des IQWiG (A26-19) und dem Addendum (A26-81), sofern nicht anders indiziert.

## Zusammenfassung der Ergebnisse relevanter klinischer Endpunkte

| Endpunktkategorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Effektrichtung/<br>Verzerrungspotential | Zusammenfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Mortalität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n. b.                                   | nicht bewertbar |
| Morbidität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n. b.                                   | nicht bewertbar |
| Gesundheitsbezogene Lebensqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n. b.                                   | nicht bewertbar |
| Nebenwirkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n. b.                                   | nicht bewertbar |
| Erläuterungen:<br>↑: positiver statistisch signifikanter und relevanter Effekt bei niedriger/unklarer Aussagesicherheit<br>↓: negativer statistisch signifikanter und relevanter Effekt bei niedriger/unklarer Aussagesicherheit<br>↑↑: positiver statistisch signifikanter und relevanter Effekt bei hoher Aussagesicherheit<br>↓↓: negativer statistisch signifikanter und relevanter Effekt bei hoher Aussagesicherheit<br>↔: kein statistisch signifikanter bzw. relevanter Unterschied<br>∅: Es liegen keine Daten vor.<br>n. b.: nicht bewertbar |                                         |                 |

## 2. Anzahl der Patientinnen und Patienten bzw. Abgrenzung der für die Behandlung infrage kommenden Patientengruppen

Erwachsene mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML) mit einer Isocitratdehydrogenase-1 (IDH1)-R132-Mutation, die für eine Standard-Induktionschemotherapie nicht geeignet sind

circa 110 – 290 Patientinnen und Patienten

## 3. Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung

Die Vorgaben der Fachinformation sind zu berücksichtigen. Die europäische Zulassungsbehörde European Medicines Agency (EMA) stellt die Inhalte der Fachinformation zu Tibsovo (Wirkstoff: Ivosidenib) unter folgendem Link frei zugänglich zur Verfügung (letzter Zugriff: 21. Mai 2026):

[https://www.ema.europa.eu/de/documents/product-information/tibsovo-epar-product-information\\_de.pdf](https://www.ema.europa.eu/de/documents/product-information/tibsovo-epar-product-information_de.pdf)

Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Ivosidenib soll nur durch in der Therapie von Patientinnen und Patienten mit akuter myeloischer Leukämie erfahrene Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie erfolgen.

Gemäß den Vorgaben der EMA hinsichtlich zusätzlicher Maßnahmen zur Risikominimierung ist seitens des pharmazeutischen Unternehmers Schulungsmaterial, welches Informationen für medizinisches Fachpersonal und für Patientinnen und Patienten (inklusive Patientenausweis) enthält, zur Verfügung zu stellen.

Das Schulungsmaterial enthält insbesondere Informationen und Warnhinweise zum Differenzierungssyndrom.

Vor Behandlungsbeginn sowie danach mindestens einmal wöchentlich während der ersten drei Wochen der Therapie muss ein Elektrokardiogramm (EKG) erstellt werden.

#### 4. Therapiekosten

##### Jahrestherapiekosten:

Erwachsene mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML) mit einer Isocitratdehydrogenase-1 (IDH1)-R132-Mutation, die für eine Standard-Induktionstherapie nicht geeignet sind

| Bezeichnung der Therapie                 | Jahrestherapiekosten/ Patientin bzw. Patient |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zu bewertendes Arzneimittel:             |                                              |
| Ivosidenib in Kombination mit Azacitidin |                                              |
| Ivosidenib                               | 158 588,36 €                                 |
| Azacitidin                               | 34 394,36 €                                  |
| Gesamt                                   | 192 982,72 €                                 |
| Zweckmäßige Vergleichstherapie:          |                                              |
| Venetoclax in Kombination mit Azacitidin |                                              |
| Venetoclax                               | 76 966,12 €                                  |
| Azacitidin                               | 34 394,36 €                                  |
| Gesamt                                   | 111 360,48 €                                 |
| Venetoclax in Kombination mit Decitabin  |                                              |
| Venetoclax                               | 76 966,12 €                                  |
| Decitabin                                | 76 209,25 €                                  |
| Gesamt                                   | 153 175,37 €                                 |

Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte (Stand Lauer-Tab: 15. Juni 2026)

##### Sonstige GKV-Leistungen:

| Bezeichnung der Therapie | Art der Leistung                                                                | Kosten/ Einheit | Anzahl/ Zyklus | Anzahl/ Patientin bzw. Patient /Jahr | Kosten/ Patientin bzw. Patient /Jahr |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Azacitidin               | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 100 €           | 7              | 91                                   | 9 100 €                              |
| Decitabin                | Zuschlag für die Herstellung einer zytostatikahaltigen parenteralen Zubereitung | 100 €           | 5              | 65                                   | 6 500 €                              |

**II. Der Beschluss tritt mit Wirkung vom Tag seiner Veröffentlichung auf den Internetseiten des G-BA am 20. August 2026 in Kraft.**

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter [www.g-ba.de](http://www.g-ba.de) veröffentlicht.

Berlin, den 20. August 2026

Gemeinsamer Bundesausschuss  
gemäß § 91 SGB V  
Die Vorsitzende

Dr. Optendrenk