

# Anlage V

## **zum Abschnitt J der Arzneimittel-Richtlinie**

Übersicht der verordnungsfähigen Medizinprodukte

*Diese Anlagen-Version ist nicht mehr in Kraft.*

| <b>Produkt-<br/>bezeichnung</b> | <b>Medizinisch notwendige Fälle</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Befristung der<br/>Verordnungs-<br/>fähigkeit</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1xklysmasalinisch               | Zur raschen und nachhaltigen Entleerung des Enddarms vor Operationen und diagnostischen Eingriffen;<br><br>nicht zur Anwendung bei Säuglingen und Kindern unter 6 Jahren.                                                                                        | 3. Dezember 2018                                     |
| ALCON BSS                       | Zur Irrigation im Rahmen extraokulärer und intraokulärer Eingriffe.                                                                                                                                                                                              | 8. Oktober 2018                                      |
| AMO™<br>ENDOSOL™                | Für intraokulare und topische Spülungen des Auges bei chirurgischen Prozeduren und für diagnostische und therapeutische Maßnahmen.                                                                                                                               | 1. November 2018                                     |
| Ampuwa®<br>Spüllösung           | - Zur Anfeuchtung von Tamponaden und Verbänden,<br><br>- Zur Atemluftbefeuchtung nur zur Anwendung in geschlossenen Systemen in medizinisch notwendigen Fällen;<br><br>jeweils in einer Menge, die ausschließlich für die einmalige Anwendung geeignet ist.      | 30. September 2020                                   |
| Amvisc™                         | Zur Anwendung als Operationshilfe bei ophthalmischen Eingriffen am vorderen Augenabschnitt.                                                                                                                                                                      | 18. Oktober 2020                                     |
| Amvisc™ Plus                    | Zur Anwendung als Operationshilfe bei ophthalmischen Eingriffen am vorderen Augenabschnitt.                                                                                                                                                                      | 18. Oktober 2020                                     |
| Aqua B. Braun                   | - zur Spülung und Reinigung bei operativen Eingriffen<br>- zur Spülung von Wunden und Verbrennungen<br>- zum Anfeuchten von Wundtamponaden, Tüchern und Verbänden<br>- zur Überprüfung der Durchlässigkeit von Blasenkatetern<br>- zur mechanischen Augenspülung | 7. Mai 2018                                          |

| <b>Produkt-<br/>bezeichnung</b>                      | <b>Medizinisch notwendige Fälle</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Befristung der<br/>Verordnungs-<br/>fähigkeit</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bausch & Lomb<br>Balanced Salt<br>Solution           | Zur Irrigation im Rahmen extraokulärer und intraokulärer Eingriffe.                                                                                                                                                                                        | 18. Oktober 2020                                     |
| BD<br>PosiFlush™ SP                                  | Ausschließlich zum Spülen von in-situ Gefäßzugangssystemen.<br><br>Darf nicht in einem sterilen Umfeld verwendet werden.                                                                                                                                   | 28. Januar 2018                                      |
| BD<br>PosiFlush™ XS                                  | Ausschließlich zum Spülen von in-situ Gefäßzugangssystemen.<br><br>Bei Verwendung aseptischer Technik in einem sterilen Feld verwendbar.                                                                                                                   | 28. Januar 2018                                      |
| belAir®<br>NaCl 0,9 %                                | Als isotone Trägerlösung bei der Verwendung von Inhalaten in Verneblern oder Aerosolgeräten. Dies gilt nur für die Fälle, in denen der Zusatz einer isotonen Trägerlösung in der Fachinformation des arzneistoffhaltigen Inhalats zwingend vorgesehen ist. | 8. November 2021                                     |
| BSS DISTRA-SOL                                       | Zur Spülung der Vorderkammer während Kataraktoperationen und anderen intraokularen Eingriffen.                                                                                                                                                             | 11. November 2019                                    |
| BSS PLUS®<br>(Alcon Pharma<br>GmbH)                  | Als intraokulare Spüllösung bei chirurgischen Eingriffen im Auge, bei denen eine intraokulare Perfusion erforderlich ist.                                                                                                                                  | 8. April 2022                                        |
| BSS® STERILE<br>SPÜLLÖSUNG<br>(Alcon Pharma<br>GmbH) | Zur Irrigation im Rahmen extraokulärer und intraokulärer Eingriffe.                                                                                                                                                                                        | 8. April 2022                                        |
| Dimet®20                                             | Für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen zur physikalischen Behandlung des Kopfhaares bei Kopflausbefall.                                                                | keine                                                |

| <b>Produkt-<br/>bezeichnung</b>         | <b>Medizinisch notwendige Fälle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Befristung der<br/>Verordnungs-<br/>fähigkeit</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dk-line®                                | Zur Anwendung als Operationshilfe in der Ophthalmochirurgie zur mechanischen Netzhaut-entfaltung nach Netzhautablösungen/PVR/PDR, Riesenrissen, okularen Traumata sowie zur vereinfachten Entfernung subluxierter Linsen und Fremdkörper aus dem Glaskörperraum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18. Oktober 2020                                     |
| DuoVisc®                                | Zur Anwendung als Operationshilfe in der Ophthalmochirurgie des vorderen Augenabschnittes bei Kataraktextraktion und Implantation einer Intraocularlinse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20. Oktober 2020                                     |
| EtoPril®                                | Für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen zur physikalischen Behandlung des Kopfhaares bei Kopflausbefall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | keine                                                |
| Eye-Lotion<br>Balanced Salt<br>Solution | Zur Irrigation im Rahmen extraokulärer und intraokulärer Eingriffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14. Dezember 2019                                    |
| Freka-Clyss®                            | <p>Für Patienten ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation nur in Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon (mit Ausnahme des kongenitalen Megacolons), Divertikulose, Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, vor diagnostischen Eingriffen, bei Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase.</p> <p>Für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr (mit Ausnahme von Säuglingen und Kleinkindern) und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation, zur raschen und nachhaltigen Entleerung des Enddarms vor Operationen, zur Vorbereitung von urologischen, röntgenologischen und gynäkologischen Untersuchungen sowie vor Rektoskopien.</p> | keine                                                |

| <b>Produkt-<br/>bezeichnung</b>             | <b>Medizinisch notwendige Fälle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Befristung der<br/>Verordnungs-<br/>fähigkeit</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Freka Drainjet®<br>NaCl 0,9 %               | Zur internen und externen Anwendung wie Perfusion des extracorporalen Systems bei der Hämodialyse, postoperative Blasenspülung bei allen urologischen Eingriffen, Spülungen im Magen-Darmtrakt und von Fisteln und Drainagen. Auch zur Wundbehandlung und zum Befeuchten von Tüchern und Verbänden. | 6. Juni 2018                                         |
| Freka Drainjet®<br>Purisolet SM<br>verdünnt | Intra- und postoperative Blasenspülung bei urologischen Eingriffen.                                                                                                                                                                                                                                 | 6. Juni 2018                                         |
| Healon®                                     | Für die intraokulare Verwendung bei Augenoperationen.                                                                                                                                                                                                                                               | 1. November 2019                                     |
| HEALON5®                                    | Viskoelastische Lösung für die intraokulare Verwendung bei Augenoperationen am vorderen Augenabschnitt.                                                                                                                                                                                             | 1. November 2019                                     |
| HEALON GV®                                  | Viscoelastische Lösung für die intraokulare Verwendung bei Augenoperationen am vorderen Augenabschnitt.                                                                                                                                                                                             | 1. November 2019                                     |
| Hedrin® Once<br>Liquid Gel                  | Für Kinder ab 6 Monaten bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen zur physikalischen Behandlung des Kopfhaares bei Kopflausbefall.                                                                                            | keine                                                |
| HSO®                                        | Zur Anwendung als Operationshilfe bei ophthalmischen Eingriffen am vorderen Augenabschnitt.                                                                                                                                                                                                         | 15. März 2020                                        |
| HSO® PLUS                                   | Zur Anwendung als Operationshilfe bei ophthalmischen Eingriffen am vorderen Augenabschnitt.                                                                                                                                                                                                         | 15. März 2020                                        |
| HYLO®-GEL                                   | Synthetische Tränenflüssigkeit bei Autoimmun-Erkrankungen (Sjögren-Syndrom mit deutlichen Funktionsstörungen (trockenes Auge Grad 2), Epidermolysis bullosa, okuläres Pemphigoid), Fehlen oder Schädigung der Tränendrüse, Fazialisparese oder bei Lagophthalmus.                                   | 6. Februar 2019                                      |

| <b>Produkt-<br/>bezeichnung</b>                        | <b>Medizinisch notwendige Fälle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Befristung der<br/>Verordnungs-<br/>fähigkeit</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| IsoFree                                                | Als isotonische Trägerlösung bei der Verwendung von Inhalaten in Verneblern oder Aerosolgeräten. Dies gilt nur für die Fälle, in denen der Zusatz einer isotonischen Trägerlösung in der Fachinformation des arzneistoffhaltigen Inhalats zwingend vorgesehen ist.                                                                                                                                                                                                                                                 | 17. März 2018                                        |
| ISOMOL®                                                | Für Patienten ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation nur in Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon (mit Ausnahme des toxischen Megacolons), Divertikulose, Divertikulitis, Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, bei phosphatbindender Medikation bei chronischer Niereninsuffizienz, Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase.<br><br>Für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation. | 27. Januar 2021                                      |
| Isotonische Kochsalzlösung zur Inhalation (Eifelfango) | Als Trägerlösung bei der Verwendung von Inhalaten in Verneblern oder Aerosolgeräten. Dies gilt nur für die Fälle, in denen der Zusatz einer Trägerlösung in der Fachinformation des arzneistoffhaltigen Inhalats zwingend vorgesehen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12. September 2018                                   |
| Kinderlax® elektrolytfrei                              | Für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 11 Jahren zur Behandlung der Obstipation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21. Oktober 2022                                     |

| Produkt-<br>bezeichnung | Medizinisch notwendige Fälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Befristung der<br>Verordnungsfähigkeit |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Klistier Fresenius      | <p>Für Patienten ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation nur in Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon (mit Ausnahme des kongenitalen Megacolons), Divertikulose, Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, vor diagnostischen Eingriffen, bei Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase.</p> <p>Für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr (mit Ausnahme von Säuglingen und Kleinkindern) und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation, zur raschen und nachhaltigen Entleerung des Enddarms vor Operationen, zur Vorbereitung von urologischen, röntgenologischen und gynäkologischen Untersuchungen sowie vor Rektoskopien.</p> | keine                                  |
| Lubricano®              | Zur Anwendung bei Patienten mit Katheterisierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12. Januar 2019                        |
| Macrogol AbZ            | <p>Für Patienten ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation nur in Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon (mit Ausnahme des toxischen Megacolons), Divertikulose, Divertikulitis, Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, bei phosphatbindender Medikation bei chronischer Niereninsuffizienz, Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase.</p> <p>Für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation.</p>                                                                                                                                                                                                              | 11. Juli 2021                          |

| Produkt-<br>bezeichnung             | Medizinisch notwendige Fälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Befristung der<br>Verordnungs-<br>fähigkeit |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Macrogol dura®                      | <p>Für Patienten ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation nur in Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon (mit Ausnahme des toxischen Megacolons), Divertikulose, Divertikulitis, Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, bei phosphatbindender Medikation bei chronischer Niereninsuffizienz, Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase;</p> <p>Für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation.</p> | 14. April 2018                              |
| Macrogol-ratiopharm®                | <p>Für Patienten ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation nur in Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon (mit Ausnahme des toxischen Megacolons), Divertikulose, Divertikulitis, Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, bei phosphatbindender Medikation bei chronischer Niereninsuffizienz, Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase.</p> <p>Für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation.</p> | 11. Juli 2021                               |
| Macrogol-ratiopharm flüssig Orange® | <p>Für Patienten ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation nur in Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon (mit Ausnahme des toxischen Megacolons), Divertikulose, Divertikulitis, Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, bei phosphatbindender Medikation bei chronischer Niereninsuffizienz, Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase.</p> <p>Für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation.</p> | 11. Juli 2021                               |

| Produkt-<br>bezeichnung          | Medizinisch notwendige Fälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Befristung der<br>Verordnungs-<br>fähigkeit |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Macrogol TAD®                    | <p>Für Patienten ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation nur in Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon (mit Ausnahme des toxischen Megacolons), Divertikulose, Divertikulitis, Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, bei phosphatbindender Medikation bei chronischer Niereninsuffizienz, Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase.</p> <p>Für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation.</p> | 25. November 2022                           |
| Medicoforum<br>Laxativ           | <p>Für Patienten ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation nur in Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon (mit Ausnahme des toxischen Megacolons), Divertikulose, Divertikulitis, Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, bei phosphatbindender Medikation bei chronischer Niereninsuffizienz, Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase;</p> <p>Für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation.</p> | 11. Mai 2018                                |
| Microvisc® plus                  | Zur Anwendung als Operationshilfe in der Ophthalmochirurgie des vorderen Augenabschnittes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. September 2020                           |
| mosquito® med<br>LäuseShampoo    | Für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen zur physikalischen Behandlung des Kopfhaares bei Kopflausbefall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | keine                                       |
| mosquito® med<br>LäuseShampoo 10 | Für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen zur physikalischen Behandlung des Kopfhaares bei Kopflausbefall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | keine                                       |

| Produkt-<br>bezeichnung      | Medizinisch notwendige Fälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Befristung der<br>Verordnungs-<br>fähigkeit |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| MOVICOL®                     | <p>Für Patienten ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation nur in Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon (mit Ausnahme des toxischen Megacolons), Divertikulose, Divertikulitis, Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, bei phosphatbindender Medikation bei chronischer Niereninsuffizienz, Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase.</p> <p>Für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation.</p> | 27. Januar 2021                             |
| MOVICOL®<br>aromafrei        | <p>Für Patienten ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation nur in Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon (mit Ausnahme des toxischen Megacolons), Divertikulose, Divertikulitis, Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, bei phosphatbindender Medikation bei chronischer Niereninsuffizienz, Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase.</p> <p>Für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation.</p> | 27. Januar 2021                             |
| MOVICOL® flüssig<br>Orange   | <p>Für Patienten ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation nur in Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon (mit Ausnahme des toxischen Megacolons), Divertikulose, Divertikulitis, Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, bei phosphatbindender Medikation bei chronischer Niereninsuffizienz, Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase.</p> <p>Für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation.</p> | 27. Januar 2021                             |
| MOVICOL® Junior<br>aromafrei | <p>Für Kinder im Alter von 2 bis 11 Jahren zur Behandlung von Obstipation, für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zur Behandlung von Koprostase.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27. Januar 2021                             |

| <b>Produkt-<br/>bezeichnung</b> | <b>Medizinisch notwendige Fälle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Befristung der<br/>Verordnungs-<br/>fähigkeit</b> |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| MOVICOL® Junior Schoko          | Für Kinder im Alter von 2 bis 11 Jahren zur Behandlung der Obstipation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27. Januar 2021                                      |
| MucoClear® 6 %                  | Zur symptomatischen Inhalationsbehandlung der Mukoviszidose für Patienten ab dem 6. Lebensjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15. August 2022                                      |
| myVISC Hyal 1.0                 | Zur Anwendung als Operationshilfe in der Ophthalmochirurgie des vorderen Augenabschnittes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Juli 2018                                         |
| NaCl 0,9 %<br>B. Braun          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Spülung und Reinigung bei operativen Eingriffen</li> <li>- zur Spülung von Wunden und Verbrennungen</li> <li>- zum Anfeuchten von Wundtamponaden, Tüchern und Verbänden</li> <li>- zur Überprüfung der Durchlässigkeit von Kathetern</li> <li>- zur intra- und postoperativen Spülung bei endoskopischen Eingriffen</li> <li>- zur mechanischen Augenspülung</li> </ul> | 7. Mai 2018                                          |
| NaCl 0,9 %<br>Fresenius Kabi    | <p>Zur internen und externen Anwendung wie Perfusion des extracorporalen Systems bei der Hämodialyse, postoperative Blasenspülung bei allen urologischen Eingriffen, Spülungen im Magen-Darmtrakt und von Fisteln und Drainagen. Auch zur Wundbehandlung und zum Befeuchten von Tüchern und Verbänden;</p> <p>jeweils in einer Menge, die ausschließlich für die einmalige Anwendung geeignet ist.</p>               | 30. September 2020                                   |
| Nebusal™ 7 %                    | Zur symptomatischen Inhalationsbehandlung der Mukoviszidose für Patienten $\geq 6$ Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10. Februar 2020                                     |
| NYDA®                           | Für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen zur physikalischen Behandlung des Kopfhaares bei Kopflausbefall.                                                                                                                                                                                                                          | 6. Dezember 2022                                     |
| OcuCoat®                        | Zur Anwendung als Operationshilfe in der Ophthalmochirurgie des vorderen Augenabschnittes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18. Oktober 2020                                     |

| <b>Produkt-<br/>bezeichnung</b> | <b>Medizinisch notwendige Fälle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Befristung der<br/>Verordnungs-<br/>fähigkeit</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Oculentis BSS                   | Zur Irrigation im Rahmen extraokulärer und intra-<br>okulärer Eingriffe.                                                                                                                                                                                                                              | 14. Dezember 2017                                    |
| Okta-line™                      | Zur Anwendung als Operationshilfe in der<br>Ophthalmochirurgie zur mechanischen Netzhaut-<br>entfaltung nach Netzhautablösungen/PVR/PDR,<br>Riesenrissen, okularen Traumata sowie zur<br>vereinfachten Entfernung subluxierter Linsen und<br>Fremdkörper aus dem Glaskörperraum.                      | 18. Oktober 2020                                     |
| OPTYLURON<br>NHS 1,0 %          | Zur Anwendung als Operationshilfe in der Ophthal-<br>mochirurgie des vorderen Augenabschnittes.                                                                                                                                                                                                       | 1. Juni 2019                                         |
| OPTYLURON<br>NHS 1,4 %          | Zur Anwendung als Operationshilfe in der Ophthal-<br>mochirurgie des vorderen Augenabschnittes.                                                                                                                                                                                                       | 1. Juni 2019                                         |
| Oxane® 1300                     | Zur intraokularen Tamponade bei schweren Formen<br>der Netzhautablösung sowie allen<br>Netzhautablösungen, die mit anderen Therapie-<br>formen nicht behandelt werden können.<br>Ausgenommen ist die Anwendung bei zentralen<br>Foramina mit Ablösung und bei schweren<br>diabetischen Retinopathien. | 18. Oktober 2020                                     |
| Oxane® 5700                     | Zur intraokularen Tamponade bei schweren Formen<br>der Netzhautablösung sowie allen<br>Netzhautablösungen, die mit anderen Therapie-<br>formen nicht behandelt werden können.<br>Ausgenommen ist die Anwendung bei zentralen<br>Foramina mit Ablösung und bei schweren<br>diabetischen Retinopathien. | 18. Oktober 2020                                     |
| PädiaSalin® 0,9%                | Als Trägerlösung bei der Verwendung von Inhalaten<br>in Verneblern oder Aerosolgeräten. Dies gilt nur für<br>die Fälle, in denen der Zusatz einer Trägerlösung in<br>der Fachinformation des arzneistoffhaltigen Inhalats<br>zwingend vorgesehen ist.                                                 | 17. März 2018                                        |
| Paranix® ohne<br>Nissenkamm     | Für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und<br>Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit<br>Entwicklungsstörungen zur physikalischen<br>Behandlung bei Kopflausbefall.                                                                                                                 | keine                                                |

| <b>Produkt-<br/>bezeichnung</b> | <b>Medizinisch notwendige Fälle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Befristung der<br/>Verordnungs-<br/>fähigkeit</b> |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| PARI NaCl<br>Inhalationslösung  | Als Trägerlösung bei der Verwendung von Inhalaten in Verneblern oder Aerosolgeräten. Dies gilt nur für die Fälle, in denen der Zusatz einer Trägerlösung in der Fachinformation des arzneistoffhaltigen Inhalats zwingend vorgesehen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12. November 2018                                    |
| ParkoLax®                       | Für Patienten ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation nur in Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon (mit Ausnahme des toxischen Megacolons), Divertikulose, Divertikulitis, Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, bei phosphatbindender Medikation bei chronischer Niereninsuffizienz, Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase.<br><br>Für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zur Behandlung der Obstipation. | 21. Oktober 2022                                     |
| Pe-Ha-Luron®<br>1.0 %           | Zur Anwendung als Operationshilfe in der Ophthalmochirurgie des vorderen Augenabschnittes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4. April 2019                                        |
| Pe-Ha-Visco<br>(2,0 %)          | Zur Anwendung als Operationshilfe in der Ophthalmochirurgie des vorderen Augenabschnittes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. April 2019                                        |
| polyvisc® 2,0 %                 | Zur Anwendung als Operationshilfe in der Ophthalmochirurgie des vorderen Augenabschnittes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27. Januar 2021                                      |
| polysol®                        | Zur Irrigation im Rahmen extraokulärer und intraokulärer Eingriffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27. Januar 2021                                      |
| ProVisc®                        | Zur Anwendung als Operationshilfe in der Ophthalmochirurgie des vorderen Augenabschnittes bei Kataraktextraktion und Implantation einer Intraokularlinse (IOL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8. April 2022                                        |
| PURI CLEAR                      | Zur Irrigation im Rahmen extraokulärer und intraokulärer Eingriffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29. November 2021                                    |

| <b>Produkt-<br/>bezeichnung</b>      | <b>Medizinisch notwendige Fälle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Befristung der<br/>Verordnungs-<br/>fähigkeit</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Purisole® SM<br>verdünnt             | Intra- und postoperative Blasenspülung bei urologischen Eingriffen;<br><br>jeweils in einer Menge, die ausschließlich für die einmalige Anwendung geeignet ist.                                                                                                                                                                                                                                    | 7. Juni 2022                                         |
| Ringer B. Braun                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Spülung und Reinigung bei operativen Eingriffen</li> <li>- zur Spülung von Wunden und Verbrennungen</li> <li>- zur intra- und postoperativen Spülung bei endoskopischen Eingriffen</li> </ul>                                                                                                                                                         | 7. Mai 2018                                          |
| Ringer Fresenius<br>Spüllösung       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zum Freispülen des Operationsgebietes und zum Feuchthalten des Gewebes,</li> <li>- zur Wundspülung bei äußeren Traumen und Verbrennungen,</li> <li>- zur Spülung bei diagnostischen Untersuchungen;</li> <li>- zum Befeuchten von Wunden und Verbänden</li> </ul><br>jeweils in einer Menge, die ausschließlich für die einmalige Anwendung geeignet ist. | 30. September 2020                                   |
| Saliva natura                        | Zur Behandlung krankheitsbedingter Mundtrockenheit bei onkologischen oder Autoimmun-Erkrankungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | keine                                                |
| Sentol®                              | Zur Irrigation im Rahmen extraokulärer und intraokulärer Eingriffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27. Januar 2021                                      |
| Serag BSS                            | Zur Irrigation im Rahmen extraokulärer und intraokulärer Eingriffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27. Mai 2020                                         |
| Serumwerk-<br>Augenspüllösung<br>BSS | Zur Irrigation im Rahmen extraokulärer und intraokulärer Eingriffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14. Dezember 2019                                    |
| VISCOAT®                             | Zur Anwendung bei ophthalmologischen Eingriffen am vorderen Augenabschnitt, insbesondere bei Kataraktextraktion und Intraokularlinsen-Implantation.                                                                                                                                                                                                                                                | 20. Oktober 2020                                     |

| Produkt-<br>bezeichnung | Medizinisch notwendige Fälle                                                                                                                                                                                                                                  | Befristung der<br>Verordnungs-<br>fähigkeit |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| VISMED®                 | Synthetische Tränenflüssigkeit bei Autoimmun-Erkrankungen (Sjögren-Syndrom mit deutlichen Funktionsstörungen [trockenes Auge Grad 2], Epidermolysis bullosa, okuläres Pemphigoid), Fehlen oder Schädigung der Tränendrüse, Fazialisparese oder Lagophthalmus  | 15. Januar 2022                             |
| VISMED® MULTI           | Synthetische Tränenflüssigkeit bei Autoimmun-Erkrankungen (Sjögren-Syndrom mit deutlichen Funktionsstörungen [trockenes Auge Grad 2], Epidermolysis bullosa, okuläres Pemphigoid), Fehlen oder Schädigung der Tränendrüse, Fazialisparese oder Lagophthalmus. | 15. Januar 2022                             |
| Z-HYALIN®               | Zur Unterstützung intraokularer Eingriffe am vorderen Augenabschnitt bei Kataraktoperationen.                                                                                                                                                                 | 1. Mai 2019                                 |

Diese Anlagen-Version ist nicht mehr in Kraft.