



Ivacaftor/Tezacaftor/Elexacaftor (neues Anwendungsgebiet: Zystische Fibrose, Kombinationsbehandlung mit Ivacaftor, 6 bis 11 Jahre (heterozygot bzgl. F508del- und MF-Mutation))

Beschluss vom: 4. August 2022
In Kraft getreten am: 4. August 2022
BANz AT 23.08.2022 B4

gültig bis: unbefristet

Neues Anwendungsgebiet (laut Zulassung vom 7. Januar 2022):

Kaftrio wird angewendet als Kombinationsbehandlung mit Ivacaftor zur Behandlung der zystischen Fibrose (CF, Mukoviszidose) bei Patienten ab 6 Jahren, die mindestens eine F508del-Mutation im CFTR-Gen (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) aufweisen.

Anwendungsgebiet des Beschlusses (Beschluss vom 4. August 2022):

Kaftrio wird angewendet als Kombinationsbehandlung mit Ivacaftor zur Behandlung der zystischen Fibrose bei Kindern im Alter von 6 bis 11 Jahren, die heterozygot bezüglich einer F508del-Mutation im CFTR-Gen sind und auf dem zweiten Allel eine Mutation mit Minimalfunktion tragen.

1. Zusatznutzen des Arzneimittels im Verhältnis zur zweckmäßigen Vergleichstherapie

Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren mit zystischer Fibrose, die heterozygot bezüglich der F508del-Mutation im CFTR-Gen sind und auf dem zweiten Allel eine Mutation mit Minimalfunktion tragen

Zweckmäßige Vergleichstherapie für Ivacaftor/Tezacaftor/ Elexacaftor in Kombination mit Ivacaftor:

Best Supportive Care

Als Best Supportive Care (BSC) wird diejenige Therapie verstanden, die eine bestmögliche, patientenindividuell optimierte, unterstützende Behandlung zur Linderung von Symptomen und Verbesserung der Lebensqualität (insbesondere Antibiotika bei pulmonalen Infektionen, Mukolytika, Pankreasenzyme bei Pankreasinsuffizienz, Physiotherapie (i. S. der Heilmittel-RL), unter Ausschöpfung aller möglicher diätetischer Maßnahmen) gewährleistet.

Ausmaß und Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens von Ivacaftor/Tezacaftor/Elexacaftor in Kombination mit Ivacaftor gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie:

Hinweis auf einen beträchtlichen Zusatznutzen

Studienergebnisse nach Endpunkten:¹

Zusammenfassung der Ergebnisse relevanter klinischer Endpunkte

| Endpunktkategorie | Effektrichtung/ Verzerrungspotential | Zusammenfassung |
|---|---|--|
| Mortalität | ↔ | Kein für die Nutzenbewertung relevanter Unterschied. |
| Morbidität | ↑↑ | Vorteile in den Endpunkten pulmonale Exazerbationen, LCl _{2,5} , BMI und BMI-z-Score sowie den Domänen Atmungssystem und gastrointestinale Symptome des CFQ-R |
| Gesundheitsbezogene Lebensqualität | ↑↑ | Vorteile in den Domänen soziale Einschränkungen des CFQ-R |
| Nebenwirkungen | ↔ | Keine für die Nutzenbewertung relevanten Unterschiede in den Endpunkten SUEs und Abbruch wegen UE; im Detail Vorteil im Endpunkt Abdominalschmerz |
| Erläuterungen: ↑: positiver statistisch signifikanter und relevanter Effekt bei niedriger/unklarer Aussagesicherheit ↓: negativer statistisch signifikanter und relevanter Effekt bei niedriger/unklarer Aussagesicherheit ↑↑: positiver statistisch signifikanter und relevanter Effekt bei hoher Aussagesicherheit ↓↓: negativer statistisch signifikanter und relevanter Effekt bei hoher Aussagesicherheit ↔: kein statistisch signifikanter bzw. relevanter Unterschied ∅: Es liegen keine für die Nutzenbewertung verwertbaren Daten vor. n. b.: nicht bewertbar | | |

Studie VX19-445-116 (parallel, multizentrisch, doppelblind, randomisiert, kontrolliert über 24 Wochen mit 121 Patientinnen und Patienten):

Ivacaftor/Tezacaftor/Elexacaftor + Ivacaftor (IVA/TEZ/ELX + IVA) + Best Supportive Care (BSC) vs. Placebo + Best Supportive Care (Placebo + BSC)

Mortalität

| Endpunkt | IVA/TEZ/ELX + IVA + BSC | | Placebo + BSC | | IVA/TEZ/ELX + IVA vs. Placebo RR [95 %-KI] p-Wert ^{a)} |
|--------------------------|-------------------------|---|---------------|---|---|
| | N | Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%) | N | Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%) | |
| Gesamt mortalität | 60 | 0 (0,0) | 61 | 0 (0,0) | - |

¹ Daten aus der Dossierbewertung des IQWiG (A21-15 und A22-21) sofern nicht anders indiziert.

Morbidität

| Endpunkt | IVA/TEZ/ELX + IVA + BSC | | Placebo + BSC | | IVA/TEZ/ELX + IVA vs. Placebo |
|---|-------------------------|---|---------------|---|--|
| | N | Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%) | N | Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%) | RR [95 %-KI] p-Wert ^{a)} |
| Pulmonale Exazerbationen ^{b)} | 60 | 1 (1,7) | 61 | 16 (26,2) | 0,06 [0,01; 0,46]; < 0,001 |
| schwerwiegende pulmonale Exazerbationen ^{c)} | 60 | 0 (0,0) | 61 | 3 (4,9) | 0,15 [0,01; 2,75]; 0,094 ^{d)} |

| Endpunkt | IVA/TEZ/ELX + IVA + BSC | | | Placebo + BSC | | | IVA/TEZ/ELX + IVA vs. Placebo |
|--|--|-----------------------------|---|-----------------|-----------------------------|---|--|
| | N ^{e)} | Werte Studienbeginn MW (SD) | Mittlere Änderung zu Woche 24 MW (SE) ^{f)} | N ^{e)} | Werte Studienbeginn MW (SD) | Mittlere Änderung zu Woche 24 MW (SE) ^{f)} | MD [95 %-KI] p-Wert ^{g)} Hedges' g |
| Domänen zur Symptomatik des Cystic Fibrosis Questionnaire – Revised (CFQ-R)^{h)} | | | | | | | |
| Atmungssystem | 60 | 85,69 (11,69) | 5,94 (1,61) | 61 | 82,65 (14,13) | 0,47 (1,59) | 5,47 [0,98; 9,96]; 0,017 0,44 [0,08; 0,80] |
| gastrointestinale Symptome | 60 | 78,33 (22,82) | 6,85 (2,65) | 61 | 74,86 (26,29) | -1,81 (2,62) | 8,66 [1,24; 16,07]; 0,023 0,42 [0,06; 0,78] |
| Gewichtsprobleme | <i>Domäne in Fragebogen für Kinder (6 bis 11 Jahre) nicht vorgesehen</i> | | | | | | |
| Domänen zur Symptomatik des CFQ-R^{h)} Eltern-/Betreuer-Version (ergänzend dargestellt) | | | | | | | |
| Atmungssystem | 60 | 85,44 (13,75) | 9,87 (1,58) | 61 | 83,61 (15,33) | 1,14 (1,56) | 8,73 [4,31; 13,15]; < 0,001 0,71 [0,34; 1,08] |
| gastrointestinale Symptome | 60 | 76,30 (20,91) | 7,06 (1,92) | 61 | 70,86 (20,40) | 3,30 (1,91) | 3,76 [-1,63; 9,15]; 0,170 |
| Gewichtsprobleme | 60 | 63,89 (36,97) | 18,02 (3,83) | 61 | 65,03 (36,22) | 1,31 (3,79) | 16,71 [6,00; 27,43]; 0,003 0,56 [0,20; 0,93] |
| forciertes expiratorisches Ein-Sekunden-Volumen (FEV₁ %) | | | | | | | |
| FEV ₁ ^{h)} (absolute Veränderung) | 59 | 91,41 (13,83) | 9,48 (1,46) ⁱ⁾ | 59 | 87,20 (15,84) | -1,53 (1,46) ⁱ⁾ | 11,01 [6,89; 15,12]; < 0,001 ^{j)} |

| Lung Clearance Index (LCI_{2,5}) | | | | | | | |
|---|----|------------------|-------------------------------|----|------------------|-------------------------------|---|
| LCI _{2,5} ^{k)} (absolute Veränderung) | 60 | 10,26 (2,22) | -2,29 (0,16) ^{l)} | 61 | 9,75 (1,95) | -0,02 (0,16) ^{l)} | -2,26 [-2,71; -1,81]; < 0,001 ^{l)} |
| Body-Mass-Index (BMI) | | | | | | | |
| BMI ([kg/m ²], absolute Veränderung) | 59 | 16,33 (1,84) | 0,92 (0,10) ^{l)} | 59 | 16,11 (2,32) | 0,26 (0,10) ^{l)} | 0,66 [0,37; 0,95]; < 0,001 ^{m)} |
| BMI (altersabhängiger z-Score, absolute Veränderung) | 59 | -0,17 (0,85) | 0,31 (0,05) ^{l)} | 59 | -0,39 (0,92) | 0,03 (0,05) ^{l)} | 0,28 [0,14; 0,41]; < 0,001 ^{m)} |
| Schweißchloridkonzentrationⁿ⁾ (ergänzend dargestellt) | | | | | | | |
| Schweißchloridkonzentration ([mmol/l], absolute Veränderung) | 60 | 102,84 (9,98) | -58,91 (14,62) | 61 | 102,57 (8,55) | -3,90 (9,98) | -51,18 [-55,31; -47,05]; < 0,0001 -4,46 [-5,13; -3,79] |

Gesundheitsbezogene Lebensqualität

| Endpunkt | IVA/TEZ/ELX + IVA + BSC | | | Placebo + BSC | | | IVA/TEZ/ELX + IVA vs. Placebo |
|---|--|-----------------------------|---|-----------------|-----------------------------|---|--|
| | N ^{e)} | Werte Studienbeginn MW (SD) | Mittlere Änderung zu Woche 24 MW (SE) ^{f)} | N ^{e)} | Werte Studienbeginn MW (SD) | Mittlere Änderung zu Woche 24 MW (SE) ^{f)} | MD [95 %-KI] p-Wert ^{g)} Hedges' g |
| Domänen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität des CFQ-R^{h)} | | | | | | | |
| körperliches Wohlbefinden | 60 | 86,17 (13,58) | 4,33 (1,57) | 61 | 80,51 (22,69) | 0,44 (1,55) | 3,89 [-0,50; 8,28]; 0,082 |
| Gefühlslage | 60 | 78,06 (11,43) | 4,36 (1,50) | 61 | 76,74 (13,94) | 1,83 (1,49) | 2,53 [-1,68; 6,73]; 0,236 |
| soziale Einschränkungen | 60 | 65,74 (15,60) | 3,23 (1,68) | 61 | 67,62 (17,57) | -1,88 (1,66) | 5,12 [0,43; 9,81]; 0,033 0,39 [0,03; 0,75] |
| Vitalität | <i>Domäne in Fragebogen für Kinder (6 bis 11 Jahre) nicht vorgesehen</i> | | | | | | |
| Schul-schwierigkeiten | <i>Domäne in Fragebogen für Kinder (6 bis 11 Jahre) nicht vorgesehen</i> | | | | | | |
| Körperbild | 60 | 84,63 (20,87) | 8,39 (2,19) | 61 | 84,34 (20,32) | 4,45 (2,16) | 3,94 [-2,18; 10,06]; 0,205 |
| Essstörungen | 60 | 81,67 (23,13) | 7,76 (2,16) | 61 | 79,60 (23,15) | 2,70 (2,14) | 5,06 [-0,97; 11,10]; 0,099 |
| Therapie-belastung | 60 | 72,22 (18,69) | 3,11 (2,03) | 61 | 74,13 (20,26) | 3,21 (2,01) | -0,09 [-5,77; 5,58]; 0,974 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----|------------------|-----------------|---|
| subjektive Gesundheits-einschätzung | <i>Domäne in Fragebogen für Kinder (6 bis 11 Jahre) nicht vorgesehen</i> | | | | | | |
| Domänen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität des CFQ-R^{h)} Eltern-/Betreuer-Version (<i>ergänzend dargestellt</i>) | | | | | | | |
| körperliches Wohlbefinden | 60 | 90,49 (10,88) | 2,06 (1,30) | 61 | 85,31 (16,45) | -1,14 (1,28) | 3,21 [-0,42; 6,83]; 0,083 |
| Gefühlslage | 60 | 85,22 (10,57) | 1,53 (1,33) | 61 | 82,84 (16,12) | -0,23 (1,31) | 1,76 [-1,94; 5,47]; 0,348 |
| soziale Einschränkungen | <i>Domäne in Fragebogen für Eltern/Betreuer nicht vorgesehen</i> | | | | | | |
| Vitalität | 60 | 74,11 (13,05) | 3,56 (1,51) | 61 | 70,82 (16,29) | 0,43 (1,50) | 3,13 [-1,10; 7,36]; 0,146 |
| Schul-schwierigkeiten ^{o)} | 60 | 80,83 (17,58) | 2,09 (1,83) | 61 | 78,96 (18,42) | 0,78 (1,81) | 1,31 [-3,80; 6,43]; 0,612 |
| Körperbild | 60 | 78,70 (19,55) | 7,77 (1,92) | 61 | 81,24 (22,18) | 2,15 (1,90) | 5,62 [0,27; 10,98]; 0,040 0,38 [0,02; 0,74] |
| Essstörungen | 60 | 79,31 (23,63) | 5,81 (2,53) | 61 | 76,23 (27,63) | 1,89 (2,46) | 3,92 [-3,11; 10,94]; 0,272 |
| Therapie-belastung | 60 | 59,26 (20,93) | 6,61 (2,19) | 61 | 60,11 (20,12) | 2,41 (2,16) | 4,20 [-1,92; 10,31]; 0,177 |
| subjektive Gesundheits-einschätzung | 60 | 77,96 (15,65) | 5,28 (1,96) | 61 | 70,31 (19,32) | 3,05 (1,94) | 2,23 [-3,25; 7,71]; 0,421 |

Nebenwirkungen

| Endpunkt | IVA/TEZ/ELX + IVA + BSC | | Placebo + BSC | | IVA/TEZ/ELX + IVA vs. Placebo |
|---|-------------------------|---|---------------|---|-----------------------------------|
| | N | Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%) | N | Patientinnen und Patienten mit Ereignis n (%) | RR [95 %-KI] p-Wert ^{a)} |
| UEs (ergänzend dargestellt) ^{p)} | 60 | 48 (80,0) | 61 | 54 (88,5) | - |
| SUEs ^{p)} | 60 | 4 (6,7) | 61 | 6 (9,8) | 0,68 [0,20; 2,28]; 0,569 |
| Abbruch wegen UEs ^{p)} | 60 | 1 (1,7) | 61 | 0 (0,0) | - ^{q)} ; 0,367 |
| Abdominal-schmerz (PT, UEs) | 60 | 5 (8,3) | 61 | 17 (27,9) | 0,30 [0,12; 0,76]; 0,006 |

a. RR, KI (asymptotisch) und p-Wert (eigene Berechnung, unbedingter exakter Test, CSZ-Methode).
b. erhoben über die UEs als „Infektiöse pulmonale Exazerbation der zystischen Fibrose“ (PT).
c. erhoben über die SUEs als „Infektiöse pulmonale Exazerbation der zystischen Fibrose“ (PT).
d. eigene Berechnung: Es wurde bei der Berechnung von Effekt und KI der Korrekturfaktor 0,5 in beiden Studienarmen verwendet.

- e. Anzahl der Patientinnen und Patienten, die in der Auswertung zur Berechnung der Effektschätzung berücksichtigt wurden, die Werte bei Studienbeginn können auf anderen Patientenzahlen basieren.
- f. mittlere Änderung bis Woche 24 aus MMRM.
- g. MMRM; adjustiert für LCI_{2,5} und Körpergewicht zu Studienbeginn; zusätzlich Studienzeitpunkt, Behandlung×Studienzeitpunkt als feste Effekte im Modell. Der Effekt stellt den Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen der über den Studienverlauf (bis Woche 24) gemittelten Änderungen zwischen dem jeweiligen Messzeitpunkt und Studienbeginn dar.
- h. Höhere (zunehmende) Werte bedeuten bessere Symptomatik / gesundheitsbezogene Lebensqualität; positive Effekte (Intervention minus Kontrolle) bedeuten einen Vorteil für die Intervention (Skalenspannweite 0 bis 100).
- i. mittlere Änderung bis Woche 24: MW (SE) aus MMRM.
- j. Effekt stellt den Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen der über den Studienverlauf (bis Woche 24) gemittelten Änderungen zwischen dem jeweiligen Messzeitpunkt und Studienbeginn dar.
- k. Niedrigere (abnehmende) Werte bedeuten bessere Symptomatik; negative Effekte (Intervention minus Kontrolle) bedeuten einen Vorteil für die Intervention.
- l. Änderung zu Woche 24: MW (SE) aus MMRM.
- m. Effekt stellt den Unterschied der Änderungen von Studienbeginn zu Woche 24 zwischen den Behandlungsgruppen dar.
- n. Daten aus dem Modul 4 des Dossier des pharmazeutischen Unternehmers
- o. vom pharmazeutischen Unternehmer in Modul 4 A als Rollenfunktion bezeichnet.
- p. ohne PT „Infektiöse pulmonale Exazerbation der zystischen Fibrose“.
- q. Effektschätzung und 95 %-KI nicht sinnvoll interpretierbar.

Verwendete Abkürzungen:

BSC: Best supportive Care; CFQ-R: Cystic Fibrosis Questionnaire – Revised; ELX: Elexacaftor; IVA: Ivacaftor; KI: Konfidenzintervall; LCI: Lung Clearance Index; MD: Mittelwertdifferenz; MMRM: Gemischtes Modell mit Messwiederholungen; MW: Mittelwert; n: Anzahl Patientinnen und Patienten mit (mindestens 1) Ereignis; N: Anzahl ausgewerteter Patientinnen und Patienten; PT: bevorzugter Begriff; RCT: randomisierte kontrollierte Studie; RR: relatives Risiko; SD: Standardabweichung; SE: Standardfehler; SUE: schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; TEZ: Tezacaftor; UE: unerwünschtes Ereignis; vs. = versus

2. Anzahl der Patientinnen und Patienten bzw. Abgrenzung der für die Behandlung infrage kommenden Patientengruppen

Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren mit zystischer Fibrose, die heterozygot bezüglich der F508del-Mutation im CFTR-Gen sind und auf dem zweiten Allel eine Mutation mit Minimalfunktion tragen

ca. 230 Patientinnen und Patienten

3. Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung

Die Vorgaben der Fachinformation sind zu berücksichtigen. Die europäische Zulassungsbehörde European Medicines Agency (EMA) stellt die Inhalte der Fachinformation zu Kaftrio (Wirkstoff: Ivacaftor/Tezacaftor/Elexacaftor) unter folgendem Link frei zugänglich zur Verfügung (letzter Zugriff: 15. Juni 2022):

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/kaftrio-epar-product-information_de.pdf

Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Ivacaftor/Tezacaftor/Elexacaftor in Kombination mit Ivacaftor darf nur durch in der Therapie von Kindern mit zystischer Fibrose erfahrene Ärztinnen und Ärzte erfolgen.

4. Therapiekosten

Jahrestherapiekosten:

Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren mit zystischer Fibrose, die heterozygot bezüglich der F508del-Mutation im CFTR-Gen sind und auf dem zweiten Allel eine Mutation mit Minimalfunktion tragen

| Bezeichnung der Therapie | Jahrestherapiekosten/ Patientin bzw. Patient |
|----------------------------------|--|
| Zu bewertendes Arzneimittel: | |
| Ivacaftor/Tezacaftor/Elexacaftor | 156 562,19 € |
| + Ivacaftor | 82 914,18 € - 82 970,63 € |
| Gesamt: | 239 476,37 € - 239 532,81 € |
| + Best Supportive Care | patientenindividuell unterschiedlich |
| Zweckmäßige Vergleichstherapie: | |
| Best Supportive Care | patientenindividuell unterschiedlich |

Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte (Stand Lauer-Taxe: 15. Juli 2022)

Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen: entfällt